


**TRAITE DE
MINERALOGIE,
PAR LE CEN.
HAUY, MEMBRE
DE L'INSTITUT...**











T R A I T É
D E
M I N É R A L O G I E.
T O M E I I



TRAITÉ
DE
MINÉRALOGIE,
PAR LE C^{te}. HAÛY,

Membre de l'Institut National des Sciences et Arts, et
Conservateur des Collections minéralogiques de l'École
des Mines.

PUBLIÉ PAR LE CONSEIL DES MINES.

En cinq volumes, dont un contient 56 planches.

TOME SECOND.



DE L'IMPRIMERIE DE DELANCE—

A PARIS,

CHEZ LOUIS, LIBRAIRE, RUE DE SAVOYE, N^o. 12.

(x) 1801.



TRAITÉ

DE

MINÉRALOGIE

SUITE DE LA PARTIE GÉOMÉTRIQUE.

De la recherche des rapports entre les principales dimensions des molécules intégrantes.

172. Tous les calculs relatifs à la structure des cristaux portent sur la considération des triangles mesurateurs, dont deux côtés représentent toujours des dimensions prises dans les molécules intégrantes, telles que des diagonales, des arêtes et des hauteurs. Pour déterminer les effets des lois de décroissement, il falloit donc connaître les rapports entre les lignes dont il s'agit, et il étoit de plus à désirer que leurs expressions eussent la plus grande simplicité possible.

Plusieurs formes offroient ces rapports comme d'elles-mêmes, par la régularité parfaite qu'on devoit naturellement leur supposer. Par exemple, il

est infiniment probable que le noyau de la soude muriatée ou celui du plomb sulfuré est rigoureusement le cube; car d'un côté, l'observation ne donne aucune différence sensible, entre la mesure des angles plans ou solides de ce noyau, et celle de l'angle droit. D'une autre part, les divisions qu'admettent les cristaux de ces deux espèces étant également nettes et faciles dans tous les sens, on doit en conclure que les faces des molécules, dont les positions respectives se trouvent indiquées par ces coupes, sont égales et semblables entre elles, c'est-à-dire, que les molécules sont de véritables cubes. De même, on ne peut douter que la forme primitive du zinc sulfuré ne soit le dodécèdre à plans rhombes égaux et semblables, ou, si l'on veut, celui dans lequel l'incidence de deux faces quelconques adjacentes est la même, c'est-à-dire, de 120° ; d'où il résulte que les molécules sont des tétraèdres, qui ont pour faces des triangles parallèlement égaux et semblables. De là on conclut encore que le rapport entre les deux diagonales de chaque rhombe, est exactement celui de $\sqrt{2}$ à 1, ainsi que je l'ai prouvé plus haut; et cette simplicité se communique ensuite à tous les calculs qui ont pour objet les modifications de la même forme.

178. Mais il y a des cas où l'égalité des faces de la molécule étant encore indiquée par des coupes également nettes et faciles dans tous les sens, la

mesure des angles ne sont plus données d'après leur conformité avec des limites simples et familières, telles que l'angle droit, celui de 60° , etc. C'est ce qui a lieu toutes les fois que la forme primitive est un rhomboïde, comme dans le chaux carbonatée, la chaux, le fer sulfaté, etc. Cette forme étant susceptible de varier à l'infini, par les incidences de ses faces, il a fallu employer des moyens particuliers pour obtenir des données qui eussent le double avantage de concorder à des résultats sensiblement d'accord avec l'observation, et d'être assés à la facilité des calculs.

174. Un de ces moyens n'est qu'une application un peu différente du principe qui avoit servi de guide dans la détermination des cristaux cubiques et autres, dont j'ai parlé plus haut. Ce principe, adopté par les diverses sciences qui s'occupent de l'étude de la nature, est, en général, que deux quantités sont censées rigoureusement égales, lorsque l'observation ne donne entre elles aucune différence appréciable; telles sont, par exemple, les durées des deux moyens mouvements de rotation et de révolution de la lune, dont l'égalité regardée comme absolue par les géomètres et les astronomes, sert comme de point fixe dans les calculs relatifs à l'astronomie physique.

175. Le principe dont il s'agit s'applique d'une manière heureuse et satisfaisante aux cristaux de chaux carbonatée. Lorsqu'on divise le prisme he-

taux égalier de cette substance, on observe que chacune des coupes faites sur les arêtes du contour de la base est inclinée de la même quantité, tant sur cette base que sur le pan adjacent du prisme. Si l'on suppose cette égalité rigoureuse, il sera facile d'en conclure que dans le rhomboïde calcare, le triangle *acn* (fig. 9) pl. IX, formé par la demi-diagonale oblique *ac*, par la demi-perpendiculaire *cn* sur l'axe, et par le tiers *an* de cet axe, est en même temps rectangle et isocèle, d'où il suit que $cn = an$, ou $\sqrt{\frac{1}{2}g'^2} = \frac{1}{2}\sqrt{g'^2 - 3g'^2}$. Supprimant les radicaux, et faisant disparaître les dénominateurs, puis simplifiant, $g' = 3p = g''$. Donc $3g' = 3p$, et $g' : p :: \sqrt{3} : \sqrt{2}$.

Nous étions déjà parvenus (34) au même résultat, en partant d'une autre égalité entre le grand angle de chaque face du cristal métastatique et celui du noyau, et il suit de ces deux résultats, que l'angle dont il s'agit est de $101^{\circ} 32' 13''$. La Hire, qui l'avoit mesuré mécaniquement, le jugeoit de $100^{\circ} 30'$. Or, il est plus que probable que la petite différence de $1^{\circ} 13''$ entre les deux valeurs, est ce qui manque au résultat de la mesure mécanique, dont La Hire avoit seulement limité la précision à celle des demi-degrés, et non pas ce qu'auroit donné de trop le calcul fondé sur l'égalité dont nous avons parlé.

178. Je citerai un second exemple tiré de la tourmaline. On connaît des cristaux de cette espèce qui ont la forme représentée (fig. 108) pl. XVII. En mesurant l'incidence de e sur i , on trouve qu'elle est sensiblement égale à celle de l'arête a sur la face P' . Or, les arêtes latérales y, y' des faces e étant parallèles entre elles, et à la diagonale oblique de la face primitive P , il est visible, à la seule inspection du cristal, que ces faces résultent du décroissement 'E' (fig. 108); on voit de même que les pans i (fig. 108) sont dus au décroissement e' (fig. 108); et à l'égard des pans a , dont nous ne parlons ici que pour compléter la notion du cristal, la loi qui les produit a pour signe D.

Soit *gac* (fig. 21) pl. X, la coupe du noyau des tourmalines, et *eg* une ligne située comme l'hypothénuse du triangle e (fig. 108). Il suit de ce qui vient d'être dit, que l'incidence de e sur i est égale à celle de *eg* (fig. 21), sur une ligne menée par le point g , parallèlement à l'axe, ou, ce qui est la même chose, elle est le supplément de l'angle gta , dans l'hypothèse où *eg* seroit la diagonale oblique d'un rhomboïde résultant de la loi 'E'. D'ailleurs, l'angle formé par a avec P' (fig. 108) est égal à l'angle gat (fig. 21), ou, ce qui revient au même, il est le supplément de l'angle ega . Donc $gta = ega$. Donc $ga : ta ::$

sin. ags : cos. ags; et substituant les valeurs algébriques, $\sqrt{1-g^2} : \frac{2n+1}{2n} \sqrt{3p^2-3g^2} :: \sqrt{3g^2p^2-g^2} : g-p$. (Voyez §9. 2^e.) : ou parce que $n=1$, $\sqrt{1-g^2} : \frac{1}{2} \sqrt{3p^2-3g^2} :: \sqrt{3g^2p^2-g^2} : g-p$. Faisant disparaître les dénominateurs, et divisant les deux premiers termes par 2, $\sqrt{g^2} : n \sqrt{3p^2-g^2} :: \sqrt{3g^2p^2-g^2} : g-p$. Et divisant les deux antécédens par g , puis égalant le produit des extrêmes à celui des moyens, $2(3p^2-g^2) = g^2-p^2$; d'où l'on tire $7p^2=3g^2$, et $g:p :: \sqrt{7}:\sqrt{3}$.

177. Au reste, le principe sur lequel sont fondés ces sortes de déterminations, doit être employé avec réserve, parce que dans la comparaison de cette multitude d'angles que présentent les cristaux, on trouve une série de différences qui vont en décroissant, et dont quelques-unes, quoique légères, deviennent appréciables par des mesures prises avec soin sur des corps d'une forme très-prolongée. J'ai moi-même recensé quelquefois des valeurs d'angles que j'avois d'abord un peu altérées, en les concluant d'une égalité qui n'étoit qu'apparente.

Dans les autres cas où les données du genre de celles dont j'ai parlé me manquoient, j'ai tâché de ne m'écarter du principe que le moins qu'il étoit possible. Dans cette vue, je m'enrê-

d'abord immédiatement l'incidence des faces du rhomboïde l'une sur l'autre : cherchant ensuite le rapport le plus simple dont la mesure approchoit d'autant près, pour que la différence pût être négligée sans erreur sensible, j'adoptois ce rapport, en le regardant comme le véritable.

178. Prenons pour exemple le rhomboïde du fer sulfaté, qui est aigu ; j'ai trouvé que la plus petite incidence des faces de ce rhomboïde étoit à très-peu près de $81^{\circ} 30'$. J'ai considéré ensuite que, si le rapport entre le sinus de cet angle et le rayon pouvoit être exprimé en nombres entiers, j'aurois aussi un rapport simple entre g et p . Or, le logarithme du sinus de $81^{\circ} 30'$ est 9,1637007, ce qui donne pour le sinus 14781, bien près de 15000 ; mais le rayon étant 100000, on voit que le rapport 15 à 100 ou 3 à 20, peut être pris, sans erreur sensible, pour le véritable. Nous aurons donc $ap' : p' - g'' :: 20 : 3$, ou, $6p' = 20p' - 20g''$, et $10g'' = 7p'$, ce qui donne $g : p :: 7/10 : 1/10$. Dans cette hypothèse, la plus petite incidence entre les faces du rhomboïde est de $81^{\circ} 23'$, quantité qui ne diffère que de $7'$ de celle de celle qu'avoit donnée l'observation.

179. Les formes primitives dont nous avons parlé jusqu'ici avoient leurs faces toutes égales et semblables entre elles. Mais il y a beaucoup d'exemples, où la disparité entre les unes et les autres s'annonce, soit par la différence des angles que

présentent les diverses coupes , soit en ce que les uns sont moins nettes et moins faciles à obtenir que les autres , soit en ce que les parties latérales du cristal secondaire et celles qui forment les sommets, n'ont pas la même configuration, et sont composées de faces différemment inclinées. On peut toujours, dans ces sortes de cas, déterminer les angles par des moyens analogues à ceux que j'ai exposés précédemment. Mais il reste à trouver le rapport entre les dimensions de la molécule; car, comme entre deux sections, il est possible d'en faire passer une troisième parallèle à l'une et à l'autre, rien n'indique la véritable position de celle qui donneroit des dimensions assorties à la forme de la molécule employée par la cristallisation. En un mot, tout ce que l'observation fait connaître alors, c'est que telle face de la forme primitive est un parallélogramme rectangle; telle autre un parallélogramme oblique, etc. Mais elle ne dit pas si la première est un carré et la seconde un rhombe, ou si, dans le cas contraire, la longueur est double ou triple, etc., de la largeur.

18e. On parvient à cette détermination par la solution inverse des problèmes relatifs aux formes qui sont données, comme *a priori*, c'est-à-dire, qu'on lieu de partir des dimensions connues de la molécule pour chercher les lois de décroissement qui en résultent, on suppose d'avance, au

contraire, que ces lois soient très-simples, et l'on en conclut, à l'aide du calcul, le rapport entre les dimensions de la molécule. C'est ce que je vais établir par un exemple tiré de la variété de péridot, représentée *fig. 103*, et que j'ai nommée *péridot quadrangulaire*.

182. La forme primitive, indiquée par la structure et par l'aspect des cristaux de cette substance, est un parallépipède rectangle, que l'on voit, *fig. 104*, et dont il s'agit de déterminer les trois dimensions C, B et G, qui donneront celles de la molécule intégrante.

Je mesure d'abord l'inclinaison d'une des faces du sommet, celle que *d* (*fig. 103*), sur le plan adjacent M, et je la trouve à peu près de 141° . J'en conclus que dans le triangle mesurateur (*fig. 105*), l'angle *cab* est de $51^{\circ} 50'$ environ, et l'angle *acb* de $38^{\circ} 30'$. Je suppose que le décroissement qui produit la face *d* (*fig. 103*), ait lieu par une simple rangée sur l'arête C (*fig. 104*) : dans cette hypothèse on aura *ab* : *bc* (*fig. 105*), :: B : G (*fig. 104*), :: $\sin. acb$: $\sin. cab$ (*fig. 105*), :: $\sin. a$: $\sin. b$. Ce rapport, réduit à une approximation plus simple, par la méthode des fractions continues, est à peu près celui de 4 à 5, et en l'adoptant, on trouve pour l'angle *cab* $51^{\circ} 30'$.

Je fais un second calcul, dans la vue d'obtenir les termes du même rapport sous la forme de

quantités radicales. Pour y parvenir, je prends le double du logarithme du sinus de $51^{\circ} 30'$, ce qui me donne $19,7870888$, et celui du logarithme du sinus de $38^{\circ} 30'$, savoir: $19,5882999$; je retranche 16 unités à chaque caractéristique, et j'ai pour le rapport des nombres correspondans 3875 à 6124 , qui vaut à peu près $\frac{1}{2}$. Je fais donc $ad = \sqrt{b}$, $de = \sqrt{b}$, et j'ai pour l'angle cad $51^{\circ} 40'$; j'adopte ce rapport, parce qu'il me paraît que l'angle dont il s'agit approche plus de 52° que de 51° ; ainsi l'expression de B (Fig. 104), sera $\sqrt{3}$, et celle de C sera \sqrt{b} .

Pour trouver maintenant l'expression de C (Fig. 104), je considère la face k (Fig. 103), qui visiblement est produite en vertu d'un décroissement sur l'arête B (Fig. 104). Je mène l'incidence de k sur T (Fig. 103), et je la trouve moindre que 120° d'environ un demi-degré, d'où il suit que dans le triangle rectangle axt (Fig. 106), l'angle axt est d'environ $29^{\circ} \frac{1}{2}$. Or, s'il étoit exactement de 30° , on auroit $ax : xt :: t : \sqrt{3}$; mais si l'on suppose que le décroissement ait lieu dans le sens de la largeur, quelle que soit d'ailleurs sa mesure, on aura $ax = bc$ (Fig. 105) $= \sqrt{b}$, ce qui donneroit $xt = \sqrt{24}$, dans l'hypothèse de $ax = 30^{\circ}$. Mais cet angle est un peu moindre que 30° , j'augmente xt d'une petite quantité, en la faisant égale à $\sqrt{25}$ ou à 5. Je trouve, d'après cette donnée, que l'angle axt est

de ag^1ag^1 , et qui s'accorde avec l'observation.

Supposons pour un instant que la base P (fig. 104) soit un carré ; dans cette hypothèse, rx (fig. 106) sera en rapport commensurable avec ab (fig. 105) ; si, par exemple, rx étoit double de ab , on en concluroit que le décroissement se fait par deux rangées en largeur. Or, dans la supposition où l'angle axr (fig. 106) seroit exactement de ag^1ag^1 , $rx : ab :: 5 : \sqrt{5} :: \sqrt{5} : 1$. Il faudra donc que l'on puisse substituer à $\sqrt{5}$ une quantité qui s'en diffère pas sensiblement et qui soit rationnelle. Or, $\sqrt{5} = 2,236$, en se bornant aux millièmes ; et si l'on s'en tient aux dixièmes, on aura $rx : ab :: 22 : 10 :: 11 : 5$. Il y auroit donc onze rangées de sautoirées dans le sens de la largeur, et 5 dans celui de la hauteur, ce qui répugne à la simplicité des lois auxquelles est soumise la structure.

Supposons, au contraire, que l'on ait $rx = C$ (fig. 104), auquel cas la base P sera un rectangle dans lequel $C : B :: \sqrt{5} : 1$, et la face k (fig. 103), résultera d'un décroissement par une simple rangée ; alors les trois dimensions B, C, G (fig. 104), étant entre elles dans le rapport des nombres $\sqrt{5}$, 5 et $\sqrt{5}$, je cherche, d'après ces données, les lois de décroissement d'où résultent les autres faces du cristal.

Le pan a (fig. 103), par lequel je commence, provient évidemment d'un décroissement sur l'a-

rête G (fig. 104). Son incidence sur M (fig. 105), est à peu près de 156° . Soit Ag^i (fig. 107) le triangle mensurant, dans lequel gi est parallèle à M , et Ag à T , d'où il suit que l'angle g^iM doit être d'environ 66° . De plus, gi doit être égale à 3 ou en être un multiple; de même g^i doit égaler $\sqrt{5}$ ou en être un multiple.

Or, en faisant simplement gi en 3 et g^i en $\sqrt{5}$, je trouve l'angle g^iM de $65^\circ 54'$, d'où je conclus que le plan α (fig. 103) résulte d'un décroissement par une seule rangée sur l'arête G (fig. 104).

Je passe à la face ϵ (fig. 105), et j'observe d'abord que l'arête ϵ , qui la termine latéralement, est perpendiculaire sur x , d'où il suit qu'elle est dans le plan de la base P (fig. 104). D'une autre part, le plan α (fig. 103), par la nature du décroissement qui le produit, est situé parallèlement à un plan qui passeroit par une des diagonales de la base P (fig. 104) et par celle qui y correspond sur la base opposée, d'où j'infère que l'arête ϵ (fig. 105) est parallèle à ces diagonales, et qu'ainsi la face ϵ résulte d'un décroissement ordinaire sur l'angle A , dont il s'agit de trouver la loi.

Soit AA (fig. 108) la même base que fig. 104. Je mène la diagonale $A'A'$ (fig. 108), puis AN perpendiculaire sur cette diagonale. Soit $an y$ (fig. 109) le triangle mensurant dans lequel on

sera égale à AN (fig. 103) ou en sera un multiple, et xy (fig. 109) sera de même égale à G ou en sera un multiple. Or, $C=5$, $B=4\sqrt{3}$; donc

$$A'A'=4\sqrt{3}a, AN = \frac{B+C}{A'A'} = \frac{\sqrt{3}+5}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{12}+5}{4} = \frac{\sqrt{12}}{4} + \frac{5}{4}.$$

Donc $AN : G$ (fig. 104) :: $\sqrt{12} : \sqrt{3}$:: $\sqrt{12} : \sqrt{48}$; mais l'angle que fait x avec n (fig. 103), est d'environ 14° , d'où il suit que l'angle xy (fig. 109) est à peu près de 54° . Or, en faisant $ax = \sqrt{12}$ et $xy = \sqrt{48}$, on trouve que $xy = 54^{\circ} 10'$. Donc le décroissement a lieu par une seule rangée.

Je ne ferai qu'indiquer les décroissements qui donnent x et h (fig. 103); le premier se fait par deux rangées sur l'arête G (fig. 104), en allant de gauche à droite sur le face T, ce qui donne pour l'incidence de x sur T (fig. 103), $131^{\circ} 49'$; le second a lieu par deux rangées en hauteur sur l'arête B (fig. 104), ce qui donne pour l'incidence de h sur T $130^{\circ} 31'$; ainsi le sque du cristal sera

M G G T C A B B F;
M n s T d e h h p;

que les dimensions supposées conduisent aux lois les plus simples possibles dans leur ensemble, et qui d'ailleurs sont les mêmes que celles qui ont lieu nécessairement, du moins pour l'ordinaire, dans les cristaux dont les molécules sont déterminées d'avance, en sorte que les résultats de part

et d'autre se servent mutuellement de preuve , par l'accord qui régné entre eux.

182. Je terminai cet article par une remarque qui confirme encore la méthode que je viens d'exposer pour la détermination des molécules, d'après les lois de décroissement que subissent les cristaux secondaires. J'ai dit (179), que parmi les joints naturels situés en divers sens dans ces mêmes cristaux, les uns étoient plus nets et plus faciles à saisir que les autres; et telles sont les dimensions qui résultent des lois les plus simples de décroissement, que les faces qui répondent à ces joints diffèrent aussi les unes des autres en grandeur. Mais il y a mieux, c'est que souvent les faces que la théorie prouve devoir être les plus étendues, sont précisément celles qui correspondent aux joints les plus difficiles à saisir; et cela paroît devoir être ainsi, puisque les molécules ayant de ce côté un plus grand nombre de points de contact, doivent adhérer plus fortement entre elles. Je citai pour exemple le chaux sulfatée, où la molécule déterminée d'après les lois de décroissement les plus simples, est un prisme droit quadrangulaire, ayant pour base un parallélogramme obliqueangle, dont le plus grand côté est à la hauteur du prisme, dans le rapport de 15 à 52. On observe en même temps que les joints latéraux sont ternés et cèdent difficilement à la division mécanique,

tandis que du côté des bases, les lames ont une surface lésistants et se séparent avec une grande facilité. Au reste, je ne voudrais pas assurer que ce résultat fut général, parce qu'il est possible que quelque autre cause, telle que la distribution des substances élémentaires dans l'intérieur de la molécule intégrante, se combine avec le nombre des contacts, pour produire l'adhérence (1).

De la possibilité de substituer hypothétiquement les formes secondaires des cristaux aux véritables formes primitives, de manière à obtenir encore des résultats conformes aux lois de la structure.

183. Nous avons déjà eu plusieurs fois occasion de remarquer qu'une forme qui étoit primitive relativement à telle espèce de minéral, devenoit secondaire dans une autre espèce. Ainsi le cube, qui dans le plomb sulfuré prend le caractère de forme primitive, suit la fonction de forme secondaire dans le chaux fluorée, tandis que l'octaèdre qui est la vraie forme primi-

(1) J'ai trouvé que dans plusieurs des cas où la molécule constructrice se subdivise en molécules intégrantes d'une forme différente, il étoit aussi égal plutôt à l'incertitude des lois de la première que de la seconde, pour parvenir au résultat dont il s'agit.

tive de cette dernière substance, se retrouve comme forme secondaire dans le plomb sulfuré,

Il résulte de cette réciprocité, dont je pourrois multiplier les exemples, que si l'on se représentait sur la véritable forme primitive de quelque des espèces où elle a lieu, en lui substituant une forme qui ne seroit que secondaire, on pourroit également déduire de celle-ci les autres formes, et en particulier la forme primitive, par des lois régulières de décroissement, en sorte que les molécules auxquelles s'appliqueroient ces lois seroient semblables à celles qui résulteroient de la subdivision du noyau hypothétique.

Mais on sait que les espèces qui sont en commerce de formes primitives et secondaires, si je puis parler ainsi, se réduisent, du moins à en juger d'après l'état actuel de nos connaissances, à celles où ces formes elles-mêmes portent un caractère particulier de simplicité et de perfection, et peuvent être regardées comme autant de limites par rapport à toutes les formes de leur genre. Telles sont le cube, l'octaèdre régulier et le dodécaèdre rhomboïdal. On n'a point encore trouvé que les autres formes qui s'écartent de ces limites, fussent communes à des minéraux de nature différente.

184. J'ai désiré de savoir si la cristallisation des substances placées hors de ces limites n'offri-
roit

rait pas cependant exclure la possibilité de substituer hypothétiquement une forme secondaire à la forme primitive, et d'en faire dériver cette dernière, ainsi que toutes les autres, à l'aide de la théorie des décroissemens, et j'ai trouvé que l'hypothèse dont il s'agit s'étendait généralement aux cristaux de toutes les substances, malgré les diversités et même les contrastes que présentent souvent les formes cristallines relatives à une même espèce. Il est presque inutile d'avertir que la forme secondaire substituée au vrai noyau doit être choisie parmi les six que l'observation nous a fait reconnaître jusqu'ici comme étant les seules formes primitives des cristaux.

Pour peu que l'on ait réfléchi sur la théorie, on conçoit d'eff, à l'aide du simple raisonnement, que cette substitution doit être permise. Il suffit pour cela de considérer que les axes des cristaux secondaires sont en rapport commensurable avec ceux des cristaux primitifs, et qu'il en est de même des diverses lignes dont les positions se correspondent dans les uns et les autres. Par exemple, l'axe du rhomboïde inverse de la chaux carbonatée est triple de celui du noyau, et sa diagonale oblique, qui répond, par sa position, à l'arête supérieure du noyau, est pareillement triple de cette arête. Or, les lois de décroissement et les formes des molécules auxquelles ces lois s'appliquent ayant nécessaire-

ment une liaison avec les rapports dont il s'agit, la propriété qu'ont les termes de ces rapports de pouvoir être exprimés en nombres rationnels, laisse entrevoir la possibilité de choisir, à volonté, pour forme primitive, l'un des solides qui les présentent, et de faire rentrer dans sa structure celle de l'autre solide, pris comme forme secondaire.

J'ai vérifié ce raisonnement par un grand nombre d'applications directes. Je me bornerai ici à en citer quelques-unes, que je prendrai dans l'espèce de la chaux carbonatée; et lorsque ces applications seront simples, je ne donnerai que les résultats, en supprimant les calculs, que chacun retrouvera facilement, à l'aide des méthodes exposées dans l'article relatif à la théorie du rhomboïde.

185. Je supposerai d'abord que l'on veuille substituer au véritable noyau de l'espèce dont il s'agit, le rhomboïde que j'ai appelé *chaux carbonatée inverse*, et dont le signe est E' B. Ce rhomboïde ayant les diagonales obliques de ses faces situées vis-à-vis des bords supérieurs du vrai noyau, sur lesquels elles s'inclinent d'un certain nombre de degrés, si l'on conçoit que la figure 110 le représente lui-même à son tour la fonction de noyau, il faudra que le rhomboïde primitif, qui deviendra forme secondaire, tourne aussi les diagonales obliques de ses faces vers les bords

B, B, du noyau hypothétique. Or, on trouve (33) que dans ce cas le signe qui le représente est B.

J'ai cherché aussi la loi qui, dans la même hypothèse, donneroit le rhomboïde équiaux, dont le signe rapporté au véritable noyau est B, par où l'on voit qu'il est à ce même noyau ce qu'est celui-ci au rhomboïde inverse considéré à son tour comme noyau. Or, si l'on continue de conserver aux cristaux leurs positions respectives, il sera facile de voir que les faces du rhomboïde équiaux doivent être tournées vers celles du rhomboïde inverse, que nous substituons ici au vrai noyau. Dans il résulte d'un développement sur l'angle A, et le calcul (3g) prouve que ce développement est celui qu'exprime le signe A.

186. Je prends pour troisième exemple la chaux carbonatée contrastante, dont le signe réel est c. En suivant toujours le même principe, pour les positions relatives des cristaux, on voit que ses faces doivent être tournées vers les angles latéraux du noyau fictif, et la loi qui le fait dépendre de ce noyau a pour expression B. (Fig. 61.).

187. Veut-on ramener au même noyau fictif la structure de la chaux carbonatée astératique, ou (fig. 111.), dont le signe, relative-

B 2

ment au véritable noyau, est \hat{D} ? Si l'on observe que les bords aa , ar , ak , etc., de ce solide se confondent avec les arêtes inférieures du noyau dont il s'agit, on concevra que les faces du noyau hypothétique ou du rhomboïde inverse doivent être taillées, au contraire, vers les arêtes longitudinales les plus courtes, telles que aa , ak , etc. Or, on prouve par le calcul que l'inclinaison de chacune de ces arêtes sur l'axe est égale à celle de la diagonale oblique du rhomboïde inverse sur le même axe, ce qui indique que les décroissements qui donnent le cristal métastatique rapporté à ce même rhomboïde, doivent se faire parallèlement à ses diagonales obliques, aa , ce qui revient au même, sur ses angles latéraux. La loi qui satisfait à cette condition a pour signe $E^{\circ}E$. (Voyez 59).

188. Nous avons supposé jusqu'ici que le noyau hypothétique avoit dans l'intérieur du cristal une position dépendante du véritable noyau dont il doit originaire. Mais une même forme secondaire peut naître de diverses lois de décroissement qui agissent sur différentes parties d'un même noyau.

Ainsi, le rhomboïde inverse qui provient de la loi exprimée par $E^{\circ}E$, pourroit également résulter de celle dont le signe est \hat{c} . Or, dans ce dernier cas, ses faces correspondraient à celles du

noyau, d'où il suit que pour faire dépendre le cristal métastatique du changement inverse accidentel comme noyau hypothétique, on peut aussi lui donner la position relative à ce même axe, en supposant que les diagonales obliques de ses faces correspondent aux arêtes longitudinales, les plus longues ar , am , etc. (fig. 111). Proposons-nous de déterminer la loi qui satisfait à cette nouvelle hypothèse.

Soient ov , $o'r$ (fig. 112), les mêmes triangles que (fig. 111); par les points a , k , je fais passer deux plans, l'un ack perpendiculaire à l'axe, l'autre ack parallèle au même axe, puis je trace les hauteurs ve , be des triangles formés par ces plans. Soit $f'g$, un troisième plan parallèle à la face correspondante du noyau hypothétique. Par le point f , où ce plan coupe ce , je trace la ligne fl . Il s'agit de trouver le rapport entre lf et kl , qui nous apprendra si la loi relative à l'hypothèse que nous faisons ici est simple ou intermédiaire, et dans ce dernier cas, nous donnera le rapport entre x et y .

Évaluons séparément fl et kl . 1°. Pour fl . Les triangles semblables afl , ov donnent ce : ca :: al : fl . Cherchons ce, ca et cl .

Le triangle ack , qui est situé parallèlement à l'axe, est semblable au triangle alc (fig. 47) pl. XII, qui a la même position, puisqu'il coupe verticalement

ment une des autres obliques fa , la plus longue du tétraèdre. Donc $ca : ce$ (Fig. 110) :: $cd : db$ (Fig. 47), :: $1 : \frac{1}{2} \sqrt{3} :: \sqrt{4} : \sqrt{3}$. Soit ca (Fig. 112) = $\sqrt{4}$, auquel cas ce et en $\sqrt{3}$. Donc nous connaissons en et ce ; reste à trouver ed .

Le triangle feg étant incliné à l'axe comme une des faces du rhombéïde inverse qui représente ici le noyau, nous aurons, en appelant g et p les demi-diagonales, $de : ef :: \sqrt{1/2} g^2 : \frac{1}{2} \sqrt{3p^2 - 3g^2}$, et à cause que $g = \sqrt{3}$ et $p = \sqrt{2}$, $de : ef :: 1 : 2$. Donc $ed = 2de$.

Maintenant on concevra, avec un peu d'attention, que de est à ce comme la perpendiculaire menée du point r sur De est à la partie correspondante de cet axe, c'est-à-dire, comme a est à b . Mais $ce = \sqrt{3}$. Donc $de = \frac{1}{2} \sqrt{3}$. Donc $ed = \frac{1}{2} \sqrt{3}$. Donc $ef = ce - ed = \sqrt{3} - \frac{1}{2} \sqrt{3} = \frac{1}{2} \sqrt{3}$.

La proportion $ce : en :: ef : fl$ deviendra donc $\sqrt{3} : \sqrt{4} :: \frac{1}{2} \sqrt{3} : fl = \sqrt{1/2}$.

$$\text{2. Pour } de, de = \sqrt{ef^2 + (ce)^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + 3} = \sqrt{\frac{15}{4}}.$$

Donc $de : fl :: \sqrt{15} : \sqrt{4} :: \sqrt{45} : \sqrt{3} :: 3\sqrt{5} : \sqrt{3} :: 3p : g$, d'où l'on conclura que le décroissement est intermédiaire.

Soit feg (Fig. 113) le même triangle que Fig. 112, et d'où le rhombe dont ce triangle est écu-

se faire partie, et qui est une des faces du rhomboïde inversé. *ap* étant *x* et *pf* étant *y*, il y a autant d'arêtes de molécule contenues dans *x + y*, qu'il y a de demi-diagonales *p* contenues dans *ab*, et autant d'arêtes de molécule contenues dans *af* ou *x - y*, que *fi* renferme de diagonales *g*. Donc $x + y : x - y :: 3 : 1$. D'où l'on tire $x : y :: 2 : 1$.

Reste à déterminer *n*. Or, d'une part, le sinus de la moitié de l'incidence mutuelle des faces *ac*, sur (fig. 111 et 112) est en raison, en général, comme

$\sqrt{\frac{1}{2}(\frac{2nxy}{x+y} + x - y)^2 + (\frac{nxy}{x+y} - x + y)^2} : (x + y) \sqrt{a^2} \quad (\text{voyez 77}).$ D'une autre part, les mêmes quantités, dans le cristal rhomboïdique, sont entre elles comme $\sqrt{2g}$ à $\sqrt{3}$ (voyez 56).

Faisant dans le premier rapport $x = 2, y = 1, a = \sqrt{36}$, $g = \sqrt{3}$, puis le mettant en proportion avec le second rapport, nous aurons,

$$\sqrt{\frac{1}{2}(\frac{4n}{3} + 1)^2 36 + (\frac{2n}{3} - 1)^2 36} : 3\sqrt{36} :: \sqrt{2g} : \sqrt{3}.$$

Et faisant disparaître les signes radicaux, puis simplifiant, $(\frac{4n}{3} + 1)^2 + (\frac{2n}{3} - 1)^2 : 9 :: 2g : 3$.

Développant les quantités $(\frac{4n}{3} + 1)^2$ et $(\frac{2n}{3} - 1)^2$, puis faisant de la proportion une équation, et réduisant, $20n^2 + 4n = 25g$. Ou $n^2 + \frac{1}{5}n$

en $\frac{259}{20}$. D'où l'on tire $n = -\frac{1}{12} \pm \frac{11}{12}$, et prenant le signe positif, $n = \frac{11}{12} = \frac{1}{2}$.

La cristallinité statique, dans la supposition dont il s'agit ici, seroit donc pour signe $(\frac{1}{2}E^2 D^2 B^2)$.

189. Ainsi on peut faire varier hypothétiquement soit la forme du noyau, relativement à une même forme secondaire, soit la position de ce noyau; et cette détermination de prêter que l'on a donnée aux substances minérales plus étendue que les autres en métamorphoses, et en particulier à la chaux carbonatée, n'est pas seulement vraie à l'égard des formes extérieures dont ces substances sont susceptibles; elle s'applique encore dans un certain sens à la forme primitive, qui, toujours semblable à elle-même et invariable dans le réel, est une esquisse de prêter en théorie.

190. Choisissons une forme primitive hypothétique différente du rhomboïde, et qui ne peut être, dans le cas présent, que le prisme hexaèdre régulier. Pour appliquer la théorie à cette forme, il faut avoir un rapport déterminé entre la hauteur du prisme et le côté de la base. J'ai établi ce rapport d'après la supposition que le rhomboïde primitif dépendit d'un décroissement par une rangée sur trois arêtes G (fig. 114) prises alternativement autour de la base supérieure,

et sur celles de la base inférieure qui s'attachent avec les précédentes : ce qui donne $\overset{1^{\text{re}}}{C}$ à $\overset{2^{\text{e}}}{B}$, pour signe représentatif. On trouve que dans ce cas le rapport entre l'arête C ou B et la hauteur G , est celui de 2 à $\sqrt{3}$.

191. Bornons-nous à une seule application, qui sera assez pour objet le cristal métastatique (fig. 111). La forme de ce cristal combinée avec celle du prisme hexaèdre, donne le polyèdre représenté (fig. 113), qui est une des formes secondaires réellement existantes dans l'espèce de la chaux carbonatée, et que j'ai nommé *biastrum*. Or il est facile de juger, à la seule inspection de la figure, que si l'on prend les lignes Ad , Be , qui sont les côtés des angles obtus des trapèzes latéraux, pour les lignes de départ des décroissemens, ceux-ci auront lieu sur les angles aigus comme BdG (fig. 114). J'ai trouvé que dans ce cas le décroissement se faisoit par deux rangées, en sorte que son signe représentatif sera 'A A'.

Si le noyau hypothétique substitué en véritable résultoit d'une loi de décroissement un peu compliquée, il pourroit arriver que cette complication s'incrût de beaucoup en passant dans les lois qui établissent une dépendance entre ce noyau hypothétique et les autres formes cristallines. J'ai essayé de substituer au rhomboïde

principal de la chaux carbonatée, celui que j'appelle cuboïde, parce que sa forme se rapproche beaucoup de celle du cube. Cette variété rap-

portée à son véritable noyau a pour signe $\frac{1}{2}$, et parce que ses faces se rejettent en arrière vers le sommet opposé à celui que regarde l'angle sur lequel le décroissement prend naissance, il en résulte que ces mêmes faces correspondent aux arêtes du vrai noyau.

D'après cela si l'on veut chercher la loi qui donneroit le cristal métastatique (fig. 111), dans l'hypothèse d'un noyau semblable au cristal cuboïde, il faudra concevoir que les diagonales obliques des faces de ce noyau soient correspondentes, par leur position, aux arêtes les plus courtes oa , ob , etc. Or, en faisant $g = \sqrt{12}$, $p = \sqrt{13}$, et en suivant une marche analogue à celle que nous avons prise (186), pour déduire le cristal métastatique du cuboïde inverse pris comme noyau, on trouvera d'abord que la loi de décroissement relative au cuboïde est de même une loi intermédiaire, dans laquelle x est 7 et y est 5.

Présentement d'une part le rapport général $\sqrt{\frac{(axy + x - y) x' + (axy - x + y) y' + 4g^2}{(x + y) V a^2}}$ (voyez 77), entre le sinus et le cosinus de la moitié de l'incidence de mon rayon, et d'une autre part le rapport particulier

$\sqrt{5} : \sqrt{5}$ entre les mêmes quantités (51), dans le cristal métastatique; et faisant $x = y, y = 5, x' = 61, g' = 12$, puis faisant disparaître les radicaux et simplifiant, on trouvera $9(55n+1) + 4(55n-2) : 12 \propto 27 : 5 : 1$. D'où l'on tire $3555n + 140 = 369$, et $n = \frac{345}{3555} = \frac{23}{237}$.

Cette équation résolue donne $n = \frac{-7}{3555} \pm \frac{1008}{3555}$, et prenant le signe positif, puis réduisant, $n = \frac{1001}{3548} = \frac{11}{38}$.

192. Les résultats qui me restent à exposer, et qu'on peut regarder comme une extension des précédents, ne sont pas seulement propres à piquer la curiosité; ils ont encore leur usage dans la théorie des décroissemens intermédiaires, pour abréger et faciliter les calculs.

Nous avons vu (57) que ces décroissemens, lorsqu'ils agissent sur les angles latéraux d'un rhomboïde, produisoient, en général, des dodécaèdres, tels que BCX (fig. 26) *et* XI , du genre de celui que nous appelons *rétractatique*.

Conservons pour un instant que ces dodécaèdres soient divisibles de la même manière que le cristal rétractatique, c'est-à-dire, par des plans BCQ , CQN , etc., il est évident que le résultat de la division sera un rhomboïde.

Or, je me propose de faire voir que si l'on

substitue ce rhomboïde au véritable noyau, on pourra en déduire le dodécèdre, à l'aide d'un décroissement sur les bords inférieurs, par une ou plusieurs rangées de moléculas rhomboïdales de la même forme. De plus, on trouve que les deux rhomboïdes généraux du dodécèdre sont aussi dans une dépendance mutuelle, en sorte que le noyau fictif peut devenir forme secondaire relativement au véritable noyau, et réciproquement.

193. Cherchons d'abord le rapport général entre les deux demi-diagonales g' et g'' du noyau hypothétique.

En reprenant ici la *fig. 15, pl. X*, dans laquelle st est la coupe principale d'un rhomboïde de forme primitive, et pd , dv , pg , etc., sont les arêtes longitudinales d'un dodécèdre résultant d'un décroissement sur les bords inférieurs du noyau, il sera aisé de voir que la distance entre les parties ps et us de l'axe total, situées de part et d'autre d'une même perpendiculaire gs , est égale au tiers de l'axe du noyau. Car $us = ps$. Donc $us + ps + us = us = \frac{1}{3} us$.

Cela posé, la ligne gs (*fig. 27*) étant aussi une perpendiculaire sur l'axe, relativement au noyau hypothétique dans lequel par les sections faites suivant les plans BCQ , CQS , etc. (*fig. 26*), nous aurons $ch = ct$ (*fig. 27*) $= \sqrt{\frac{1}{2}p^2 - \frac{1}{2}g^2} = \sqrt{p^2 - g^2}$.

$$\text{Or, } ex : ch :: pr : dr :: a : \frac{x + ny + x - y}{3ny - 3x + 3y} \\ a : \frac{ny + nx + y}{3ny + 3x + 3y}. \text{ (Voyez 77 et 80).}$$

Soit e le rapport de ex à pr , on voit que l'on ait, $ex = e \times pr$, ou $ex = a \times \frac{ny + x - y}{3ny - 3x + 3y}$

On aura d'une autre part $ch = a \times \frac{ny + nx + y}{3ny + 3x + 3y}$

De plus, $ex : pr :: ge : dr$; ou $e \times pr : pr :: ge : \sqrt{g^2}$. Donc $ge = e \sqrt{g^2}$. Mais ge a aussi pour expression $\sqrt{g^2}$. Donc $g' = eg$

Substituons d'abord à la place de ch et de ex leurs valeurs dans l'équation $ch - ex = \sqrt{p'^2 - g'^2}$,

$$\text{elle deviendra } a \times \frac{ny + nx + y}{3ny + 3x + 3y} - a \times \frac{x + ny - ny}{3ny - 3x + 3y}$$

$$= \sqrt{p'^2 - g'^2}; \text{ et réduisant, } a \times \frac{x + ny - ny}{3(ny - x + y)}$$

$$= \sqrt{p'^2 - g'^2} = \sqrt{p'^2 - x^2 g'^2}, \text{ à cause de } g' = eg$$

$$\text{D'où on tire, } p' = \sqrt{\frac{1}{4} a^2 \left(\frac{x + ny - ny}{ny - x + y} \right)^2 + \frac{1}{4} e^2 g^2}$$

$$\text{Donc } g' : p' :: g : \sqrt{\frac{1}{4} a^2 \left(\frac{x + ny - ny}{ny - x + y} \right)^2 + \frac{1}{4} e^2 g^2}$$

194 Dans les calculs précédents, nous avons supposé ch plus grande que ex (fig. 27), ce qui a lieu toutes les fois que les arêtes QX, BX, etc. (fig. 28), tournées vers les faces du noyau sont plus minces et plus courtes que les internod-

divisés CX , NX , etc. Mais il y a un terme, ainsi que nous l'avons vu, où toutes les arêtes sont égales, et où l'on a, par une suite nécessaire, $ch = cx$; et au-delà de ce terme, cx devient plus grande que ch . Dans ce cas, si au lieu de l'équation $ch - cx = \sqrt{p^2 - \frac{1}{3}g^2}$, on prend $cx - ch = \sqrt{p^2 - \frac{1}{3}g^2}$, et que l'on opère comme ci-dessus, on trouve $g' : p' :: g :$
 $\sqrt{1 + \frac{(nxy - x - y)^2}{(nxy - x + y)^2}} + \frac{1}{3}g^2$, rapport qui ne diffère du premier que par le changement de signe, dans le numérateur de la fraction qui multiplie $\frac{1}{3}g^2$.

195. Maintenant soit N le nombre de rangées construites sur les bords inférieurs du noyau hypothétique, dans le passage au dodécèdre, et soit E la partie de l'axe de ce dodécèdre qui existe de chaque côté l'axe du noyau hypothétique. Nous supposons d'abord que ch soit plus grande que cx .

La formule relative aux développemens sur les bords inférieurs (voyez 45), donne $E = \frac{1}{N-1} \sqrt{9p^2 - \frac{1}{3}g^2} = \frac{1}{N-1} 3\sqrt{p^2 - \frac{1}{9}g^2}$. Mais $\sqrt{p^2 - \frac{1}{9}g^2} = \frac{\omega}{3} \left(\frac{x + y - nxy}{nxy - x + y} \right)$. Donc
 $E = \frac{\omega}{N-1} \left(\frac{x + y - nxy}{nxy - x + y} \right)$

D'une autre part, $ch + ex$ est l'axe du dodécédre, et $3ch - 3ex$ est celui du noyau flétri.

$$\text{Donc } E = \frac{1}{2} \{ (ch + ex) - (3ch - 3ex) \} \\ = \frac{1}{2} (ch + ex - 3ch + 3ex) = \frac{1}{2} (2ex - 2ch) \\ = ex - ch = ac \frac{(4xy + x - y - xy - ex - y)}{2xy - x + y}$$

$$= ac \frac{(xy - y)}{xy - x + y}. \text{ Egalant les deux valeurs de}$$

E , et supprimant ac , ainsi que le dénominateur commun $xy - x + y$, on aura $xy - y$

$$= \frac{1}{N-1} (x + 2y - xy). \text{ Donc } N - 1$$

$$= \frac{x + 2y - xy}{xy - y}. \text{ D'où l'on tire, } N = \frac{x + y}{xy - y}.$$

On voit par là que N sera toujours un nombre rationnel, d'où il suit que le dodécédre est forme secondaire relativement au noyau flétri.

$$\text{La même formule donne } a = \frac{2y + x + y}{Nxy}.$$

$$\text{196. Si l'on suppose } ex \text{ plus grande que } ch, \\ \text{on aura } \sqrt{p'} = \frac{1}{2} p' = ac \frac{(xy - x - xy)}{xy - x + y}.$$

Employant cette valeur au lieu de la première, et faisant attention que l'on a dans le même cas $E = \frac{1}{2} \{ (ex + ch) - (3ex - 3ch) \}$, on trouvera $N = \frac{xy - x}{x + y}$, quantité qui n'est autre chose qu'une inversion de celle à laquelle conduit la supposition de ch , plus grande que ex .

On tire de la même formule $x = \frac{Na + Ny + y}{2y}$.

197. Pour faire quelques applications, représentons d'abord la variété de chaux carbonatée, que j'ai nommée *paradoxe*, et que nous avons déjà considérée précédemment.

La fig. 116 pl. XIII, représente cette variété avec toutes ses faces, parmi lesquelles les pentagones $abdlg$, $acale$, etc., résultent de la loi intermédiaire ('E' D'B'); les quadrilatères $bédf$, $cdfe$, qui sont des trapèzes, appartiennent au cristallin tactatique, et les hexagones $abdlar$, $abecar$, au rhomboïde inverse.

Supposons que l'on se soit assuré, en faisant l'observation dont j'ai parlé plus haut, que dans la loi intermédiaire qui donne les grandes faces du cristal, $x = a$, et $y = 1$. Supposons de plus, qu'à l'aide de la formule qui exprime le rapport de bo à an (fig. 25), et sert à calculer l'inclinaison de $carie$ sur $anony$, on ait trouvé $a = 2$, il sera facile, au moyen des résultats précédents, d'avoir aussi l'inclinaison de $carie$ sur $abdlg$.

Cherchons d'abord les deux demi-diagonales du noyau $foff$, et faisant attention que dans le cas présent ah (fig. 27), est plus grande que ca .

Nous aurons donc en général, $g' : p' :: g :$
 $\sqrt{1 + \left(\frac{x + y - \frac{xy}{2}}{\frac{xy}{2} - x + y} \right)^2} + \frac{1}{2}g'$ (voyez 195), et
 parce

parce que $a' = 9$, $g' = 3$, $x = 2$, $y = 1$, $z = 1$,
 $g' : p' :: \sqrt{3} : \sqrt{(4-x)^2 + 1} :: \sqrt{3} : \sqrt{3}$, ce
 qui fait connaître que le noyau fictif est sem-
 blable au rhomboïde inverse, résultat d'autant
 plus remarquable que les faces terminales, ainsi
 que nous l'avons dit, proviennent réellement de
 la loi E'E, qui donne ce même rhomboïde.

198. Maintenant si dans la formule $N = \frac{x+z}{xy-y'}$,
 nous faisons x ou z , y ou 1 , n ou 1 , elle donnera
 $N = 3$, d'où il suit que le dodécèdre auquel ap-
 partiennent les faces *delg*, existe, fig. (Ag. 116),
 pourroit être produit en vertu d'un décroisse-
 ment par trois rangs sur les bords inférieurs du
 rhomboïde inverse, considéré comme forme pri-
 mitive.

Or l'arête *gg'*, comprise entre les pentagones
delg, *carie*, seût seule au-dessus d'une des
 arêtes supérieures B (Ag. 116), du noyau fictif,
 si nous posons la formule relative aux décrois-
 sements ordinaires sur les bords inférieurs (45),
 le sinus de la moitié de l'inclinaison cherchée

$$\text{seroit au cosinus :: } \sqrt{\left(\frac{zN \pm 1}{gN - 3}\right)^2 x^2 + 4g'} : \\ \sqrt{\left(\frac{z}{N-1}\right)^2 + x^2}. \text{ Mais } g = \sqrt{3}, x = \sqrt{36}, N = 3.$$

Donc sin. : cos. :: $\sqrt{(1)^2 36 + 4} : \sqrt{(1)^2 12} ::$
 $\sqrt{40} : \sqrt{3}$, ce qui est le même rapport auquel
 on parvient d'une manière beaucoup mieux

simple, par la méthode que nous avons indiquée (34), à l'article des décroissemens intermédiaires.

199. Dans les cristaux où les faces terminales sont nettes, et ont une certaine étendue, la parallélisme des lignes ax , ai , est facile à reconnaître, en sorte qu'il suffit de savoir que ces faces appartiennent au rhomboïde inverse, pour en conclure que le moyen fictif est semblable à ce rhomboïde. Si de plus on a trouvé les valeurs de x et de y , on aura facilement celle de p , en se servant de l'analogie $g' : p' :: g :$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{x + y - xy}{xy - x + y} \right)^2} + \frac{1}{2}g.$$

Ces faisant $x = 3$, $g = 3$; on aura $y = 7$, $g' = \sqrt{5}$, $p' = \sqrt{5}$.

On aura $\sqrt{5} : \sqrt{5} :: \sqrt{5} : \sqrt{\left(\frac{4 - 2x}{2x - 1} \right)^2 + 1}$.

Ce qui donne $\left(\frac{4 - 2x}{2x - 1} \right)^2 = 4$. Et divisant tout

par 4, $\left(\frac{2 - x}{x - 1} \right)^2 = 1$; d'où l'on tire, $4 = 4x + x^2 = 4x^2 - 4x + 1$, et $x = 1$, après quoi l'on trouvera, comme ci-dessus, $N = 3$.

On pourra alors calculer l'incidence mutuelle des faces $adilg$, $adip$, d'après le rapport donné par les formules ordinaires (45), pour les décroissemens sur les bords. Ainsi, en général, le sinus de la moitié de l'incidence proposée sera au

$$\cos. :: \sqrt{\left(\frac{N+2}{3N-3}\right)^2 a^2 + 1} g : \sqrt{\left(\frac{N}{N-1}\right)^2} a.$$

Or, dans le cas particulier dont il s'agit, $N = 3$, $a' = 36$, $g' = 3$.

Donc sin. : cos. :: $\sqrt{(1)^2 36^2 + 1} : \sqrt{(1)^2 12} :: \sqrt{37} : \sqrt{13}$, rapport qui est le même que celui auquel conduit la formule des diérescences intermédiaires, composée des expressions de $4a$ et de ab (fig. 116) pl. XL (Payer 58).

Quant à l'incidence de abg sur ac (fig. 116), nous l'avons déterminée plus haut (138), à l'aide de la même méthode.

200. Examinons s'il est possible que le noyau fictif soit semblable au véritable. Soit toujours $x = a$, $y = 1$. Si nous voulons de prendre la chaux carbonatée pour exemple, nous aurons $g' = g = \sqrt{3}$, et $p' = p = \sqrt{2}$.

Donc la proportion $g' : p' :: g :$

$$\sqrt{1 + a^2 \left(\frac{x+y-axy}{axy-x+y} \right)^2} + 1 g' \text{ deviendra, } \sqrt{3} :$$

$$\sqrt{2} :: \sqrt{3} : \sqrt{\left(\frac{4-2a}{2a-1} \right)^2 + 1}.$$

Donc $\left(\frac{4-2a}{2a-1} \right)^2 + 1 = 2$. D'où l'on tire $a = \frac{1}{2}$.

Substituant à la place de a , de x et de y leurs valeurs, dans l'équation $N = \frac{x+y}{axy-y}$, elle de-

vient Num $\frac{2}{\frac{1}{2}-1}$ mol., comme dans le cristal métastatique. Ainsi ce polyèdre est susceptible d'être produit en vertu de deux lois de décroissement, l'une simple et par deux rangées sur les bords inférieurs du noyau, l'autre intermédiaire et mixte sur les angles latéraux, par cinq rangées en largeur et quatre en hauteur, de molécules doubles.

201. Supposons *ex* plus grande que *ch*. Le rapport entre *g'* et *p'* devient alors, $g' : p' :: g :$

$\sqrt{1 + \left(\frac{axy - x - ay}{axy - x + y} \right)^2} + 1 g'$. Soit toujours $g = \sqrt{3}$, $a' = g$, $x = 2$, $y = 1$. Faisons de plus $N = a$. L'équation $a = \frac{Nx + Ny + x}{xy}$, deviendra $a = \frac{7}{2}$.

Dont $g' : p' :: \sqrt{3} : \sqrt{\left(\frac{\frac{7}{2} - 1}{\frac{7}{2} - 1} \right)^2 + 1} :: \sqrt{3} : \sqrt{\frac{7}{2} + 1} :: \sqrt{3} : \frac{3}{2} \sqrt{3}$, d'où il résulte, que dans ce cas le noyau fictif est semblable au rhomboèdre équale.

On pourra, en suivant une marche analogue, trouver le rapport entre *g'* et *g*, *p'* et *p*, *a* et *N*, pour le cas où le nombre de rangées contraintes le long de B (fig. 200) est le plus grand, et faire de même différentes applications des formules auxquelles on sera parvenu.

202. Je ne présume pas que cette multiplicité

d'hypothèses auxquelles se prête la théorie, lui attire le reproche d'être vague et incertaine dans ses résultats. Si cependant une pareille imputation avoit lieu, j'observerois d'abord que la division mécanique et les autres indices de structure pourroient toujours servir à démêler la véritable solution, parmi toutes celles qui ne seroient qu'hypothétiques. J'ajouterois que dans le cas même où l'on se seroit trompé sur le choix de la vraie forme primitive, on parviendrait toujours à des résultats exacts, relativement aux formes que l'on feroit dériver d'un noyau fictif; en sorte que si, dans la suite, de nouvelles observations remettent sur la voie, il seroit facile de transformer les résultats obtenus, en ceux qui représentent la véritable marche de la cristallisation.

J'observerois, enfin, que nous ne sommes pas les maîtres d'arrêter le cours des conséquences auxquelles nous conduit la considération des phénomènes de la nature, et qu'en étudiant les résultats des lois auxquelles la nature et la puissance de son auteur l'ont soumise, nous devons nous efforcer de les envisager sous toutes leurs faces, d'en saisir tous les rapports mutuels, et nous servir de nos théories et de nos méthodes de calcul, comme d'instrumens propres à étendre la portée de notre esprit, à mesure que le point de vue lui-même s'agrandit.

DE QUELQUES RÉSULTATS

RELATIFS A

DIVERSES SUBSTANCES PARTICULIÈRES,

CHAUX CARBONATÉE (1).

Double Réfraction.

208. J'ai expliqué, à l'aide du simple raisonnement, dans l'article de cette substance acidifère, les faits les plus intéressans que présente sa double réfraction. Je supposerai que l'on ait lu attentivement ces explications, et je me bornerai ici à donner les calculs qui leur servent de base.

Soit $abcd$ (Fig. 127) la coupe principale du rhomboïde. Menons ag perpendiculaire sur dc , puis an et ap , qui divisent dg en trois parties

(1) Voyez ci-dessus la théorie du rhomboïde, pour les détails relatifs aux formes cristallines.

égaux ga , ap et pd . J'ai dit que la partie ga étoit l'amplitude d'aberration relative à l'incidence perpendiculaire suivant la direction ag . Or, ad étant l'axe du rhomboïde, son expression est $v'S$ (voyez 31). De plus, en appliquant ici les formules du même numéro, on trouve $ag = S(dg)$, d'où l'on conclura que dg est $v'\frac{1}{2}$. Donc $ga = v'\frac{1}{2}$, ce qui donne $gan = S^2. po'$.

204. Prouvons maintenant qu'il n'y a aucun plan, quelque position qu'on lui donne dans l'intérieur du rhomboïde, auquel on puisse ramener la réfraction du rayon d'aberration, de manière que les sinus d'incidence et de réfraction soient en rapport constant. La démonstration que nous allons-en donner exige seulement que le plan hypothétique passe par la grande diagonale de la base du rhomboïde, ou par une parallèle à cette diagonale; ce, c'est ce qui doit avoir lieu nécessairement, puisque quand l'image d'aberration est vue à sa vraie place, le rayon incident est dans le plan *abed*; car il est évident qu'donc le plan perpendiculaire au rayon, sur la direction duquel on voit l'image d'aberration, coupe la base du rhomboïde par une section parallèle à la grande diagonale.

Cela posé, concevons que le rayon incident se meurt autour de la perpendiculaire hf , de manière à décrire la surface d'un cône droit dont cette perpendiculaire soit l'axe. Le prolongement

inférieur de ce rayon décrits en même temps autour de km , la surface d'un second cône opposé par le sommet et semblable au premier. Soit ahg (fig. 118) la base de ce second cône, prise sur la base inférieure du rhomboïde; soit m le pied de la perpendiculaire km (fig. 117), et e (fig. 118) le pied de la perpendiculaire sur le plan auquel se rapporte par l'hypothèse la réfraction du rayon d'aberration.

Supposons d'abord que l'extrémité supérieure i (fig. 117) du rayon incident, soit sur la perpendiculaire élevée du point q (fig. 118) sur le plan ahg ; l'extrémité inférieure du même rayon prolongé tombera évidemment sur le point h , situé du côté opposé. Supposons, de plus, que e soit l'extrémité inférieure du rayon rompu ordinaire. Ayant décrit du point m plusieurs cercles et de l'intervalle me , la circonférence ecr , on conçoit que pendant la révolution du rayon incident et de son prolongement, l'angle d'incidence étant constant, le rayon ordinaire tombera toujours sur un point de cette circonférence.

Maintenant l'extrémité inférieure du rayon incident étant toujours en i , menons par le point e la ligne ek parallèle à im , puis menons ha . Dans l'hypothèse du plan dont nous avons parlé, il est clair que le rayon d'aberration, qui doit se trouver sur le même plan que le rayon incident, dont le prolongement aboutit en

λ , et que la perpendiculaire terminée en z , tombe sur quelque point de la ligne ho ; et si l'on imagine, pour un instant, que l'amplitude d'aberration soit exactement parallèle à su , le rayon d'aberration aura son extrémité en point z .

Si le rayon incident prend d'autres positions quelconques, de manière que son prolongement tombe en k' ou en k'' , on trouvera, par une construction semblable à la précédente, que l'extrémité du rayon d'aberration, dans la même hypothèse, doit toujours se trouver sur un point l' ou l'' , situés dans l'intersection de la ligne $k'a$ ou $k''a$, avec une ligne menée du point e' ou e'' parallèlement à la ligne su .

Cela posé, les triangles hef , hou étant semblables, on aura $ho : su :: he : ef$. On trouvera de même pour les triangles $k'e'f'$, $k'ou$, cette proportion, $k'o : su :: k'e' : e'f'$. Or, dans toutes ces analogies, les trois premiers termes étant constants, le quatrième terme ef ou $e'f'$ l'est aussi. Maintenant dans toutes les positions du rayon incident que nous venons de considérer, l'amplitude d'aberration s'écarte, à la vérité, du parallélisme avec su , et tombe sur quelque point g , g' , g'' , situés à la gauche de ef . Mais en même temps, plus ef approche de coïncider avec la diagonale fo , et plus aussi l'amplitude d'aberration approche de se confondre avec la constante ef ; en sorte que quand l'ex-

trémité du rayon incident n'est plus qu'à une très-petite distance de f ou de x , l'amplitude d'aberration ne s'écarte pas sensiblement de parallélisme avec fx (1), et que quand la même extrémité est arrivée au point f ou x , l'amplitude se trouve exactement sur la ligne fx .

Il suit de là que dans l'hypothèse d'un plan de réfraction analogue aux lois ordinaires, la constante cl est la limite de l'amplitude d'aberration. Par conséquent, si l'on fait cu et cl égales chacune à cl , ces deux lignes représenteront les amplitudes d'aberration relatives à deux inclinaisons égales du rayon incident, prises de deux côtés opposés et situées dans le plan $abcd$ (fig. 117). Or, l'observation donne évidemment cl plus courte que cu . Donc l'hypothèse dont il s'agit est inadmissible, d'après cette seule condition prescrite par la loi des réfractions communes, que le rayon réfracté soit sur le même plan que le rayon incident et la perpendiculaire au point d'incidence.

203. Je passe aux recherches que j'ai faites, pour essayer de déterminer la véritable loi,

(1) Cette division en zones intelligibles, même à une certaine distance, lorsqu'on opère avec un diamètre d'un petit volume. C'est probablement ce qui a fait que l'on a cru à Newton qu'il y avoit un parallélisme constant entre cl et cu .

d'où dépend la route du rayon d'aberration, au moins dans tous les cas où le rayon incident est sur le plan *abcd* (fig. 107). Mais remarquons; avant d'aller plus loin, que cette loi, quelle qu'elle soit, devoit conduire à une quantité constante et double de μ , pour la somme des deux amplitudes d'aberration, relativement à deux incidences égales prises en sens contraire.

206. Soient *ik*, *ik'* les deux rayons incidents, et soient *ke*, *ke'* les rayons réfractés ordinaires. Par l'extrémité inférieure *g* de la perpendiculaire *ag*, menons *gx* qui fasse un angle quelconque avec *ag*. Menons aussi *ay*, qui coupe *gx* dans un point quelconque. Par les extrémités *s*, *s'* des rayons ordinaires, menons *sa*, *s'a'* parallèles à *gx*. Enfin, ayant pris *sr*, *s'r'* égales chacune à *gs*, qui est la partie de *gx* interceptée par les lignes *ag*, *ay*, faisons passer par les points *r*, *r'*, les droites *kr*, *kr'*; je dis que dans ce cas on aura constamment $el + e'P = 2\mu$.

Pour le prouver, concevons que l'on applique *ke'* sur *ke*, en renversant la base *e'P* du triangle *e'kr'*, de manière que le point *P* tombe sur le point *y*, de l'autre côté du rayon *ke*, et le point *r'* sur le point *s*. Si l'on mène *se*, cette ligne sera évidemment parallèle à *de*, à cause de l'égalité des angles *rel*, *sey*, et de celle des lignes *sr*, *se*. De plus, la ligne *ey* sera égale à la somme des deux distances $el + e'P$,

Or, si l'on suppose que le rayon *de* change d'inclinaison, en restant fixe par son extrémité *e*, les lignes *dy*, *de*, dans l'hypothèse de *er*, *ee* constantes, resteront fixes elles-mêmes par leurs points *e*, *r*, tandis que leurs extrémités supérieure et inférieure feront un mouvement le long des lignes *ab*, *de*; donc, dans tous les cas, on aura *de* : *dy* :: *re* : *dy*. Mais il est aisé de voir, qu'à cause des parallèles *ab*, *re*, *de*, le rapport *de* : *dy* sera constant : donc aussi le rapport *re* : *dy* sera constant : et puisque *re* est constant, *dy* le sera pareillement. Or, plus le rayon *de* approche d'être parallèle à la perpendiculaire *Am*, plus aussi *de* approche d'être égale à *eg*. Donc si l'on suppose que la direction de *de* diffère infiniment peu de la perpendiculaire, on pourra faire la ligne *dy*, ou la somme des deux lignes *ed*, *ed'* égale à *ang*; donc puisque cette somme est constante, elle sera le double de *eg* dans tous les cas. Ce résultat n'est autre chose que celui d'Huyghens, dont j'ai parlé dans la partie de raisonnement, mais généralisé et appliqué aux propriétés des lignes droites, au lieu que ce savant ne l'avoit trouvé que dans l'ellipse particulière dont il avoit adapté les dimensions et la figure aux ondes de lumière dont il faisoit dépendre la réflexion extraordinaire.

207. Il s'agiroit ensuite de savoir, si parmi toutes les inclinaisons de *er* sur *de*, il y en

avoit une qui donnât pour es une quantité représentative des variations en longueur de l'amplitude d'aberration, avec cette condition que gs fût le $\frac{1}{2}$ de dg , ainsi que le donne l'observation. Or, j'ai trouvé qu'en supposant que gs ou es fût inclinée sur l'axe ad , de manière que l'angle esg se trouvât égal au grand angle du rhombe primitif, qui est de $100^{\circ} 24' 15''$, on avoit des résultats sensiblement conformes à l'observation. Dans le même cas, l'angle gsa est de 60° à moins d'une minute près, et peut-être est-il rigoureusement de 60° , ce qui feroit dépendre le phénomène d'une des limites que l'on voit être très-familières à la nature. Quoi qu'il en soit, nous supposons la même rigoureuse, au moins pour la facilité du calcul.

Déterminons d'abord la valeur de gs . Soit abaissée qs perpendiculaire sur dg . On aura, à cause des triangles semblables ags , asg , asq : $qs :: gs : ag$. Or, l'angle ags étant de 30° , $qs = \frac{1}{2}(gs)$. De plus $gs = \sqrt{\frac{1}{3}}$; donc substituant, la proportion devient, $as : \frac{1}{2}(gs) :: \sqrt{\frac{1}{3}} : \sqrt{\frac{1}{3}}$. Donc $as = \frac{1}{2}(gs)$.

De plus, dans le triangle gsa on a, comme nous l'avons vu, $gs = 2(qs)$. Donc $(qs)^2 = \frac{1}{4}(gs)^2$. Or $(gs)^2 = (gs)^2 - (qs)^2$. Donc $(gs)^2 = (gs)^2 - \frac{1}{4}(gs)^2 = \frac{3}{4}(gs)^2$. Donc $gs = gs \sqrt{\frac{3}{4}}$. Remplaçant les valeurs de as et de gs , on a gs ou $\sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}(gs) + gs \sqrt{\frac{1}{4}} = gs(\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4}})$. Donc

$$\begin{aligned} \delta r &= \frac{V_1^2}{1+V_1^2} = \frac{V_2^2}{1+V_2^2} = \frac{V_3^2}{1+V_3^2} = \frac{18V_4^2}{1+9V_4^2} \\ &= \frac{V_1^2}{1+9V_3^2} = \alpha. \end{aligned}$$

D'après cette valeur, il est facile de trouver el . Ayant abaissé les perpendiculaires sur ly , nous aurons $lh : hr = \frac{1}{2} \alpha :: el + em : km$, ou $lh :$

$$\frac{V_1^2}{1+18V_3^2} :: el + em : V_1^2.$$

$$\text{Donc } lh = \frac{V_1^2 (el + em)}{\frac{1+18V_3^2}{V_1^2}} = \frac{V_1^2 (el + em)}{1+9V_3^2 + V_3^2 V_3^2}$$

$$= \frac{\alpha (el + em)}{1+V_3^2} = \frac{el + em}{1+9V_3^2} \quad \text{D'une autre part } eh =$$

$$\alpha V_1^2 = \frac{V_1^2}{1+9V_3^2} \times V_1^2 = \frac{V_3^2}{1+V_3^2}. \quad \text{Rabaissant}$$

les valeurs de eh et de lh , on aura $el = \frac{V_3^2}{1+V_3^2}$

$$+ \frac{el + em}{1+9V_3^2} \text{ Donc } el - \frac{el}{1+9V_3^2} = \frac{V_3^2}{1+V_3^2}$$

$$+ \frac{em}{1+9V_3^2}; \quad \frac{el + 9(el)V_3^2 - el}{1+9V_3^2} = \frac{V_3^2}{1+V_3^2}$$

$$+ \frac{em}{1+9V_3^2}; \quad 9(el)V_3^2 = \frac{V_3^2}{1} + em. \quad \text{D'où l'on tire,}$$

$$el = \frac{V_3^2}{18V_3^2} + \frac{em}{18V_3^2} = V_1^2 + \frac{em}{V_3^2}$$

Si l'on cherche pareillement la valeur de el' ,

$$\text{on trouvera } el' = V_1^2 - \frac{em}{V_3^2}$$

Donc, en général, l'expression de l'amplitude d'aberration est $V_{11} \pm \frac{em}{V_{245}}$, le signe négatif étant pris pour le cas où l'amplitude va en diminuant.

Connaissant el ou el' , on déterminera aisément l'angle ael ou ael' , qui donne la position du rayon d'aberration.

208. Supposons, par exemple, que l'angle d'incidence ikf soit de 30° . Je cherche d'abord l'angle ael , qui est l'angle de réfraction du rayon ordinaire, en faisant cette proportion, $\sin ikf : \sin ael :: 3 : 2$, ce qui donne $ael = 20^\circ 7'$. De plus, ayant $kes = ag = V_{11}$, je fais cette autre proportion, $\sin : es :: \sin. kes : \sin. ael$, ou $V_{11} : es :: \sin. 69^\circ 53' : \sin. 20^\circ 7'$, ce qui donne, $\log. es = -105582$, maintenant $ael = el + el' = es + \frac{em}{V_{245}} + V_{11} = \left(\frac{V_{245} + 1}{V_{245}} \right) es + V_{11}$. Or $\log. \frac{V_{245} + 1}{V_{245}} = \log. \left(\frac{16,588}{15,588} \right) = 870036$. Ajoutant à ce logarithme celui de es , j'ai pour le logarithme de $\left(\frac{V_{245} + 1}{V_{245}} \right) es$, -685786 , qui répond à $0,166$.

Puisque $V_{11} = 0,235$. Donc $ael = 0,166 + 0,235 = 0,401$, dont le logarithme est 89034 .

Résolvant le triangle rectangle ael à l'aide de es et el , je trouve $lae = 26^\circ 34'$.

Pour avoir $l'km$, j'observe que $ml' = e'm + e'p = em = \sqrt{\frac{1}{2}} + \frac{em}{\sqrt{243}} = \left(\frac{\sqrt{243} + 1}{\sqrt{243}} \right) em = \sqrt{\frac{1}{2}}$. Opérant comme ci dessus, j'eussé $ml' = 0,825 - 0,255 = 0,571$, dont le logarithme est -234125 , après quoi il est facile de résoudre le triangle kmf , et de trouver l'angle mlf , qui sera de $15^{\circ} 34'$.

209. J'ai déterminé, par un calcul semblable, la valeur de l'angle d'incidence kl' (fig. 119), sous lequel le point l seroit vu à sa vraie place à l'aide du rayon d'aberration kl' , c'est-à-dire, qu'alors ce rayon seroit sur la direction du rayon visuel; et j'ai trouvé que l'angle d'incidence, dans ce cas, étoit d'environ $16^{\circ} 21'$, valeur qui diffère de $18'$ en moins de celle que Huggins a déterminée par les propriétés de l'éclipse. Or, l'angle dag étoit de $18^{\circ} 27'$, on voit qu'il s'en faut d'environ $2'$ que le rayon kl' ne soit parallèle à ad .

210. Voici un moyen d'autant plus simple de vérifier la loi dont il s'agit, qu'il n'exige d'autre instrument que le rhomboïde lui-même. Je trace sur un papier le parallélogramme $abcd$ (fig. 120), en faisant l'angle acd de $108^{\circ} \frac{1}{2}$, comme dans le coupe principale, et en donnant au côté ad la longueur de l'arête correspondante prise sur le rhomboïde destiné pour l'expérience. Je choisis à volonté une incidence, par exemple, celle de 35° ,

55°, puis je trace le rayon af , qui fait le même angle avec la perpendiculaire $f'k$, et je le prolonge jusqu'à la rencontre s de la ligne cd , prolongée elle-même. Je cherche, au moyen de la formule, les positions du rayon ordinaire de , et du rayon d'aberration df , puis je trace ces deux rayons. Dans l'hypothèse présente, l'angle des est de 204 7', et l'angle des de 261° 34', ainsi que je l'ai prouvé plus haut.

Je trace sur un papier à part une ligne droite xy (fig. 121), sur laquelle je place les points c, f, e , aux mêmes distances respectives que dans la fig. 120, puis par le point x je trace sa perpendiculaire sur xy ; je pose ensuite le rhomboïde sur ce second papier, de manière que xy coïncide avec la petite diagonale de sa base inférieure, et que l'angle solide qui répond à d (fig. 120) soit entre le point x et le point f (fig. 121); dans faisant en sorte que mon rayon visuel reste dans le plan $abcd$ (fig. 120), et que je reconnois avoir lieu quand l'image de la ligne xy (fig. 121) paroît simple, j'incline mon œil, en le tournant vers y , jusqu'à ce que deux des images des points f, e , coïncident en une seule, d'où il suit qu'alors ed est l'amplitude d'aberration; et à ce même temps l'image unique qui résulte de cette coïncidence est sur la direction de la ligne ac (1), vue sans

(1) À la rigueur, il n'est pas nécessaire que la ligne ac

réfraction derrière le rhomboïde, j'en conclus que l'amplitude d'aberration s'accorde avec la loi indiquée. Car il est facile de concevoir qu'alors le rayon visuel a la même position que δ' (fig. 120).

Le procédé est le même pour vérifier la loi relativement aux incidences en sens contraire, en faisant le rayon δ' , que je suppose aussi incliné de 35° sur la perpendiculaire $f' \delta' m'$; alors l'angle $\delta' \delta' m'$ sera de $15^\circ 34'$. Les lignes et les points analogues à xy , ax , x , δ , (fig. 121) auront, dans ce cas, la disposition respective indiquée par la fig. 122. On placera le rhomboïde de manière que l'angle c (fig. 120) soit entre les points x' , x'' , (fig. 122), et l'on inclinera l'œil, en le maintenant vers y' , jusqu'à ce que deux des images des points c' , δ' se confondent en une seule, qui devra se trouver sur la direction de $x'a'$, vue sans réfraction derrière le rhomboïde, si la loi qui a été déterminée ci-dessus est la véritable.

211. J'ai comparé les résultats de cette loi avec ceux auxquels conduirait l'hypothèse de La Hire, c'est-à-dire, qu'ayant supposé un plan dirigé comme δy (fig. 119) perpendiculairement au

sa toute entière hors de la base du rhomboïde. Il suffit qu'elle soit assez longue pour dépasser cette base de part et d'autre, en sorte que l'on puisse juger que l'image dont nous venons de parler est sur le même alignement que les parties extrêmes de la ligne ax .

rayon ik , que je suppose être celui qui fait voir l'image d'aberration sans être déplacée, j'ai cherché quel seroit le rapport entre le sinus d'incidence et celui de réfraction, pour différentes inclinaisons du rayon incident relatives à ik , considérée comme perpendiculaire au point d'immersion, et j'ai trouvé que dans certains cas ce rapport approchoit de celui de 3 à 2, donné par La Hire, tandis que dans d'autres cas il s'en éloignoit très-sensiblement. D'ailleurs, on concevra aisément que le résultat qui donne une somme constante pour les deux amplitudes $el, e' l'$ (fig. 122), est seul incompatible avec la loi ordinaire des réfractions, quelle que soit la position du plan hypothétique auquel on tenteroit d'appliquer cette loi.

POTASSE NITRATÉE.

112. La variété de cette substance, que j'ai nommée *potasse nitratée quadrangulaire*, mérite un développement particulier. Sa forme est celle d'un prisme hexaèdre régulier (fig. 123), terminé de chaque côté par dix-huit facettes obliques, disposées six à six les unes au-dessus des autres, de manière que toutes celles d'un même ordre sont également inclinées sur les pans correspondans. Cette forme, déjà remarquable, en ce qu'on ne s'attendroit pas à la voir naître de l'octaèdre rectangulaire (fig. 124), qui lui sert

de noyas, l'est encore plus par la combinaison des lois dont elle dépend, et qui ont pour signes

$$M \quad T \quad \overset{1}{A} \quad P \quad A \quad B \quad A,$$

représentatif

$$M \quad \overset{1}{x} \quad x \quad \overset{1}{r} \quad P \quad y \quad x \quad \overset{1}{z}$$

On voit, à la première inspection de ce signe, que les faces d'un même ordre, telles que x, r , quoiqu'également inclinées, comme nous l'avons dit, sont produites par des lois de décroissement très-différentes. On voit, de plus, que toutes les lois rentrent dans les limites ordinaires, et n'excèdent pas quatre rangées : mais il y a mieux; c'est que ces lois, considérées dans leur ensemble, ont le plus grand degré de simplicité possible, en sorte que si l'on suppose quelquelautre loi également simple en elle-même, par exemple, la loi B, qui n'est point comprise dans le signe, la loi correspondante qui donneroit une face incliné de la même quantité, par un décroissement sur l'angle A, excéderoit la limite des lois ordinaires. C'est cette espèce de maxime de simplicité relative que je me propose principalement de démontrer.

213. Dans l'octaèdre primitif (fig. 124), si l'on mène la hauteur lr de la pyramide qui a pour base le rectangle $FAAF$, puis les apothèmes Bd , Ed des triangles P , M , et enfin Br et Er , on aura $lr : Br :: \sqrt{3}a : \sqrt{15}$, et $lr : Er :: \sqrt{3} : 1$. Mais quelque soit le rapport de lr à Br , pourvu que celui de lr à Er reste le même, si l'on sup-

pour une loi quelconque de décroissement qui produise une face située en dessus de P, j'ai trouvé qu'il y auroit toujours une autre loi susceptible de donner, en dessus de M, une face inclinée comme la précédente, et réciproquement. Nous pourrions donc envisager le problème d'une manière plus générale, en prenant pour noyau un cône rectangulaire quelconque, avec cette seule condition, que le et P_r soient entre elles dans le rapport de $\sqrt{3}$ à 1, ou, ce qui revient au même, que l'angle formé par les faces M, M' soit de 40°. Soient *als*, *als'* (fig. 123), deux faces adjacentes d'une pyramide droite hexaèdre, ayant pour base un hexagone régulier. Supposons que *als* résulte d'une loi de décroissement qui agisse sur la face P (fig. 124), et *als'* (fig. 125) d'une autre loi qui agisse sur M. Menons la hauteur *ly* de la pyramide, les rayons *yl*, *yl*, *yl* du hexagone de la base, puis *ya*, *ym* perpendiculaires, l'une sur *as*, l'autre sur *as'*, et enfin *lx* et *lx'*. Les triangles *lym*, *lym'* pourroient être considérés comme faisant le fonction de triangles mesurateurs. Soit *n* le nom de rangles soustraites relatif à *lym*, et *n'* celui qui se rapporte à *lym'*. Il s'agit de trouver une équation entre *n'* et *n*, à l'aide de laquelle étant donné *n'*, on puisse en conclure *n*, ou réciproquement.

Soit Bl *ss'* (fig. 126) une coupe du noyau semblable à celle qui passeroit par les points B, I

(Fig. 124), et par le centre r ; et soit Ba (Fig. 125) une droite élevée sur une face produite par un décroissement quelconque sur l'arête B (Fig. 124). Menons une parallèle à B' , puis une et six perpendiculaires sur Ba . Ba sera à ses extrémités le nombre de rangées contraintes en largeur est au nombre de rangées contraintes en hauteur. Mais nous pouvons supposer que ces soit simplement égale à une arête de molécule, auquel cas Ba pourra représenter un nombre entier ou fractionnaire, suivant que le décroissement se fera en largeur ou en hauteur. Soit g' la ligne qui, dans la molécule, répond à Ir (Fig. 124), et p celle qui répond à B' . Il est facile de concevoir que six et B' (Fig. 125) renferment, l'une, autant de fois g , et l'autre, autant de fois p , qu'il y a d'arêtes de molécule comprises dans la ligne Ba , qui représente le nombre de rangées contraintes en largeur. Donc, désignant ce nombre par n , nous aurons $ca = g' \times n$ et $Ba = p \times n$. Maintenant ca étant égale à une arête de molécule, six est plus grande que six d'une quantité égale à g , et Ba plus petite que B' d'une quantité égale à p . Donc, six $= ga + g = g(n+1)$; et $Ba = pa - p = p(n-1)$.

Soit maintenant Ig une ligne située sur une face produite par un décroissement sur l'angle I (Fig. 124), en montant vers B . Menons ge (Fig. 125) parallèle à BI , puis g' et six parallèles à Ba , le sera à g comme le nombre de

rangées contraintes en largeur est en nombre de rangées contraintes en hauteur; et nous sommes de même les maîtres de supposer que q soit simplement égale à une arête de malicube, la ligne le pouvant alors représenter un nombre entier ou fractionnaire, selon que le décroissement aura lieu en largeur ou en hauteur.

Désignant par g et par p les mêmes quantités que ci-dessus, et par N le nombre de rangées contraintes, nous aurons, en appliquant ici le même raisonnement $Lk = g \times N$; $lk = p \times N$; d'où nous conclurons que $L = n (g - 1)$, et $gl = n (p + 1)$. Or, Lk , lk sur sont dans le sens de xy (fig. 125), et gl , lk (fig. 125) sont dans le sens de xy (fig. 125). Donc réunissant les expressions des décroissements sur l'arête B et sur l'angle I (fig. 124), nous aurons $xy : ly$ (fig. 125) :: $g (n - 1) : p (n + 1)$, les angles supérieurs étant relatifs aux décroissements sur B (fig. 124), et les inférieurs aux décroissements sur L.

214. Passons aux décroissements qui agissent sur la face M, et d'abord rapportons-en l'effet, pour plus de simplicité, au plan FAHF. Soit $Ahaa$ (fig. 127) ce même plan, et soit Ad une ligne située sur une face produite en vertu d'un décroissement quelconque sur l'angle A (fig. 124), parallèlement à EF. Menons de (fig. 127) parallèle à AA . Ado pourra être regardé comme triangle mesurant, et Ap sera à do comme le

nombre de rangées soustraites en largeur est à celui de rangées soustraites en hauteur; et nous aurons fibres chaque de supposer que do soit égale à une simple arête, et que Ac représente un nombre n' entier ou fractionnaire, mais tel que le décroissement se fera en largeur ou en hauteur. Soit toujours p la ligne qui, dans la molécule, répond à Ir (fig. 124), et soit e celle qui répond à Fr . Nous aurons Ac (fig. 127) $= n'/p$, et de ac . Mais Ac est dans le sens de dy (fig. 125), et do dans le sens de xy . Donc $xy : dy :: e : n'/p$. De plus $xy : yx :: a : \sqrt{3}$, à cause de l'angle $yxc = 60^\circ$ et de $xy = yx$. Donc $xy = (yx) \frac{a}{\sqrt{3}}$.

D'ailleurs Fr (fig. 124) $: Ir :: 1 : \sqrt{2}$, et $e : g$. Donc $e = \frac{g}{\sqrt{2}}$. Donc si nous substituons à la place de xy et de e leurs valeurs dans la proportion $xy : dy :: e : n'/p$, elle deviendra $(yx) \frac{a}{\sqrt{3}} : dy :: \frac{g}{\sqrt{2}} : n'/p$. D'où l'on tire, $yx : dy :: g : an'/p$. Mais $yx : dy :: ny : dy :: g(n \pm 1) : p(n \mp 1)$.

Donc $g(n \pm 1) : p(n \mp 1) :: g : an'/p$, et $n' = \frac{n \mp 1}{n \pm 1}$, les signes supérieurs devant être pris pour les décroissements en allant de B vers I (fig. 124) ou en descendant, et les inférieurs pour les décroissements en allant de I vers B ou en montant.

On conçoit, à la seule inspection de la formule, que quelque valeur que l'on donne à n , pourvu qu'elle soit rationnelle, on aura toujours pour n' une quantité qui sera pareillement rationnelle.

215. Maintenant pour remplir notre but, qui est de prouver que les lois d'où dépend la structure du cristal sont les plus simples possibles dans leur ensemble, il suffit de supposer successivement n égale à 1, à 2, à 3, à 4, et à l'infini, le dernier cas étant celui où les faces secondaires coïncident avec P, et l'on verra quelle est la valeur de n' , qui répond à chacune des précédentes. A l'égard des suppositions où n seroit un nombre fractionnaire, tel que $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ ou $\frac{1}{4}$, elles sont ici inadmissibles, parce que les faces qui résulteraient des lois exprimées par ces fractions se répéteroient en artifice, du côté opposé à celui où naît le décroissement.

Or, si l'on prend les décroissements en descendant de B vers I, on aura

$$\text{pour } n = 1, \quad n' = \frac{1}{2}.$$

$$\text{pour } n = 2, \quad n' = \frac{1}{3}.$$

$$\text{pour } n = 3, \quad n' = \frac{1}{4}.$$

$$\text{pour } n = 4, \quad n' = \frac{1}{5}.$$

$$\text{pour } n = \infty, \quad n' = \frac{1}{\infty}.$$

Et si l'on prend les décroissements en montant de I vers B, on aura

$$\text{pour } n = 1, \quad n' = \frac{2}{3}.$$

$$\text{pour } n = 2, \quad n' = \frac{3}{4}.$$

pour $n = 3$, $n' = 1$.

pour $n = 4$, $n' = \frac{1}{2}$.

pour $n = \infty$ $n' = \frac{1}{2}$.

L'équation $n' = \frac{1}{2}$ indique une face horizontale, qui est étrangère à l'hypothèse présente. L'équation $n' = \frac{1}{2}$, indique une face verticale qui se confond avec M, et à laquelle répond une face semblablement située, qui intercepte l'angle solide I, et ainsi cette équation appartient à notre hypothèse. En excluant donc $n' = \frac{1}{2}$, et en faisant attention que l'équation $n' = \frac{1}{2}$ se trouve répétée, nous avons huit résultats réellement distincts, parmi lesquels il n'y en a que quatre qui donnent en même temps pour n et n' des lois non mixtes, et qui s'expriment par quatre rangées; savoir: pour les décroissements sur B, $n = 3$; $n' = \frac{1}{2}$; $n = \infty$; $n' = \frac{1}{2}$; et pour les décroissements sur I, $n = 1$; $n' = \frac{1}{2}$; $n = 3$; $n' = 1$. Or, ces résultats sont les seuls qui aient lieu par rapport à la variété dont il s'agit. La cristallisation semble passer à côté des autres, dans lesquels les décroissements étant ordinaires relativement à l'une des quantités n ou n' , entraîneroient, à l'égard de l'autre, des décroissements, soit mixtes, soit situés hors des limites connues.

Q U A R T Z.

Q U A R T Z R H O M B I F È R E.

216. Soit pqr (Fig. 128) le prisme et la pyramide supérieure du quartz prismé. Si l'on suppose à la place de l'angle solide r une facette parallèle au plan qpy , et d'autres facettes semblablement situées à la place des angles solides x , y , etc., on aura le quartz rhombifère.

Les facettes dont il s'agit seront toujours de véritables rhombes, quelles que soient les inclinaisons des faces de la pyramide sur les pans du prisme. Pour le prouver, menons la hauteur pe de la pyramide, le rayon er de la base, ensuite xy , puis pn qui passe par l'intersection g des lignes xy , er , et enfin en et yn . Il est évident que les deux triangles qpy , rey sont sur un même plan. Or, à cause que la base de la pyramide est un hexagone régulier, on a $gr = er$; d'ailleurs, les triangles pey , rey sont semblables; donc ils sont aussi égaux; donc $pe = re$, et par conséquent pny est un véritable rhombe, indépendamment de l'inclinaison des faces de la pyramide. Donc aussi la facette située à la place de l'angle solide r , parallèlement au plan qpy , est un véritable rhombe.

217. Cherchons maintenant la loi qui donne

les facettes dont nous venons de parler, en supposant que le noyau soit un rhomboïde.

La fig. 129 représente ce rhomboïde avec trois des faces supérieures apc , qpe , qpy , du dodécaèdre qui en dérive, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut. La facette qui est venue remplacer l'angle solide e (fig. 128 et 129), et que nous prenons ici pour exemple, étant située parallèlement au plan qpy , si nous menons dh (fig. 129) parallèle à py , et hl parallèle à pe , le triangle dhl sera lui-même parallèle à la facette dont il s'agit. Or, à cause du parallélisme entre dh et py , ph ou pd ou $\frac{1}{2} ad$ ou $\frac{1}{2} pc$ ou $\frac{1}{2} ab$. De plus, à cause du parallélisme entre hl et pe , hd ou ad ou pc ou ab . Donc ad ou $\frac{1}{2} ab$ ou $\frac{1}{2} ca$. Donc la ligne dh , qui est parallèle aux bords des lames de superposition, est située de manière que sur deux arêtes de molécule construites le long de ab , il n'y en a qu'une le long de pc , et que le décroissement a lieu par quatre rangées, c'est-à-dire, que le signe de ce décroissement rapporté au noyau (fig. 130) est (E^4EBT^4).

Q U A R T Z P L A G I È D R E.

126. La figure 131 représente cette variété, dans laquelle les angles solides e , f , g , etc., (fig. 128) à la base des pyramides du quartz prismé sont remplacés par autant de facettes x , x' (fig. 131) situées de biais.

Soit toujours $p\ p'$ (fig. 13a) le rhomboïde générateur du dodécaèdre auquel appartiennent les triangles qps , qps , qps , etc. Supposons que qps réponde à $s's's's'p$ (fig. 131); si nous considérons d'abord la facette $s's's's'$, il faudra, pour avoir des résultats conformes à l'observation, supposer que le décroissement qui donne cette facette est pour signe $(\frac{s}{s} D' D')$. Soit stu (fig. 13a) un plan donné d'après cette loi; nous aurons par l'hypothèse, $st = \frac{1}{2} ps$, et $tu = \frac{1}{2} sp' = \frac{1}{2} st$. Cela posé, il est facile de voir que l'angle tsu , ou son égal etc., est le supplément de l'angle $s's's'$ (fig. 13a). En calculant le premier de ces angles d'après les données que fournit le rapport $\sqrt{13}$ à $\sqrt{11}$ entre les demi-diagonales g et p , on trouve pour sa valeur $17^{\circ} 14'$, d'où il suit que l'angle $s's's'$ est de $162^{\circ} 46'$, ce qui s'accorde avec l'observation.

213. Pour achever de vérifier la loi dont nous avons parlé, il ne s'agit plus que de déterminer l'incidence de $s's's's'$ (fig. 131) sur P , ou celle de stu (fig. 13a) sur le résidu $stps$ du rhomboïde $stps$. A cet effet, on considérera le segment de rhomboïde $stps$, intercepté par le plan stu , comme une pyramide triangulaire, dont on supposera successivement que le sommet soit en s et en t , puis par une méthode analogue à celle que nous avons déjà exposée (134), on cherchera l'incidence de la face $stps$ sur la base stu , dans

Hypothèse du sommet en L . On aura pour cette incidence $\widehat{Bi}^h \widehat{L}P$, dont le supplément $\widehat{L}P \widehat{L}Q$, sera celle de teu sur $peth$, ou de $a'r'a'r'$ (fig. 131) sur P .

220. Maintenant, pour faire dépendre la facette $a'r'a'y'$ de la même loi de décroissement, il faudroit la rapporter à un nouveau rhomboïde, tellement situé que les triangles q , q' , fassent les résidus de deux de ses facettes, et que le triangle P provint du retranchement d'un de ses angles solides. Mais il est beaucoup plus naturel de considérer les deux facettes x , x' relativement à un même rhomboïde, et dans ce cas, elles résultent séparément de deux lois différentes de décroissement. Ayant déjà la loi qui donne la facette x , il faut donc encore chercher celle d'où résulte la facette x' .

Concevons que l'on ait fait dans le quarts prismé py (fig. 133) deux sections qui, en portant des angles x et y , soient parallèles aux facettes x et x' (fig. 131), de manière que les plans de ces sections soient les trapézoïdes am , $pacm$. Ayant pris sur pt (fig. 132) et sur ar , les parties pa et ac égales aux mêmes lignes (fig. 133), menons par les points a , c (fig. 132) la ligne ac , laquelle sera parallèle à la ligne de départ du décroissement qui donne la facette $acwy$ (fig. 133). Déterminons d'abord la position de cette ligne ac (fig. 132). Pour y par-

Tenir, je remarque que or (fig. 133) est situé par rapport au triangle ape , comme ar par rapport au triangle apt ; donc la position de la première étant connue, nous aurons celle de la seconde, et par conséquent celle de A (fig. 132), dont ar fait partie.

Par l'angle h , menons hf parallèle à te , et par le point f , fd parallèle à tw ; le plan hfd sera ainsi parallèle au plan teu ; mais de : $ef :: af : d'$; donc puisque af est $\frac{1}{2} af$, on a aussi de $af :: ef$. Donc puisque $ar = \frac{1}{2} pe$, la ligne fd est parallèle à pa . Donc puisque les sections pe , fd , des plans ape , $d'fh$, sur le plan $peue$ sont parallèles entre elles, et que les deux premiers plans s'inclinent l'un vers l'autre, leur commune section pe sera parallèle soit à fd , soit à pa . Mais le plan teu est parallèle au plan hfd ; donc sa section or sur le plan ape sera parallèle à la section pe du plan hfd sur le même plan ape . Donc or sera parallèle à pe . Donc aussi A sera parallèle à pe . Donc les triangles eah , pac étant semblables, et pe étant double de ar , eh sera aussi double de A , d'où l'on conclura que la ligne A est située d'après un décroissement intermédiaire sur l'angle phf , de manière que pour une seule suite de molécule construite le long de Ap , il y en a deux qui sont construites le long de Ah . Reste à trouver la mesure du décroissement.

Soit h (fig. 134) le même angle solide que

(Fig. 13a), avec les trois arêtes h_x , h_l , h_g qui aboutissent à cet angle. De plus, soit h_y un plan situé comme celui de la facette $acxy$ (Fig. 133), et dans lequel h (Fig. 134) sera la même ligne que (Fig. 13a). Remarquons maintenant que le point y (Fig. 133), par lequel passe la facette $acxy$ est situé au milieu de l'arête h_g (Fig. 134). C'est une suite de la manière dont le dodécaèdre auquel appartient le triangle xyx (Fig. 133), est engagé dans le rhomboïde dont il dérive. Donc ayant déjà $h_y = \frac{1}{2} h_g$ (Fig. 134), et $h = \frac{1}{2} h_l$, il reste à trouver le rapport entre l'une ou l'autre de ces dernières lignes, et l'arête h ou h dont elle fait partie.

Choisissons de préférence h . Si nous considérons le rapport de h à h (Fig. 13a), ou à h moitié de h , nous aurions facilement celui de h à h . La question se réduit donc à trouver le rapport de h à h .

Par le point l menons lk parallèle à h ; les triangles hcl , hcl seront semblables; donc $cl : cl :: hl : h$. Cherchons successivement cl et cl , ou, ce qui revient au même, le rapport de chacune d'elles à h .

1°. Pour cl . Le rapport de cette ligne à h est le même que celui de cl à pl , ou que celui de cl à pl ; parce que $cl = cl$, et $pl = pl$. Cherchons donc le second rapport.

Les triangles semblables ccp , ccp donnent $cl :$

2°.

$ax :: az : ca$. Or $az = \frac{1}{2} ab$; donc $ax = \frac{1}{2} ca$.
 Mais à cause de $py :: pz$, on a aussi $ya = \frac{1}{2} az$
 $= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} ab = \frac{1}{4} ab$. Donc $ax = ay = ya = \frac{1}{4} ab$
 $= \frac{1}{4} ab = \frac{1}{4} ab$. Donc la proportion devient $\frac{1}{4} ab :$
 $\frac{1}{4} ab :: az : ca$. Or $ca :: az : ca$. Donc az
 $= \frac{1}{4} ab = \frac{1}{4} az$. Or $az = \frac{1}{2} pz$, puisque $yz = \frac{1}{2} pz$.
 Donc $az = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} pz = \frac{1}{4} pz$. Donc aussi $az = \frac{1}{4} pz$,
 et $ca = \frac{1}{4} pz$.

2°. Pour ax , on a $ax = az = \frac{1}{4} pz$. Cher-
 chons ay . Les triangles semblables ayp , apz don-
 nent $ay : py :: az : ya$. Mais $ay = \frac{1}{4} py$; donc az
 $= \frac{1}{4} ya = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} ab = \frac{1}{8} ab = \frac{1}{8} ab$. Donc ay
 $= (\frac{1}{4} - \frac{1}{8}) az = \frac{1}{8} az$.

Donc la proportion $ax : ay :: az : ay$ devient
 $\frac{1}{4} az : \frac{1}{8} az :: az : ay$. Donc $ay = \frac{1}{2} az = \frac{1}{4} ab$. Donc
 $ax = ay = az = \frac{1}{4} ab = \frac{1}{4} ab$.

Donc de $(fig. 134)$ $ay = \frac{1}{4} ab = \frac{1}{4} ab$. D'ailleurs
 $ay = \frac{1}{4} ab$.

Donc ax , ay et az sont égaux à $\frac{1}{4} ab$.
 1° et $\frac{1}{4}$, ou encore $\frac{1}{4}$, 1 et $\frac{1}{4}$. Donc le signe du
 développement rapporté au noyau $(fig. 134)$, sera
 $(\frac{1}{4} ED^2 B)$.

FIELD-SPATH.

art. Soit af $(fig. 135)$ la variété que l'on
 nomme *feld-spateh*, *feldspath*, et qui va
 nous servir à déterminer la forme et les dimen-

deux respectives de la molécule intégrante. La division mécanique des cristaux de cette variété a lieu parallèlement aux lites F , M , T , de manière que la coupe qui répond à T est beaucoup plus difficile à obtenir et moins nette que les deux autres.

De plus, les faces F , M sont sensiblement perpendiculaires l'une sur l'autre, et la face T fait un angle de 120° avec la face M . On voit dès-là, d'après ces premières données, que la forme primitive doit être un parallélépipède oblique, dont il s'agit de déterminer les dimensions.

222. Soit AR (Fig. 135) ce parallélépipède, dont nous supposons les faces $BRQO$, $GOAD$, $BOAH$ respectivement parallèles aux faces F , M , T (Fig. 135). Je remarque d'abord que l'empyèose S doit, d'après sa position, résulter d'un décroissement, soit simple, soit intermédiaire, sur l'angle RHQ (Fig. 136). Or, il est d'autant plus naturel de le supposer simple, que d'autres variétés présentent des facettes dues à des décroissemens qui ont la même ligne de départ, avec des mesures différentes, d'où il résulte que dans l'hypothèse que nous suivons ici, ces décroissemens seroient simplifiés eux-mêmes. \square

Maintenant qr (Fig. 135), qui est parallèle à la ligne de départ, fait sensiblement un angle droit avec la lité M prolongée, ou, ce qui revient au même, sa position est horizontale, dans la

cus où les faces M , T sont situés verticalement. Or, par la nature du décroissement, xy est parallèle à la diagonale OR (Fig. 136). Donc aussi cette diagonale est dirigée horizontalement. Cette observation va d'abord nous donner le rapport entre GP et PL , perpendiculaires sur AO .

Menons OZ parallèle à PL , puis ER . Le plan OZR sera horizontal. Donc il sera perpendiculaire sur le plan vertical $BRNH$; mais $BOGR$, d'après l'observation, est aussi perpendiculaire sur $BRNH$; donc la commune section OR des deux plans OZR , $BOGR$, sera de même perpendiculaire sur $BRNH$; donc elle le sera sur RZ . Donc l'angle OZR est droit; mais OZR qui mesure l'incidence de $BOAH$ sur $BRNH$ est de 60° . Donc $OZ = \frac{1}{2}ER$, ou $PL = \frac{1}{2}GP$.

Par le point A menons AC perpendiculaire sur GO , et par le point C menons CS perpendiculaire sur ER prolongé. Pour déterminer le rapport entre AC et CS , nous remarquerons que les facettes coq , $bois$ (Fig. 135) ayant leurs bords co , iq , bo , os parallèles, doivent résulter d'un décroissement sur les arêtes GO , ER (Fig. 136). Or l'incidence de chacune de ces facettes sur le pan adjacent, tel que M , est semblablement de 135° . Donc puisque l'angle ACS (Fig. 136) est de 90° , si nous supposons que les facettes dont il s'agit résultent d'un décroissement par une seule rangée, nous aurons $AC = CS$.

223. Nous pouvons maintenant déterminer le rapport entre les trois faces $BHGO$, $GOAD$, $BOAH$. Le plan OZH étant perpendiculaire sur le plan $BRNH$, la diagonale OR , qui fait un angle droit avec la commune section RZ de ces deux plans, sera aussi perpendiculaire sur $BRNH$. Donc elle le sera également sur RB , qui passe par son extrémité R , et qui coïncide avec le plan $BRNH$. Donc chacun des angles ORB , ROG est droit. Donc surf. $BHGO = OR \times GO$. Mais surf. $GOAD = AC \times GO$; donc puisque $AC = CB = OR$, les deux surfaces sont égales. De plus, surf. $BOAH = AO \times PL$. Donc puisque l'on a d'ailleurs surf. $GOAD = GP \times AO$, et que $PL = aGP$, on aura $BOAH = aGOAD$.

224. Il suit encore de ce qui précède, que si l'on complète le parallélogramme ACS , sa figure sera celle d'un carré. D'une autre part, si l'on complète le parallélogramme GPL , il formera un rhombe alongé, dont les angles seront de 120° , 60° , et dont un côté sera double de l'autre. Menons OK et OT perpendiculaires sur BO . Nous aurons, à cause de $BOAH$ double de $BHGO$, $OK \times BO = aOT \times BO$. Donc $OK = aOT$. Donc le parallélogramme qui passe par les points K , O , T , a aussi un côté double de l'autre. Mais ses angles sont d'environ $111^\circ 30'$, $68^\circ 30'$, ainsi que nous le verrons bientôt.

225. Avant d'aller plus loin, cherchons les lois

de décroissement qui produisent les pans *décup*, *loar*, *cape*, etc. (Fig. 135), ajoutés à ceux du noyau. Soit *poxy* (Fig. 137) une coupe de ce noyau prise par un plan horizontal, et subdivisée en une multitude de petits parallélogrammes qui représentent les coupes d'autant de molécules. Nous aurons, dans chacun de ces parallélogrammes, tel que *loar*, *ly=oxyx*, et *oxy=oxo*. Soit *fy* une coupe analogue du prisme (Fig. 135), dans laquelle *fy* (Fig. 137) répond à *oarp* (Fig. 135), *ym* à *oim*, *mx* à *M*, *no* à *décup*, et *az* à *T*. On voit, par la seule inspection de la figure 137, que *fy* résulte du décroissement $\frac{1}{6}$ ou $\frac{1}{6}$ (Fig. 138) *ym* du décroissement $\frac{1}{6}$, et *no* du décroissement $\frac{1}{6}$; et il sera facile d'en conclure que l'incidence de *fy* sur *no* est de 120° ; celle de *ym*, tant sur *no* que sur *fy*, de 150° ; et celle de *az*, tant sur *no* que sur *az*, de 120° , d'où il résulte que le plan *oarp* (Fig. 135), qui est produit par une loi de décroissement, a la même position ou sera contraire que le pan *T*, qui est primitif, et que les pans *oim* et *décup* s'assimilent de même l'un à l'autre, par leurs positions, quoique produits par des lois différentes de décroissement.

206. Nous pouvons maintenant achever de déterminer les dimensions et les angles de la forme primitive, en profitant d'une observation qui consiste en ce que les angles *ore*, *rig* (Fig. 135)

sont sensiblement égaux entre eux. Supposons l'égalité rigoureuse, et cherchons la valeur qui en résultera pour chacun de ces angles.

Soit *aro* (Fig. 129) pl. *XX*, le même triangle isocèle que l'on intercepteroit, en faisant passer une droite par les points *a*, *e* (Fig. 135). Le prisme du cristal étant toujours supposé dans une situation verticale, imaginons un second plan triangulaire isocèle, dont le sommet soit en *r*, et qui s'abaisse au-dessous du plan *aro*, en prenant une position horizontale. Soit *aru* (Fig. 139) ce dernier plan, dont lequel sa base égale à la base *ao* du triangle *aro*, puisque les points *u*, *t* sont situés, l'un sur l'arête *or* (Fig. 135), l'autre sur celle qui aboutit en *a*, et que ces deux arêtes sont parallèles entre elles. Menons les hauteurs *xy*, *at* (Fig. 139) des deux triangles, puis la ligne *xy*. Il est aisé de voir que l'angle *xyt* est le supplément de *rig* (Fig. 135); donc cet angle sera aussi le supplément de *aro* (Fig. 135 et 139). Donc ayant prolongé *or* indéfiniment, on aura *xyt = aor*. D'ailleurs, les deux triangles *aty*, *aru*, sont rectangles; donc ils sont semblables. Remarquons maintenant que l'angle *aru* étant égal à celui que forment *aru* le prisme de la fig. 135 deux plans inclinés entre eux de 120° , savoir *arp* et le plan confiné à *ar*, on a $\hat{aru} = 30^\circ$, et $\hat{aru} = \hat{atx}$; donc $\hat{atx} = 30^\circ$.

Cela posé, si nous menons en perpendiculaire

sur or prolongée, les triangles semblables hey , oae donneront $oe : ae :: ak : ey$, ou, $oe : or :: ae\sqrt{\frac{1}{2}} : ey :: \frac{1}{2}oe\sqrt{\frac{1}{2}} : ey$. De plus $oe = \sqrt{(oa)^2 + (ar)^2}$. Substituant et élevant tout au carré $(oa)^2 + (ar)^2 + (ae)^2 :: \frac{1}{2}(oe)^2 + (ey)^2$. D'ailleurs $(ae)^2 = (oa)^2 + (ar)^2$. Donc $(ar)^2 : (oa)^2 :: \frac{1}{2}(oe)^2 : (ey)^2$. Maintenant $oe \propto or = ey \propto ae$, ou, $oe \propto ar = ey \propto ae$. Donc $(ar)^2 = \frac{(ey)^2 \times (ae)^2}{(oe)^2}$. Substituant, la proportion deviendra, $\frac{(ey)^2 \times (ae)^2}{(oe)^2} : (ar)^2 :: \frac{1}{2}(ae)^2 : (ey)^2$. D'où l'on tire $ey = or\sqrt{\frac{1}{2}}$.

Malheureusement si l'on prend pour le rayon r la ligne oe , alors ey sera le sinus de l'angle oey ; donc $\log. \sin. oey = \log. r + \frac{1}{2} \log. \frac{1}{2} = 9,7550047$, qui répond à $3a^1 23' 56''$. Donc, presque le triangle oea est isocèle, on aura $oae = 154^a 0' 8''$; cette valeur sera aussi celle de l'angle oig (fig. 135), ou DGO (fig. 136).

227. Cherchons les autres angles plans de la forme primitive, et d'abord $G O B$. Soit encore (fig. 140) le pentagone, dont les côtés passent par les mêmes lettres (fig. 135), et oe , ae , ey (fig. 140) les mêmes lignes que fig. 135. La ligne oe (fig. 140) étant parallèle à GT (fig. 136), et ey (fig. 140) étant parallèle à ce , laquelle est elle-même parallèle à GO (fig. 136), nous aurons oey (fig. 140) = TGO (fig. 136), et à cause

que $\text{op} = \frac{1}{2} \text{os} = \frac{1}{2} (115^{\circ} 0' 8'') = 57^{\circ} 30' 4''$, nous aurons aussi $\text{TGO} = 57^{\circ} 30' 4''$; donc $\text{GOB} = 122^{\circ} 29' 36''$.

Reste à trouver BOA . Or, le plan OER étant horizontal, RZ est parallèle à GP ; donc RZ est égale à OP . Donc $\text{OZ} : \text{RZ} :: \text{zGP} : \text{OP} :: \text{z} (\sin. 64^{\circ} 59' 52'') : \sin. 25^{\circ} 0' 8''$, ce qui donne $\text{BOZ} = 34^{\circ} 7' 31''$, donc $\text{BOA} = 103^{\circ} 7' 31''$.

228. A l'égard des incidences naturelles des flèches du parallépipède, ayant déjà celle de GOAD sur BOAH , qui est de 120° , et celle de BRCO sur GOAD , qui est de 90° , il ne nous manque plus que celle de BRCO sur BOAH , égale à l'angle TOK .

Du point T menons TU perpendiculaire sur OK . Nous aurons d'abord $\text{GP} : \text{OT} :: \cos. 45^{\circ} 0' 8'' : \cos. 32^{\circ} 29' 36''$, en prenant GO pour le rayon commun. Soit $\log. \text{GP} = \log. \cos. 25^{\circ} 0' 8'' = 9.9572835$; donc aussi $\log. \text{OT} = \log. \cos. 32^{\circ} 29' 36'' = 9.9260026$. Or, si l'on suppose une ligne élevée du point P perpendiculairement sur PL , et qui coïncide avec le plan GPL , elle fera, avec PG un angle de 30° , à cause de $\text{GPL} = 120^{\circ}$, et de plus elle sera égale à TU , puisque celle-ci est perpendiculaire sur les plans AOBH , GRND , comme la ligne supposée. Donc $\text{GP} : \text{TU} :: \text{z} : \sqrt{3}$. Donc $\log. \text{TU} = \log. \text{GP} + \log. \sqrt{3} = \log. \text{z} = 9.8948141$. D'ailleurs $\log. \text{OT} = 9.9260026$, ce qui donne pour la valeur de l'angle TOK

$69^{\circ} 51' 45''$, et pour celui que forme BRGO avec le plan parallèle à BOAH, $111^{\circ} 23' 17''$.

229. Il est facile maintenant de déterminer les lois du décroissement qui produisent les faces S, égy et ézak (Fig. 135), les seules qui nous restent à considérer.

1^{re}. Pour la face S, produite par un décroissement sur l'angle I (Fig. 133), l'angle ROG (Fig. 136) étant droit, ainsi que l'angle BOA, il s'en suit que dans le triangle mesurateur le côté qui représente l'excès en largeur d'une lame sur l'autre, sera égal à GO ou à un multiple de cette ligne; et que le côté qui représente l'excès en hauteur, sera égal à OA ou à un multiple de cette ligne. Or, $GP : OR :: ya$ (Fig. 137) : $As :: 1 : \sqrt{3}$. De plus $GP \times OA$ (Fig. 136) = $OR \times GO$; donc, $OA = GO \sqrt{3}$; donc $OA : GO :: \sqrt{3} : 1$. D'ailleurs l'angle GOA = $64^{\circ} 59' 52''$. D'après ces données, si l'on suppose que le décroissement ait lieu par une simple rangée, on trouve pour l'incidence de S sur P (Fig. 135), $59^{\circ} 41' 8''$, conformément à l'observation.

2^{re}. Pour la facette égy. L'angle égy étant égal à l'angle GOB (Fig. 136), il s'en suit que le décroissement qui produit la facette égy (Fig. 135) a lieu parallèlement à l'arête BO (Fig. 136). Or, si l'on suppose deux rangées de constructions dans le sens de la hauteur, auquel cas le signe du décroissement sera $\frac{1}{2}$ (Fig. 138), les deux côtés

du triangle menesteur, dont l'un mesure la différence en largeur des lames de superposition, et l'autre la différence en hauteur, seront entre eux, comme OK (fig. 136) : POI , c'est-à-dire, qu'ils seront égaux; d'ailleurs l'angle POK est de $68^{\circ} 34' 43''$, d'où l'on conclura que l'incidence de la facette *cyg* (fig. 135) sur P , est de $124^{\circ} 15' 12''$.

3°. Pour la facette *brak*. Il s'agit de prouver que cette facette, en supposant qu'elle résulte d'un décroissement par deux rangées en hauteur sur l'angle OBH (fig. 136), ou qui ait pour signe $\frac{1}{2}I$ (fig. 138), sera précisément la même position et la même inclinaison en sera contrainte que la facette *cyg*.

Soient *beq*, *god*, *grad*, *brak*, (fig. 141) les quatre faces de la forme primitive marquées des mêmes lettres (fig. 136). Prolongeons *go*, *de*, l'une jusqu'en *y*, l'autre jusqu'en *x*, d'une quantité égale à leur longueur, puis menons *yx*, auquel cas les deux parallélogrammes *god*, *yox* seront égaux et semblables. Menons aussi *dy*, puis *bx* et *ax*. Nous aurons un nouveau parallépipède, dont les faces latérales seront *yoxa*, *day*, *brak*, *voen*, et les bases *beqy* et *enAx*. Or, il est facile de concevoir que les faces latérales seront perpendiculaires l'une sur l'autre (1), et que

(1) C'est une suite de ce que li dispose OB (fig. 136)

de plus, les faces *yaar*, *deak* et les deux faces *dey*, *adla* seront des rectangles, tandis que les faces *raas*, *May* seront des parallélogrammes obliques.

Cela posé, menons *gp* (fig. 141) qui coupe *oa* en deux également. Le plan *gpg* sera tiré parallèlement à une face qui résulteroit d'un décroissement par deux rangées en hauteur sur l'arête *do*, ou dont l'expression seroit *P* (fig. 138). Menons ensuite *en* (fig. 141) qui coupe *de* en deux également. Il est évident que le plan *ben* sera tiré parallèlement au plan *gpg*; d'où il suit que ce même plan sera parallèle à la facette *eytg* (fig. 138).

Maintenant par le point *r* menons *rl*, qui coupe *do* en deux également. On aura *rl* = *ol*, c'est-à-dire, que le triangle *odr* sera isocèle. Car, soit *g'o'd'r'* (fig. 142) une coupe horizontale du parallélépipède *garbadah* (fig. 141), sur laquelle les points *g'o'd'r'* (fig. 142) correspondent à ceux qui sont marqués des mêmes lettres (fig. 141). Menons de même *r'p* (fig. 142) au milieu de *d'o'*. A cause de *d'o' = o'd'*, nous aurons *d'r' = d'p'*; et parce que *r'd'p' = 60°*, nous aurons aussi *r'p' = d'p'*, donc enfin *r'd' = o'p'*. Or, la

et celle de la base inférieure sont perpendiculaires sur les faces *GOAD*, *EBDH*

base or (fig. 141) du triangle $oér$ étant horizontale, c'est-à-dire, parallèle à $o'r'$ (fig. 142), et le point l (fig. 141) étant sur la même ligne verticale que le point P (fig. 142), il résulte que le triangle $o'r'r'$ ne peut être isocèle, sans que le triangle $oér$ (fig. 141) ne le soit pareillement.

Cela posé, menons ri qui coupe ab en deux parties égales, puis il . Il est clair que il et li étant égales chacune à une moitié d'arc, et de à une arête entière, le plan dei sera situé comme une facette qui résulteroit d'un décroissement par deux rangées en hauteur sur l'angle abb de la face primitive qui répond à $QBHA$ (fig. 136), lequel décroissement auroit pour signe $\frac{1}{2}I$ (fig. 138). Or, il est facile de prouver que ce plan a la même position en sens contraire relativement au triangle isocèle ab (fig. 141) que le plan $loei$ qui résulte du décroissement $\frac{1}{2}P$. Car à cause de $orf = r'of$, on a aussi $loy = l'ob$, le premier angle étant le complément de rof , et le second celui de $or'f$, puisque les angles orb , roy sont droits. De plus $oy = bi$; donc tout étant égal de part et d'autre, les incidences des deux plans sur le triangle $oér$ seront aussi égales.

Maintenant ay (fig. 135) est parallèle à or (fig. 141), et cy parallèle à of ; mais l'observation prouve que l'angle ayc (fig. 135) est égal à

l'angle $\alpha\gamma\mu$; donc si nous prolongeons $\alpha\gamma$ et $\mu\gamma$ jusqu'à ce qu'elles se rencontrent en un point ν , les angles $\nu\gamma\mu$ et $\gamma\alpha\nu$ seront égaux; et parce que $\gamma\mu$ est égal à $\delta\alpha$ (Fig. 141), $\gamma\alpha\nu$ (Fig. 133) sera aussi égal à $\delta\alpha$ (Fig. 141), c'est-à-dire, que le triangle $\gamma\mu\nu$ (Fig. 133) est semblable au triangle $\delta\alpha\gamma$ (Fig. 141), et qu'il a la même position relativement au noyau. Donc l'hypothèse du décroissement exprimé par $\frac{1}{2}$ (Fig. 138) s'accorde à l'observation, qui donne pour la facette $\delta\mu\alpha$ la même incidence sur P que celle de la facette $\alpha\gamma\mu$.

220. On voit par ce qui précède, que l'égalité d'inclinaison, relativement aux deux facettes dont il s'agit, ne dépend en aucune manière de la valeur des angles du parallélogramme $\delta\alpha\gamma\mu$ (Fig. 141), en sorte qu'en supposant que ce parallélogramme s'incline plus ou moins, en restant fixe par la diagonale $\alpha\gamma$, auquel cas ses angles changeroient nécessairement de mesure, on aura un résultat analogue à celui qui vient d'être exposé.

AMPHIBOLE.

221. Soit $\delta\epsilon$ (Fig. 143) la forme primitive. Ayant mené les diagonales $\delta\gamma$, $\epsilon\alpha$, puis la ligne $\delta\alpha$, qui va de l'extrémité supérieure de l'arête $\delta\epsilon$, à l'extrémité inférieure de l'arête $\epsilon\alpha$; il faudra, pour avoir des résultats conformes à l'observa-

tion, 1^{re}. que l'angle de soit droit; 2^{de}. que l'on ait $de : de :: \sqrt{14} : 1$, d'où il suit que l'angle de est $= 14^{\circ} 57'$; 3^{de}. que le sinus de la moitié de l'inclinaison de $afgh$ sur $afgr$ soit au cosinus comme $\sqrt{ag} : \sqrt{3}$, ce qui donne $14^{\circ} 54'$ pour l'inclinaison totale.

232. Dans les formes secondaires, il y a des facettes également inclinées en sens contraire, qui proviennent de différentes lois de décroissement, et c'est une suite de la propriété que la ligne de de faire un angle droit avec l'arête ex . Nous nous bornerons presque à démontrer les résultats qui concernent ce point de théorie.

AMPHIBOLE DODÉCAÈDRE (Fig. 144)

233. La ligne app est au noyau (Fig. 145), et

$\begin{array}{c} M \cdot G \cdot P \cdot B \\ M \cdot x \cdot P \cdot r \end{array}$ L'arête de la même inclinaison en sens contraire que la diagonale oblique de P . Pour le prouver, soit $afgh$ (Fig. 145) le même quadrilatère que (Fig. 143), et def le triangle mesurateur relatif au décroissement B (Fig. 145), considéré dans le sens de ce même plan $afgh$. Nous aurons, par l'hypothèse, $de : de :: ae : af$, ou $fad : de :: de : af :: af : af$. Menons de perpendiculaire sur de ; le triangle edf sera semblable au triangle af ; donc $ed : de :: de : af$. Dans ce comparant les deux pro-

portions, $cal=lat$; donc $cal=et$; donc l'arête et est inclinée au sens contraire de la même quantité que lat ou af , qui lui est parallèle; or et répond à l'arête i (fig. 144), et et (fig. 145) répond à la diagonale oblique de P (fig. 144); donc, etc.

234. La face P sera toujours un véritable rhombe; car les arêtes h , h' sont nécessairement parallèles aux arêtes g , g' qui sont les lignes de départ du décroissement, et par conséquent elles sont aussi parallèles aux arêtes f , f' . Les faces r , r' sont de même des rhombes, ou du moins on peut toujours les ramener à cette figure, en donnant un arbitraire des dimensions convenables. Car nous avons déjà les arêtes h , h' parallèles à g , g' . De plus, il est évident que l'arête i est parallèle aux arêtes f , f' , puisque le plan x est lui-même parallèle à celui qui passe par les arêtes i , u . Mais les deux rhombes r , r' , qui sont semblables entre eux, ne le sont pas au rhombe P.

AMPHIBOLE ÉQUIDIFFÉRENT, (fig. 147.)

235. Le signe du sommet supérieur est $\frac{\frac{1}{2}}{f} \frac{\frac{1}{2}}{r}$, celui du prisme est $\frac{M}{M} \frac{O}{x}$, et celui du sommet inférieur est $\frac{a}{f} \frac{p}{p}$.

1°. La face y qui résulte du décroissement $\frac{1}{2}$, est inclinée en sens contraire de la même quantité que la face p , qui est primitive. Car soit gaf (fig. 146) le triangle mesurateur relatif à la face y . Nous aurons, par la supposition, $fa : fg :: \frac{1}{2}af : fa$, ou $fa : \frac{1}{2}fg :: \frac{1}{2}af : \frac{1}{2}fa :: af : fa$. Menons ae perpendiculaire sur fg ; les triangles semblables fae , afg , donnent $fa : fa :: af : fa$. Donc, puisque $fa : \frac{1}{2}fg :: af : fa$, il résulte que $a = \frac{1}{2}fg$. Donc af et af sont inclinées en sens contraire de la même quantité; or, la première répond à la diagonale oblique de y (fig. 147), et la seconde à celle de p ; donc, etc.

2°. Les faces r, r qui résultent du décroissement $\frac{1}{2}$ B, ont la même inclination en sens contraire que les faces l, l , qui résultent du décroissement $\frac{1}{2}$ A.

Soit $abcd$ (fig. 148) le même rhombe que fig. 145, subdivisé en petits rhombes qui représentent les bords d'autant de molécules. Dans le décroissement relatif aux faces r, r (fig. 147), les bords de la première lame de superposition seront alignés comme $d'a'$, $d'c'$ (fig. 148), puisqu'il n'y a qu'une rangée de soustruite dans le sens de la largeur; donc si l'on suppose un triangle mesurateur $c'd'a'$ (fig. 149) situé dans un plan parallèle à celui qui passe par la diagonale ac (fig. 148) et par celle de la base opposée, $c'd'$ (fig.

(fig. 143) sera la même ligne que cd (fig. 143), qui mesure dans le même sens l'angle d'axe l'un sur l'autre, et rs (fig. 143) sera égale à deux sections longitudinales de molécule, c'est-à-dire, que l'on aura $cd : rs :: m$ (fig. 143) : n (sur). Or, il est aisé de voir que le même triangle peut servir à représenter l'effet du dédoublement \bar{E} , qui produit les faces I, I (fig. 147). Car l'on a dans ce cas, $cd : rs$ (fig. 143) :: m (fig. 143) : n :: $m : n$ (sur), ce qui est le même rapport que ci-dessus.

D'ailleurs, l'arête d (fig. 147) a la même inclinaison, en sens contraire, que l'arête a , qui est parallèle à la diagonale af (fig. 143), ainsi qu'il sera facile de le concevoir, en prenant un nouvel triangle mesurateur dans le sens du plan dga . Ainsi, tout étant égal de part et d'autre, les facettes r, I (fig. 147) seront inclinées de la même quantité en sens contraire.

AMPHIBOLE SEXOÉCIMAL (fig. 146)

Pl. XXI.

36. Le signe du sommet supérieur est $\frac{E}{I} \frac{B}{r}$.

et celui du prisme $\frac{M}{H} \frac{O}{x}$, comme dans la variété

précédente. Celui du sommet inférieur est $\frac{z}{y} \frac{x'p}{x'x'p}$

Nous avons à prouver que les facettes x' , x , dont l'une résulte du décroissement $\frac{1}{2}$, et l'autre du décroissement $\frac{1}{3}$, ont la même inclinaison en sens contraire.

Supposons, pour plus de facilité, que le cristal soit renversé, en sorte que le sommet inférieur se présente en dessus, comme on le voit fig. 131; auquel cas le signe de la face x' sera $\frac{1}{2}$, et celui de la face x , $\frac{1}{3}$.

Soient lym , lrm (fig. 132), les mêmes faces que fig. 145, inclinées de manière que l'arête mr se présente en avant. Si nous traçons la diagonale lr (fig. 132), puis ry qui rencontre la prolonge de manière que l'on ait $qr = lr$, le plan ly aura la même inclinaison en sens contraire que le plan lm .

Pour le prouver, traçons lr (fig. 145) perpendiculaire sur mr . On concevra, avec un peu d'attention, que lr tombe au milieu de mr ; donc le triangle mlr (fig. 145 et 132) est isocèle. Donc lr est inclinée de la même quantité, en sens contraire, que lm . Il sera de même aisé de voir que ry est inclinée de la même quantité, en sens contraire, que ml . Donc l'égalité d'inclinaison, en sens contraire, aura aussi lieu par rapport aux deux plans ly , lm .

Remarquons maintenant que d'après la loi $\frac{1}{2}$

qui produit les facettes α' (fig. 15a), il y a une arête de molécule construites le long de $\alpha\beta$ et de $\alpha\gamma$ (fig. 15a), et deux arêtes construites le long de $\alpha\sigma$, et il est facile, d'après cette considération, de se représenter la position d'un plan qui intercepteroit l'angle solide α , parallèlement à l'une des facettes dont il s'agit.

Cela posé, par un point quelconque α de la ligne $\beta\sigma$, faisons passer un premier plan $\alpha\alpha\beta$ parallèle à $\beta\gamma$, lequel sera par conséquent le même inclinaison en sens contraire que $\beta\alpha\gamma$, puis un second $\alpha\alpha\gamma$, qui soit situé à l'égard du précédent, comme la facette désignée par β l'est par rapport à $\beta\alpha\gamma$. Dans ce cas, le plan $\alpha\alpha\gamma$ représentera l'une des facettes α' (fig. 15c) (1). Il s'agit de déterminer le rapport entre les lignes $\alpha\alpha$, $\alpha\sigma$, $\alpha\beta$, qui donnera celui des nombres d'arêtes de molécule construites le long des lignes $\alpha\beta$, $\alpha\gamma$, $\alpha\sigma$.

(1) Puisque la facette α (fig. 15c) est incliné en sens contraire de la même quantité que la facette β , désignée par β , et puisque celle-ci répond par sa position au plan $\beta\alpha\gamma$ (fig. 15a), on devra d'après elle même, il est facile de concevoir que la facette α (fig. 15c) doit avoir la même relation de position avec un plan qui seroit incliné en sens contraire de la même quantité que $\alpha\beta\gamma$ (fig. 15a), d'autre-dire, avec le plan $\alpha\alpha\beta$.

Ayant mené par le point x où les lignes ac et bc s'entre coupent, la ligne ab parallèle à ac , normale à l'arc de molécule qui fait partie de ac ou de bc , et p celle qui fait partie de ac .

Soit $ac=ua$. Le triangle uac étant isocèle, nous aurons aussi $ac=uc$; et puisque le plan abc est situé, par rapport au plan acp , comme un

plan qui proviendrait du dédoublement $\frac{1}{2}$ de celui à l'égard du plan bae , il en résulte que l'on a de même $ac=uc$, et que de plus $ac=ap$ (1); mais, comme. Donc $uc=ap$. Reste à trouver uc . Cette ligne est composée de ub et bc ; or, uc étant inclinée de la même quantité en sens contraire que ub , et bc étant parallèle à ac , il s'en suit que l'on a $uc=ac+bc$, et $ac=ac+bc$.

Malgréant $uc : bc :: ac : bc :: uc+bc : bc$ ou $ap : ap :: ac+bc : bc$, d'où l'on tire $ac=bc$. Donc $ac=bc$; mais nous avons d'ailleurs $uc=ap$, et $ac=bc$.

(1.) Dans l'hypothèse que nous faisons ici, le plan acp est situé à l'égard du plan acp ou acp , comme le plan bae l'est à l'égard du plan bae , or, en vertu du dédoublement $\frac{1}{2}$, il y auroit une arête a de constante le long de ac , et deux arêtes p de constante le long de ac ; dans la section bc du plan abc sur le plan acp doit être tellement situé, que la partie ac de l'arc ac qu'elle intercepte soit aussi égale à a , et que la partie cb de l'arc ac qu'elle intercepte parallèlement, soit de même égale à ap .

Dans le décroissement qui donne la facette x (fig. 134) sera exprimé par E' (fig. 145), ou par e' , si l'on suppose que le sommet auquel appartiennent les facettes a soit situé inférieurement, comme on le voit (fig. 150).

AMPHIBOLE SURCOMPOSÉ (fig. 153).

157. Le signe du sommet supérieur est $\overset{\frac{1}{2}}{E} \overset{\frac{1}{2}}{H} \overset{\frac{1}{2}}{E}$
 ($\overset{\frac{1}{2}}{ED'B'}$) ; celui du prisme $M \overset{\frac{1}{2}}{G'}$, et celui du
 sommet inférieur $\overset{\frac{1}{2}}{a} \overset{\frac{1}{2}}{p} \overset{\frac{1}{2}}{a} \overset{\frac{1}{2}}{b}$.
 $\overset{\frac{1}{2}}{x} \overset{\frac{1}{2}}{p} \overset{\frac{1}{2}}{x'}$ $\overset{\frac{1}{2}}{P}$

Il n'y a de nouveau dans cette variété que les facettes c , c' , dont la première résulte du décroissement $\overset{\frac{1}{2}}{E}$. Il s'agit de faire voir que la seconde qui provient du décroissement intermédiaire ($\overset{\frac{1}{2}}{ED'B'}$) est inclinée de la même quantité en sens contraire.

Reprenons la figure 152, en laissant tout subsister, à l'exception que le plan abc sera situé parallèlement à la facette c' (fig. 153), c'est-à-dire, qu'il sera, par rapport au plan ase , la même position qu'auroit à l'égard de lui une face qui résulteroit du décroissement $\overset{\frac{1}{2}}{E}$.

En appliquant ici le calcul qui nous a servi

(a36) à déterminer la face x (Fig. 131), nous aurons toujours $as \equiv mb \equiv ar \equiv u$, $an \equiv p$, et $bs \equiv ap$. Mais $ak \equiv 3p$; donc $mb \equiv ap$.

Donc la proportion $mk : bs :: mb + bs : bs$ deviendra $ap : ap :: u + bs : bs$, d'où l'on tire $bs \equiv u$. Donc $ar \equiv as$, et puisque $as \equiv u$, et $mk \equiv ap$, il y aura deux arêtes de molécule soustraites le long de mb , une seule le long de mb , et quatre le long de ar , d'où il suit que le signe de décroissement sera $\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ E'D'B' \end{smallmatrix} \right)$.

Les résultats précédens auront toujours lieu, quelle que soit la valeur des angles de la forme primitive (Fig. 143), pourvu que la base ac fasse un angle droit avec bs . Il est remarquable que cette propriété soit commune au pyroxène et à la granatite avec l'amphibole. Mais, jusqu'ici, cette dernière substance est la seule des trois qui ait offert des faces également inclinées en sens contraire, avec des lois différentes de décroissement.

S T A U R O T I D E.

a38. Soit LX (Fig. 134) la forme primitive, qui est un prisme droit à bases rhombes. Ayant mené les diagonales LU , BX , on aura $BS : LS :: \sqrt{2} : 3$, et $LS : BG :: 3 : 1$. Le premier rapport donne $129^{\circ} 36'$, pour la mesure de l'angle LBU .

239. Les cristaux de staurolite en prismes droits hexaédres, dont le signe rapporté au noyau (fig. 153), est MGP , se joignent très-souvent deux à deux, de manière que leurs axes sont entre eux tantôt des angles droits, comme on le voit fig. 155, tantôt des angles de 120° d'une part, et de 60° d'une autre part, comme le représente la figure 157. Ce croisement offre plusieurs caractères remarquables de symétrie que nous nous proposons ici de démontrer, à l'aide du calcul.

240. Mais avant d'aller plus loin, il ne sera pas inutile de considérer, en général, la manière dont les communes sections de deux prismes hexagones qui se croisent, sont affectées entre elles. Nous supposons seulement que ces prismes soient semblables, et que leurs pans soient parallèles deux à deux, comme cela a toujours lieu dans les cristaux.

Prenez pour exemple les deux prismes que représente la fig. 157. Il est d'abord facile de concevoir que les communes sections sont au nombre de deux, et forment deux contours hexagones $Eagyr$, $Eauyr$. De plus, tous les côtés de chaque hexagone sont sur un même plan. Donnons-nous à le prouver pour l'hexagone $Eagyr$. Si nous supposons que les pans gfp , abz , d'une part, et gfd , abz de l'autre, se prolongent jusqu'à se rencontrer, et que le même

about ait lieu à l'égard des pans $DEOP$, $ABCI$ d'une part, et $GFOL$, $AHKL$ de l'autre, les deux prismes hexagonaux se trouveront convertis en prismes quadrangulaires, disposés comme on le voit fig. 158; et les côtés Ez , yz , En , ny (fig. 157) de l'hexagone $Euyx$ étant de même prolongés jusqu'à se rencontrer aux points c , d (fig. 158), où les arêtes uz , Nz , MR , nz se croisent, l'hexagone deviendra un quadrilatère $Euyx$. Or, les côtés Ez , yz de ce quadrilatère étant formés par les sections des pans parallèles fuz , muz , sur les pans $FNDO$, $AHKL$, qui sont aussi parallèles, ces côtés seront parallèles eux-mêmes, et par conséquent ils seront sur un même plan. Donc le quadrilatère entier $Euyx$ sera aussi sur un même plan; donc dans l'hexagone $Euyx$ (fig. 157), les quatre côtés Ez , yz , En , ny sont sur un même plan, et par conséquent l'unité de plan a lieu pour l'hexagone entier.

Un coup d'œil attentif jeté sur la figure 158, suffit pour faire juger que les deux quadrilatères $Euyx$, $Euyb$ sont perpendiculaires l'un sur l'autre, d'où l'on conclura que la même chose a lieu pour les hexagones $Euyx$, $Euyy$ (fig. 157).

Dans l'examen que nous allons faire des deux variétés de stéarolide représentées figures 156 et 157, nous nous attacherons principalement à prouver 1°. que chacun des hexagones de jonc-

tion est situé, par rapport à l'un ou l'autre des prismes, comme le serait une face produite par une loi de décroissement; s'. que si l'on suppose les pans de chaque prisme prolongés dans l'intérieur de l'autre prisme, les prolongemens aient de même des positions que l'on pourra rapporter à des lois de décroissement.

STAUBOTIDE RECTANGULAIRE (Fig. 156.)

241. Dans cette variété, les pans $FGLO$, $ABCI$ d'une part, et $fglo$, $abci$ de l'autre, lesquels résultent de la loi G' , et que nous appellerons désormais pans additionnels, sont perpendiculaires les uns sur les autres; et de plus, leurs communes sections an , cu , etc., font des angles droits avec les arêtes FO , GL , AI , BC , qui leur sont contiguës.

Pour avoir un rapport entre les dimensions des bases des deux prismes, nous supposons que les côtés FG , BA , qui terminent les pans additionnels, soient égaux à la moitié de la diagonale qui leur est parallèle, ou qui va de D en H . Cette supposition, qui n'est loi que de convenance, deviendra nécessaire pour la théorie de la variété suivante.

Maintenant si l'on imagine que le plan d'un des hexagones de jonction, tel que $awpyr$ se

prolonge au dessus de la section mn , il est évident que son prolongement diviserà en deux également les angles que font entre eux les plans $ECmn$, $fgmn$; et puisque cet angle est droit, il s'ensuit que le plan de l'hexagone fait avec l'axe du cristal un angle de 45° . Donc le triangle mesurateur efn (fig. 153), relatif à cet hexagone, est à la fois rectangle et isocèle. Or fn est parallèle à BQ (fig. 154), et mn est parallèle à US . Donc puisque $BQ = 1$ et $US = 2$, on aura (fig. 153) $fn : mn :: BQ : US$. Donc le décroissement qui produiroit une face située comme l'hexagone *essayer* (fig. 156), auroit pour signe $\frac{1}{2}$ (fig. 155). Il est inutile de prouver que l'autre hexagone *essayer* (fig. 156) résulte de la même loi considérée sur l'angle E' (fig. 156).

242. Supposons que le trapèze *filon* (fig. 156) qui appartient au prisme dp , se prolonge dans l'intérieur de l'autre prisme DP ; son prolongement coïncidera avec le plan du triangle ara . Soit $m'e'n'$ (fig. 160) une section faite dans la forme primitive parallèlement à mn (fig. 156). On aura $e'n'$ (fig. 160) $= e'a'$, et il sera facile de voir que $Be' : Be' :: BQ$ (fig. 154) : BU , d'où l'on conclura que le prolongement de *filon* (fig. 156) dans l'intérieur de l'autre prisme, est situé d'après la loi $\frac{1}{2}$. Il en sera de même des prolongemens des autres trapèzes; et à l'égard

des rectangles $fgmn$, $hakt$, etc., qui sont parties des pans additionnels, et qui sont parallèles aux bases de la forme primitive, ils ne résultent d'aucune loi de décroissement.

STAUROTIDE OBLIQUANGLE (*Fig. 157.*)

243. Nous partirons de deux données fournies par l'observation, dont l'une consiste en ce que les axes des deux prismes font entre eux des angles de 60° , 120° , et l'autre en ce que les deux pans additionnels $GFOL$, $ghol$, en se croisant à l'avant de la section commune Ece , s'inclinent entre eux de la même quantité que les axes, en sorte que les deux trapèzes $FGceE$, $ghceE$ forment un angle rectus de 120° .

244. Si l'on supposoit que, dans la variété précédente (*Fig. 156*), la section ou truité perpendiculaire sur GL et PO , et que les deux rectangles $GFceE$, $ghceE$ s'inclinaient l'un sur l'autre de 120° , auquel cas les deux axes se trouveroient nécessairement inclinés de la même quantité, la position naturelle des deux prismes réuniroit encore les deux conditions auxquelles est soumise celle des prismes de la figure 157, et il y auroit même, en apparence, plus de simplicité dans l'assemblément des deux prismes. Mais alors la position des hexagones de jonction ne s'accor-

droit avec aucune loi possible de décroissement. Car soit $\phi\alpha$ (fig. 151) le triangle mesurateur dans lequel pa représente l'angle que formeroit le plan de l'hexagone entier $\alpha\alpha\alpha\alpha$ (fig. 156), avec la base CL du prisme DP, ou, ce qui revient au même, l'angle que formeroit avec la base supérieure BO une facette parallèle à cet hexagone, et qui devroit résulter d'un décroissement sur l'angle E (fig. 155) : on aura, par l'hypothèse, $pa = 60^\circ$, et $pa : pd :: 1 : \sqrt{3}$. Or, ce rapport étant irrationnel, il est évident qu'il ne peut représenter celui d'aucunes fonctions de BO et UL (fig. 154), qui sont entre elles comme 1 : 6, c'est-à-dire, en rapport commensurable.

La cristallisation remplit les deux conditions dont nous avons parlé, en prenant une autre marche qui conduit, ainsi que nous le verrons, à des lois simples de décroissement, relativement aux positions des hexagones de jonction. La section Em (fig. 157) des plans GFE α , g/E α devient alors oblique sur GL et EO; et, ce qui est digne d'attention, les angles de 120° et 60° que faisoient d'une part ces mêmes plans, et de l'autre les deux axes, n'ont plus une dépendance mutuelle nécessaire, comme dans le cas précédent. Nous verrons bientôt que le même auortement renferme encore d'autres caractères de symétrie, qu'on n'y soupçonneroit pas au premier coup d'œil.

243. Cherchons, avant tout, la direction de la section. En sur l'un quelconque des deux pans $FGLO$, *fig.*

Soient $FEaO$, $fEag$ (*fig.* 16a) les mêmes trappes que figure 157. Du point a menons ak , *ind* perpendiculaire sur Ea . Menons aussi la base ak du triangle isocèle Aka , puis sa hauteur ra . L'angle Aka mesurant l'incidence mutuelle des deux trappes, qui est de 20° , nous aurons $Aka = 60^{\circ}$. Donc $ak = Aa \sqrt{3}$.

De plus, l'angle $kEa = 30^{\circ}$, parce qu'il est la moitié de l'angle kEd , qui est égal à l'inclinaison des axes. Donc $Ea = 2 (ak) = Aa 2\sqrt{3} = Aa \sqrt{3}$. Donc $Ea : Aa :: \sqrt{3} : 1$. Soit menée ek perpendiculaire sur EE . Nous aurons $Ea : ek :: Ea : Aa :: \sqrt{3} : 1$; et par conséquent $Ea : ek :: \sqrt{3} : 1$, ce qui donne pour l'angle $akEE$ (*fig.* 157 et 16a) $35^{\circ} 17'$.

246. Il existe une variété de stéatide, dans laquelle l'angle solide D (*fig.* 157) est remplacé par une facette qui résulte du décroissement \bar{A} , et dont l'incidence sur l'arête Dc est égale au supplément $144^{\circ} 44'$ de l'angle $akEE$ que nous venons de trouver de $35^{\circ} 17'$, c'est-à-dire, qu'elle est égale à l'angle $akEO$. Nous ne nous arrêterons pas à démontrer cette analogie de position, dont le calcul est très-facile à faire.

247. Déterminons maintenant la position de l'hexagone de jonction Karyat (*fig.* 157); sur

quasi j'observe d'abord que les directions de deux côtés étant données, pourvu qu'elles ne soient point parallèles, la position de l'hexagone déterminerait nécessairement. Cela posé, il suffira de chercher les directions des côtés Ee , Ea . Or, ces directions sont aisées à conclure d'un résultat que nous allons commencer par prouver, et qui consiste en ce que l'angle mEe est droit.

Conservons que les trois plans $gmiE'$, $dE'E'$, $gjidba$, se prolongent de manière à former par leur réunion une pyramide triangulaire, qui ait pour sommet le point E' , et pour base le plan mEe prolongé de même convenablement. Soit ecE' (fig. 163) pl. XXII, cette pyramide dans laquelle le triangle rectangle gE' répond à $gmiE'$ (fig. 157), le triangle hE' , qui est aussi rectangle, à $dE'E'$, et le triangle obtusangle $E'h$ à $gjidba$, d'où il suit que ce triangle est perpendiculaire sur les plans des triangles gE' et hE' .

Mesurons la hauteur gE' du triangle gE' , la hauteur hE' de la pyramide, puis les lignes ee , ea , ea' , et enfin la ligne $E'e$ qui se trouvera perpendiculaire sur $E'h$, puisque cette dernière ligne est elle-même perpendiculaire sur le plan $E'h$.

L'angle eeE' étant le même que mEe (fig. 157), toute la question se réduit à prouver que l'on a (fig. 163) $(ee)^2 = (ea)^2 + (eE')^2$. Cherchons successivement ea , ea' et eE' .

1°. Pour ea . Les triangles semblables amE (fig.

162), q^b (fig. 163), donnent $Eh : hcs :: ce : cf$. Or, nous avons eu $Eh : hcs :: \sqrt{3} : 1$. Donc nous pouvons faire $ce = \sqrt{3}$, auquel cas nous aurons $cf = 1$, et $q^b = \sqrt{2}$.

2°. Pour ch , $ch = \sqrt{(cf)^2 + (fh)^2}$. (cf)² = 2. Reste à trouver fh .

Prolongeons cf indéfiniment, puis menons hp perpendiculaire sur le prolongement; nous aurons $fh = \sqrt{(fp)^2 + (ph)^2}$. Cherchons fp et ph .

Les triangles cef , $q^b e$ sont semblables, à cause de l'angle commun e et des angles droits d et p .

Donc $de : cf :: ef + fp : ph$, $de = \sqrt{(ef)^2 - (df)^2}$. $cf = 1$.

Pour avoir df , considérons le triangle rectangle $cf d$, dans lequel fo est une perpendiculaire abaissée de l'angle droit sur l'hypoténuse. Donc $fo : ce :: df : cf$.

Or, à cause que l'angle $foe = fo^b$, comme étant le supplément de celui que forment entre eux les plans $gouff$, $GouEF$ (fig. 137), nous avons (fig. 163) $af : fo :: a : \sqrt{3}$; mais parce que af est une perpendiculaire abaissée de l'angle droit du triangle $q^b e$ sur l'hypoténuse, $ce : cf :: cf : af$; ou, $\sqrt{3} : \sqrt{2} :: 1 : af = \sqrt{\frac{2}{3}}$. Donc la proportion $af : fo :: a : \sqrt{3}$ devient $\sqrt{\frac{2}{3}} : fo :: a : \sqrt{3}$.

Donc $fo = \sqrt{\frac{1}{3}}$. D'ailleurs $co = \sqrt{(cf)^2 - (fo)^2} = \sqrt{2 - \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{5}{3}}$.

Donc la proportion $ph : eh :: df : ef$ devient $V_1 : V_1 :: df : V_2$. Donc $df = V_1$.

Donc $de = \sqrt{1 - V_1^2} = V_3$.

Maintenant, dans la proportion $de : df :: ef + fp : ph$, nous connaissons $de = V_3$, $df = V_1$ et $ef = 1$. Or, il est facile d'avoir la valeur de fp en fonction de ph . Pour y parvenir, j'observe que fp est dans le sens de BS (fig. 154), et ph dans le sens de LB, d'où il suit que le triangle rectangle hpf est semblable au triangle rectangle LBS. Donc $fp : ph :: BS : LB :: V_2 : 3$. Donc $fp = ph V_2$.

La proportion $de : df :: ef + fp : ph$ devient donc $V_3 : V_1 :: 1 + ph V_2 : ph$, d'où l'on tire $ph = V_1/3$.

Donc $fp = V_1/3 \times V_2 = a$.

Donc, mettant à la place de fp et ph leurs valeurs dans l'équation $fh = \sqrt{(fp)^2 + (ph)^2}$, nous aurons $fh = \sqrt{a^2 + 1/9} = V_{12}$.

Mais $eh = \sqrt{(ef)^2 + (fh)^2}$, et $(ef)^2 = 2$. Donc $eh = V_{14}$.

3°. Pour ch , $ch = de + dh = de + \sqrt{(fh)^2 - (df)^2} = V_3 + \sqrt{12 - 1} = V_3 + V_3 = V_1 + 3V_3 = V_{17}$. D'ailleurs $ch = V_{14}$ et $ce = V_3$. Donc l'angle ceh ou l'angle ceB (fig. 157) est droit.

Il suit de là que l'angle CEO est le supplément de l'angle fEa . Soit HP (fig. 164) le même prisme que fig. 157, sur lequel on ait tracé l'hexagone

Encart

Augur et la ligne Em. Menons de plus ae et af perpendiculaires sur FO, Ea perpendiculaire sur DP, puis oa . Nous avons déjà eu $Eh : ah$ (fig. 152 et 154) :: $\sqrt{2} : 1 :: a : \sqrt{2}$. Or, $ah = FO = BS$ (fig. 154). Donc si nous désignons BS par $\sqrt{2}$, comme ci-dessus, nous aurons oa (fig. 154) $oa = \sqrt{2}$, $Eh = a$, et $Em = \sqrt{6}$.

Maintenant les triangles oAE , Ere sont semblables à cause des angles droits k , r , et de aEe complément de kEm . Donc $Er : re :: ah : Eh :: \sqrt{2} : a :: 1 : \sqrt{2} :: BG$ (fig. 154) : BS, ce qui donne la position de Er (fig. 164) sur le plan FGLQ.

Il est facile de déterminer de même celle de Em (fig. 157 et 164) sur le plan DFOP; car, d'un côté, les angles oEF , $oE'f$ (fig. 157) sont égaux; de l'autre, le plan $oEod$ est le prolongement de $goE'f$. Enfin, l'angle formé par l'inclinaison de DFEa sur FGoe est le même que celui qui résulte de l'inclinaison de $goE'f$ sur $d'E'Er$. Donc tout étant égal de part et d'autre, l'angle oEe sera droit, ainsi que l'angle $oE'Er$.

Il suit encore de ce qui vient d'être dit, que la position de Em sur le plan DFOP étant la même que celle de Er sur le plan $q'Op$, on a $Em = Er$.

Or les triangles oEr (fig. 164) EEm sont semblables, à cause des angles droits E , k , et des angles égaux kEm , Ere ; donc $Em : Er :: Eh : ah$.

Mais $Ea = \sqrt{6}$, $Ea = a$, $ab = \sqrt{a}$. Donc $\sqrt{6} : E\gamma :: a : \sqrt{a}$. Donc $E\gamma = \sqrt{3}$. Donc aussi $Ea = \sqrt{3}$. Or $Ea = \frac{1}{2} BU$ (fig. 154) $= \frac{1}{2} \sqrt{(B\delta)^2 + (\delta\epsilon)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + a} = \frac{1}{2} \sqrt{11}$.

Donc puisque $a\alpha$ (fig. 164) $= \sqrt{(E\gamma)^2 - (Ea)^2}$. On aura aussi $a\alpha = \sqrt{3 - \frac{11}{4}} = \sqrt{\frac{1}{4}}$.

Donc $Ea : a\alpha :: \sqrt{11} : \sqrt{\frac{1}{4}} :: \sqrt{11} : 1 :: BU$ (fig. 154) : BG.

Si nous considérons le triangle Ea (fig. 164) comme mesurant, par rapport à une face qui naîtroit d'un décroissement sur l'angle A' (fig. 155), il est visible que le signe du décroissement seroit A' , puisque l'on a $a\gamma$ (fig. 164) : $E\gamma :: B\delta$ (fig. 154) : BG. De plus, la face dont il s'agit seroit parallèle au plan $(Ea$ (fig. 164), puisque l'on a $Ea : a\alpha :: BU$ (fig. 154) : BG. Donc, puisque les positions des lignes Ea , Ea , déterminent celle de l'hexagone entier, le plan de cet hexagone sera situé comme une face qui résulteroit du décroissement A' .

On voit par là que les côtés Ea , en font, avec aP , des angles égaux en sens contraire. Il en est de même des angles formés par ya , ae avec aK ; enfin, les côtés $E\gamma$, $\gamma\epsilon$, qui passent sur les pans additionnels, font aussi des angles égaux, l'un avec EO , l'autre avec aG , au sorte que la position de l'hexagone sur le prisme est symétrique. Et puis-

que les côtés Ea , Ea sont égaux, il s'en suit que tous les autres le sont pareillement, et qu'ainsi l'hexagone est régulier. C'est ce que l'on peut prouver encore, en faisant attention que la ligne qui passeroit par les points E , e , seroit égale à la moitié de LU (fig. 154), d'où il suit que son expression est 3. D'ailleurs $Ea = ae = \sqrt{3}$ (fig. 154); d'où l'on conclura que dans le triangle isocèle qui auroit pour base la ligne menée de E en e , et pour côtés les lignes Ea , ae , l'angle Eae est de 120° .

248. Passons à l'autre hexagone $Eaigyr$ (fig. 157). Soit Ap (fig. 155) le même point que fig. 157, sur lequel on ait tracé l'hexagone dont il s'agit. Menons Ea , ae , qd perpendiculaires, l'une sur gf , l'autre sur fe , la troisième sur ap . De plus, ayant prolongé gf et de jusqu'à ce qu'elles se rencontrent en p , et de même fe et ap , jusqu'à ce qu'elles se rencontrent en q : menons pq . Si l'on jette les yeux sur la fig. 156, qui représente l'hexagone marqué des mêmes lettres (fig. 155), avec les prolongemens de de et gf , on verra facilement que $pf = gf$ (fig. 156). Prolongeons aussi en E , qr , (fig. 155) jusqu'à ce qu'elles se rencontrent en u , nous aurons évidemment $Ea = ue$, et $ae = eq$.

Pour abrégér, nous appellerons distance longitudinale entre deux quelconques E , e , des angles de l'hexagone, la perpendiculaire abaissée du point supérieur E sur un plan qui passeroit par le point

inférieur q , parallèlement aux bases du prisme.

Cela posé, nous avons déjà la distance longitudinale entre m , E , laquelle, dans le cas présent, est la ligne mE , et que nous avons trouvée égale à $2(BG)$ (fig. 154), ou simplement égale à 2. De plus, la distance longitudinale entre E , a est de même égale à 2, à cause de $Ea = mE$. Celle entre E et y (fig. 164 et 165) est égale à Ez , ou à 1, parce que les points E , e d'une part, et t , y de l'autre, sont à la même hauteur. Celle entre y et q , est 2, comme celle entre m , E . Donc celle entre E , q est égale à $1 + 2 = 3$. Donc celle entre a , q est égale à 1. Donc celle entre a et r , étant la moitié de la précédente, sera $\frac{1}{2}$. Mais celle entre E , a est égale à 2. Donc celle entre E , r est égale à $2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} = Ea$; enfin, celle entre r , q étant la même que celle entre a , r , sera égale à $\frac{1}{2} = ar$.

Nous aurons donc, d'une part, $ar : Ea :: \frac{1}{2} \sqrt{11} : \frac{5}{2} :: \sqrt{11} : 5 :: BU$ (fig. 154) : $5(BG)$; et de l'autre $qz : rz$ (fig. 165) :: $\frac{1}{2} \sqrt{11} : \frac{1}{2} :: \sqrt{11} : 1 :: BU$ (fig. 154) : BG .

249. Nous pouvons maintenant déterminer la loi de décroissement à laquelle la position de l'hexagone est soumise. Soit XG' (fig. 167) le même prisme que fig. 154, mais beaucoup plus allongé. Menons Le (fig. 167) de manière que l'angle $LeB = Ead$ (fig. 165), et ar (fig. 167), de manière que l'angle $Bra = arq$ (fig. 165). Il est évident

que le plan Lac^1 (fig. 167) aura, par rapport au prisme XG' , une position analogue à celle de l'hexagone $Emgr$ (fig. 165), à l'égard du noyau du prisme hexaèdre Δp . Menons ac (fig. 167) et af perpendiculaires, l'une sur LA' , l'autre sur BG' , nous aurons $ac = af = BL = \sqrt{11}$; $La = 5(BG)$ (fig. 164) $= 5$, et $af = BG = 1$.

Du point M' (fig. 167) menons $M'a$ parallèle à ac , et du point A menons Aa parallèle à La , puis joignons $M'a$, a , par une droite. Le plan $M'a$ sera parallèle au plan acL . Or $A'a = af = BG$ (fig. 164) $A'a : A'a$ (fig. 167) :: $Ha : Bl.$:: $5(BG)$ (fig. 164) : BL ; ou $BG : A'a :: 5(BG) : BL$. Donc $A'a = \frac{1}{5}BL$; d'où l'on conclura que le décroissement a lieu par cinq rangées en largeur sur l'angle $LA'M'$, c'est-à-dire, que son signe est e'' ou E'' , si l'on aime mieux en rapporter l'effet à la partie supérieure du noyau.

166. La recherche des angles de l'hexagone conduit à de nouvelles propriétés, qui mettent ces angles en rapport avec ceux qu'on observe sur d'autres parties du groupe. Cherchons d'abord l'angle Emg (fig. 165 et 166), et pour cela menons Ea . Nous avons déjà $Em = \sqrt{(10)^2 + (10)^2} = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$. or $me = 1 = \sqrt{(10)^2 + (10)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{2}$. Menons $E4$ perpendiculaire sur $4b$. La distance longitudinale entre m , E étant $m\xi$, et celle entre m , a , étant égale

à re , celle entre a , E sera égale à $ae - re$ ou à $a - \frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{2}$ ou $a + \frac{1}{2}$. D'une autre part, ayant mené fa (fig. 166), puis f perpendiculaire sur hd , nous aurons $fi = \frac{1}{2}LB$ (fig. 154) = $\frac{1}{2}$, et (fig. 166) = $dh - di = BX$ (fig. 154) = $\frac{1}{2}BS = BX = \frac{1}{2}BX = \frac{1}{2}BX = \frac{1}{2}$, $a\sqrt{2} = \sqrt{\frac{1}{2}}a$. Donc puisque $E4$ (fig. 165) = fa (fig. 166), on aura aussi $E4 = \sqrt{(ah)^2 + (fi)^2} = \sqrt{\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}}$.

Donc Ea (fig. 165) = $\sqrt{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} = \sqrt{2}$. Donc $(Ea)^2 = (Ea)^2 + (ae)^2$. Donc l'angle ae (fig. 165 et 166) est droit, et par conséquent, il est égal à chacun des angles $aeEr$, $aeEa$ (fig. 157).

Maintenant si nous menons ar (fig. 165), elle sera parallèle à Ea , parce que ces deux lignes sont les sections du plan de l'hexagone, sur les plans parallèles $gfcd$, $hdph$. De plus on aura, $ar : Ea :: dh$ (fig. (fig. 166) = $\frac{1}{2}a : \frac{1}{2}$. Donc $ar = aEa$. Donc si nous menons Eb (fig. 168) perpendiculaire sur ar , et qui sera parallèle à ae , nous aurons $be = Ea = \sqrt{2}$, $Eb = ae = \sqrt{2}$, $Er = \sqrt{(ar)^2 + (Eb)^2} = \sqrt{6 + 2} = \sqrt{8}$.

Donc les trois lignes Er , Eb , be sont entre elles comme les quantités $\sqrt{8}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$ ou $\sqrt{2}$, 1 , $\sqrt{2}$, ce qui est précisément le rapport des trois lignes Ea , ae , Ea (fig. 16a). Donc beE (fig. 168) = aeE (fig. 157 et 16a). Donc aEa (fig. 168) = aeE (fig. 157), c'est-à-dire, que cet angle est de $149^\circ 47'$. Donc ErE (fig. 168) = $124^\circ 16'$.

MICA.

131. Le résultat de calcul que je vais exposer a rapport à une observation faite sur une lame de mica, qui étoit d'une si grande ténuité, qu'elle réfléchissoit, à un endroit, une belle couleur bleue, que l'on pourroit présumer être de même ton que le bleu du premier ordre, dans l'expérience de Newton sur les anneaux colorés (1). Ayant cherché l'épaisseur de cette lame au même endroit, je l'ai trouvée de 4315 cent millièmes de millimètre, ou d'environ 43 millièmes de millimètre.

Pour parvenir à cette estimation, j'ai employé la règle que Newton pense être générale pour tous les milieux réfringens, et dont voici l'énoncé. L'épaisseur d'une lame d'une substance quelconque, à l'endroit où cette lame réfléchit telle couleur, est à l'épaisseur de la lame d'air dans l'expérience sur les anneaux colorés, à l'endroit où cette lame réfléchit la même couleur, comme le sinus d'incidence est à celui de réflexion, lorsque la lumière passe de la première substance dans l'air (2).

Or, dans le cas dont il s'agit ici, le second terme

(1) Voyez l'article *quartz* page 161.

(2) Voyez l'optique d'Isaac de Newton, liv. 3, part. 1, chapt. 10 et 21.

de la proportion , savoir l'épaisseur de la lame d'air , à l'endroit qui réfléchit le bleu pur , est égale , suivant Newton , à 2, 4 millièmes de ponce , pris sur le pied anglais (1).

Maintenant le rapport entre les sinus d'incidence et de réfraction , lorsque la lumière passe du vide dans l'air , ne pouvant être donné par une expérience immédiate , nous avons un moyen de le déterminer , en profitant d'une autre observation de Newton , qui consiste en ce que les puissances réfractives de deux substances sont à très-peu près proportionnelles à leurs densités , pourvu que ces substances soient l'une et l'autre inflammables ou non inflammables.

256. Pour évaluer les puissances réfractives , Newton suppose qu'un rayon de lumière *cr* (fig. 163) rencontre la surface *ab* de chaque corps sous un angle presque infiniment petit *crs* , ou , ce qui revient au même , il suppose que l'angle d'incidence *crs* soit sensiblement droit (2) ; il décompose ensuite le mouvement *cx* du rayon rompu en deux directions , dont l'une *cs* est située sur la surface réfringente , et l'autre *cs* lui est perpendiculaire. Comme le rayon incident *cr* avait une vitesse censée nulle dans le sens de

(1) *Optique desirée*, liv. 2, para. 2. *Considerationes super prædictæ observationibus*.

(2) *Ibid.*, liv. 2, para. 5, prop. 16.

la même perpendiculaire, tout l'effet du mouvement qui a lieu suivant cette direction, provient de la force accélératrice, ou de la puissance réfractive du milieu. Or, on prouve, par la théorie des mouvements accélérés, que si l'on suppose la ligne ca constante, la puissance réfractive sera comme le carré de la perpendiculaire ga . Quant à la densité, elle s'efface, comme l'on sait, d'après la pesanteur spécifique de chaque corps.

235. Supposons que rg représente le rayon rompu relatif à la réfraction de la chaux sulfatée transparente que nous prenons ici pour terme de comparaison, et que rg' soit le rayon rompu relatif à la réfraction du mica, laquelle doit être plus considérable que dans la chaux sulfatée, la densité du mica étant à celle de la chaux sulfatée comme 2,792 : 2,252.

Or, le carré de ga est, suivant Newton, 1,213, ra étant désigné par l'unité. On aura donc $(ga)^2$ ou 1,213 : $(g'a)^2 :: 2,252 : 2,792$. Ayant $g'a$, on trouve facilement l'angle $rg'a$ de $39^\circ 11'$, d'où l'on conclut que le sinus d'incidence est au sinus de réfraction, lorsque la lumière passe du mica dans l'air, comme le sinus de $39^\circ 11'$ est au rayon r ; car alors l'angle $g'ra$ égal à l'angle $rg'a$ devient l'angle d'incidence, et sera celui de réfraction. Donc notant x l'épaisseur de la lame de mica, à l'endroit qui réfléchit le bleu pur, on aura, d'après la règle de Newton :

est à, $q : 1 \sin. 39^{\circ} 11' : R$, ce qui donne $a \approx 1,511$ millionième de ponce, pris sur le pied anglais, ou environ 1, 5 millionième de ponce, pris sur le pied français (1), c'est-à-dire, à peu près 45 millionièmes de millimètres.

S O U F R E.

Mon objet est d'exposer ici la méthode que j'ai employée pour déterminer la réfraction de cette substance.

264. Si l'on regarde un corps à travers un prisme triangulaire d'une matière transparente quelconque, et qu'en même temps on fasse tourner ce prisme sur son axe dans un sens ou dans l'autre, on s'apercevra qu'il y a un terme où l'image devient stationnaire, on sentira que si l'on continue de faire tourner le prisme dans le même sens, et que jusqu'alors l'image est en, par exemple, un mouvement descendant, elle commencera à monter. Or, ce terme, auquel correspond le passage d'un mouvement à l'autre, est en même temps celui où le rayon incident, qui va de l'objet au prisme, forme, avec la face qu'il rencontre, un angle égal à celui que le rayon émergent, qui va du prisme à l'œil, forme avec la face par laquelle il sort. Soit $\alpha g i$ (Fig. 170.)

(1) Le pied anglais vaut 12 ponce & lignes 2, Encyclop. méthod. Mathém., t. II, 2^e partie, p. 580.

une coupe du prisme faite suivant un plan perpendiculaire à l'axe. Soit a la position du corps et b celle de l'œil. Soit de plus, ac le rayon incident, cb le rayon rompu et bc le rayon émergent prolongé. L'image deviendra stationnaire, lorsque les angles acb et cba seront égaux, d'où il suit que dans ce même cas le rayon rompu cb fera aussi des angles égaux bcf , cba avec les deux côtés du prisme.

Ayant donc visé à travers un prisme de soufre, dont l'angle réfringent étoit de 25° , un objet a , tel que la flamme d'une bougie, placée à plusieurs mètres de distance, j'observai les choses au point où l'image parut stationnaire, en faisant tourner doucement le prisme sur son axe, dont la position étoit verticale. Je cherchai ensuite à quel point répondoit la position a de cette image, laquelle se trouvoit nécessairement sur la direction du rayon cb prolongé. C'est à quoi l'on parviendra, si l'on regarde immédiatement avec le même œil une corde tendue verticalement par un poids, et placée de manière qu'elle parcoure toutes les images vue par réflexion.

Cela fait, il me fut aisé de mesurer l'angle que formaient avec l'œil placé en b , les rayons partis de a et de x , lequel angle étoit sensiblement égal à 200° , vu la distance des points a , x . C'est ce que j'exécutois à l'aide d'une espèce de graphomètre, dont le centre répondait à la position de

mon œil, et dont les deux abboles furent dirigées l'une vers le corps s , l'autre vers la corde que rencontrait le rayon ra . Je trouvai que cet angle étoit d'environ 12° , c'est-à-dire, égal à l'angle réfringent du prisme, égalité qui n'a lieu ici que par accident.

Maintenant menons l'apothème gh du triangle isocèle agf , et la perpendiculaire pg relative au rayon incident ac . On aura pg pour l'angle d'incidence, et ag pour l'angle de réfraction.

Or en étant une perpendiculaire abaissée du sommet du triangle rectangle posé sur l'hypothénuse, il en résulte que $\alpha \sin \alpha = \alpha' \sin \alpha'$. Donc, en général, l'angle de réfraction est égal à la moitié de l'angle réfringent du prisme.

De plus, par un jeu un peu + remarquable + avec un 1/2 que + avec un 1/2 que + avec un 1/2 que + 1/2 de.

Dans, α' , l'angle d'incidence est égal à la moitié de l'angle mesuré, car plus à celle de l'angle réfringent.

Donc dans le cas de l'expérience citée, où l'un et l'autre angle étaient de 45° , l'angle d'incidence se trouvait aussi de 45° , et l'angle de réfraction avait pour mesure $\tan^{-1} \frac{1}{2}$.

Or, sin. $13^{\circ} \frac{1}{2}$: sin. $85^{\circ} 15'$:: 425, d'où l'on voit que le rapport est un peu moindre que celui de 2 à 3.

216. Il s'agit de savoir si la théorie donnera le même rapport. Pour parvenir au but de cette

recherche, choisissons quelques-unes substances combustible, telle que le soufre, qui nous serve de terme de comparaison. Nous avons vu, en parlant du mica, de quelle manière Newton estimoit, en général, la puissance réfractive. Reprenons la fig. 169, et supposons que la puissance réfractive du soufre soit représentée par le carré de la perpendiculaire ng' , et celle du mica par le carré de ng .

D'après les expériences de Brisson, la densité du mica est à celle du soufre :: 10780 : 20832, et le carré de ng , suivant Newton, est 1,42.

On aura donc 10780 : 20832 :: 1,42 : $(ng')^2$. Opérant par logarithmes, on trouvera 0,2258748 pour celui de ng' . D'ailleurs $rn = 1$; résolvant le triangle rectangle rng' , à l'aide de ces données, on trouvera $31^\circ 25'$ pour la valeur de l'angle $ng'n$, égal à l'angle de réfraction rng' ; mais l'angle d'incidence *en* est sensiblement droit; donc le sinus de réfraction est à celui d'incidence comme le sin. de $31^\circ 25'$ est au rayon, ou à peu près comme 52 est à 100, rapport qui est de même un peu plus petit que celui de 1 à 2.

ARRAGONITE.

256. Choisissons d'abord la variété dont le prisme a trois angles de 120° chacun, qui alternent

avec deux angles de 116° , et un de 104° . Soit Ad (Fig. 171) la projection horizontale de ce prisme, dans laquelle A et B représentent les projections particulières des deux prismes qui sont entiers, et C , D celles des prismes qui sont incomplets par l'effet d'une loi de décroissement, laquelle produit, relativement à chaque prisme, une face dirigée suivant pd . Les angles g, g étant chacun de 116° , et les angles h, h , etc., de 64° , il en résulte que chacun des deux angles p est aussi de 64° ; et il est même facile de prouver que cette égalité ne dépend pas de la mesure particulière des angles, mais qu'elle aura toujours lieu, quelles que soient les valeurs des angles g, g , pourvu que les angles h, h , etc., soient leurs suppléments. Car nous avons, par la supposition, $h = 180^\circ - g$; d'où nous $g' + g' + p + p$, ou $2g' + 2p = 360^\circ$; donc $2p = 360^\circ - 2g'$. Donc $p = 180^\circ - g' = h$.

257. Cela posé, soit $plad$ (Fig. 172) la coupe horizontale du prisme D (Fig. 171), en le supposant entier; et soit pd (Fig. 172) la même ligne que Fig. 171. Si par le point k nous menons la parallèle à lp , nous pourrions concevoir le plan de jonction qui passe par lp , comme produit en vertu d'un décroissement semblable à celui qui agissait sur l'angle k , pour faire naître une face dirigée suivant ka .

Soit donc la coupe de la première lame de superposition; menons les deux diagonales Ak, pm ,

puis abaissons rs perpendiculaire sur Ab . Il s'agit d'abord de trouver le rapport entre rk et rs , d'où nous déduirons ensuite aisément celui qui existe entre le nombre de rangées soustraites en largeur suivant ks , et le nombre de rangées soustraites en hauteur suivant rs .

Or, $kr : rs :: ab : ap$. Cherchons une expression générale de ce dernier rapport, en supposant que les angles du rhombe aient des valeurs quelconques, pourvu que δpl soit égal à pbn . Soit $ab = g$, $ap = p$, $ab = x$. Déterminons d'abord la valeur de x en fonctions de g et p .

Ayant mené As perpendiculaire sur bp , nous aurons $ap \times (ab + x) = As \times bp$.

Or $ap = p$, $ab = g$. Maintenant si nous menons py perpendiculaire sur ba , nous aurons $As = py$

$\sqrt{\frac{4g'p'}{g' + p'}}$. De plus $bp = \sqrt{(ap)^2 + (ab)^2} = \sqrt{p^2 + x^2}$.

Ces différentes valeurs étant substituées dans l'équation précédente, elle devient $p(g + x) =$

$\sqrt{\frac{4g'p'}{g' + p'}} \times \sqrt{p^2 + x^2}$, ou $g + x = \sqrt{\frac{4g'p'}{g' + p'}} \times \sqrt{p^2 + x^2}$.

Élevant tout au carré, et exécutant la multiplication indiquée dans le second membre, x^2

$+ 2gx + g^2 = \frac{4g'p' + 4g'x^2}{g' + p'}$.

Et faisant disparaître le dénominateur du se-

second membre, $g'x' + ag'x + g' + p'x' + ag'p'x + g'p' = ag'p' + ag'x'$, d'où l'on tire
 $x' = \left(\frac{ag'x + ag'p'x}{3g' - p'} \right) = \frac{g' - ag'p'}{3g' - p'}$. Complétant les
 carrés, $x' = \left(\frac{2g' + ag'p'}{3g' - p'} \right)x + \frac{g' + ag'p' + g'p'}{9g' - ag'p' + p'}$
 $= \frac{g' - ag'p'}{3g' - p'} + \frac{g' + ag'p' + g'p'}{9g' - ag'p' + p'}$; et multipliant les
 deux termes de $\frac{g' - ag'p'}{3g' - p'}$ par $3g' - p'$, puis réduisant
 $x' = \left(\frac{2g' + ag'p'}{3g' - p'} \right)x + \frac{g' + ag'p' + g'p'}{9g' - ag'p' + p'}$
 $= ag' \left(\frac{g' - ag'p' + p'}{9g' - ag'p' + p'} \right)$; extrayant les racines
 $x = \left(\frac{g' + g'p'}{3g' - p'} \right) = \pm ag' \left(\frac{g' - p'}{3g' - p'} \right)$, d'où l'on tire
 $x = \frac{g'}{3g' - p'} ((g' + p') \pm (ag' - ap'))$.

Si dans le second membre on prend le signe positif, on trouve $x = g$, solution relative à une autre question, dans laquelle on supposeroit que l'angle $\delta p \hat{a}$ fat le supplément de l'angle $p \hat{a} n$. Car alors il est bien évident que pa se confond avec pk , en sorte que ab devient égale à ak ou à g . Pour satisfaire à la question présente, il faut donc prendre le signe négatif, ce qui donne $x = g \left(\frac{2p' - g'}{3g' - p'} \right)$. Nous aurons donc $pk : pa :: ab : ap ::$

$$g \left(\frac{3p' - g'}{3g' - p'} \right) : p :: g(3p' - g') : p(3g' - p').$$

258. Maintenant soient g' et p' les demi-diagonales de la molécule, lesquelles correspondent à ab et ap . Soit N le nombre de p' contenues dans re , et N' le nombre de g' contenues dans ek ; N' représentera aussi le nombre de p' contenues dans en . Soit n le nombre d'arêtes de molécule contenues dans ke , et n' celui d'arêtes contenues dans ea . Il est aisé de voir que ce dernier nombre n' est la moitié du nombre de p' contenues dans ea ,

ou dans $ea - en$. Donc, $n' = \frac{N - N'}{2}$. Mais à cause

de ce que, le nombre d'arêtes contenues dans ea sera aussi pour exprimer $\frac{N - N'}{2}$. De plus, le

nombre d'arêtes contenues dans ek est égal au nombre de p' contenues dans er , c'est-à-dire, qu'il est égal à N' ; donc, ajoutant cette dernière quantité à $\frac{N - N'}{2}$, on aura tout $\frac{N - N'}{2} + N' = \frac{N + N'}{2}$.

Donc $n' : n :: N - N' : N + N'$.

Mais $ek : ea :: ab : ap :: g(3p' - g') : p(3g' - p')$:: $g'N' : p'N$; et parce que $p : g :: p' : g'$, $3p' - g' :: 3g' - p' :: N' : N$.

Donc $N - N' : N + N' :: 3g' - p' :: (3p' - g')$:: $3g' - p' + (3p' - g')$:: $2g' - ap' : g' + p'$. Donc aussi $n' : n :: 2g' - ap' : g' + p'$.

On voit par là que le problème sera toujours

inscriptible d'une solution minéralogique, toutes les fois que les carrés des diagonales seront des nombres rationnels.

Soit $g = \sqrt{5}$ et $p = \sqrt{2}$, ce qui donne pour le grand angle du rhombe $115^{\circ} 32'$, comme dans l'aragonite; on aura $n' : n :: 6 : 5$.

Si l'on faisoit $g = \sqrt{3}$ et $p = \sqrt{2}$ comme dans la chaux carbonatée, on trouveroit $n' : n :: 2 : 5$.

Soit encore $g = \sqrt{3}$ et $p = 1$; on aura $n' : n :: 4 : 4$, c'est-à-dire, qu'alors même, ou, ce qui revient au même, δp se confond avec δp , en sorte que $\alpha\delta$ devient nulle. C'est en effet ce qui doit avoir lieu, puisque dans ce cas $\delta p h = 120^{\circ}$ et $p \sin \alpha p h$, moitié de 120° .

Enfin, si l'on fait $g = 1$, $p = 1$, comme dans le cube, on trouve $n' : n :: 0 : 2$, ce qui fait voir encore que $\alpha\delta$ devient nulle, et que h se confond avec $p h$, comme cela doit être, puisqu'alors l'angle $\delta p h$ devient égal à $\delta p h$.

263. Dans une autre variété, le prisme total est composé de quatre prismes partiels A, B, C, D (fig. 173), qui ont leur angle α, β, γ ou λ , de 110° (1); et pour quelle vides qui seroit laud per

(1) On a donné à la figure les dimensions arbitraires, pour que A, B, C, D soient de trois espèces. On désigneroit les côtés $\alpha\gamma$, $\beta\gamma$ ou $\gamma\delta$, et semblablement d'autres, par quatre autres côtés, mais cela ne change rien à ce qui va être dit.

surprimes, à l'endroit du rhombédreux, se trouve comblé; chacun d'eux, par exemple, le prisme A reçoit une addition indiquée par le triangle rectangle Ar , et qui provient d'un décroissement sur l'arête qui passe par le point r . Or, dans ce triangle, Ar mesure nécessairement un certain nombre de facettes de molécule, et Ar , qui est sur le prolongement du côté ac , mesure un autre nombre de facettes; et parce que les facettes sont égales de part et d'autre, il en résulte que Ar doit être en rapport rationnel avec ac . Maintenant si l'on prend Ar pour sinus total, Ar sera le cosinus de l'angle aigu du rhombe $acAr$. Mais j'ai démontré que le rapport entre l'un et l'autre étoit toujours rationnel, pourvu que les côtés des diagonales fassent eux-mêmes un rapport rationnel, ce qui parait général pour tous les rhombes qui appartiennent aux différentes espèces de cristaux. Il y a donc nécessairement une loi de décroissement possible, qui produira la partie excédente indiquée par le triangle Ar . Si l'on suppose, par exemple, $g=\sqrt{b}$, $p=\sqrt{a}$, comme ci-dessus, on trouve, en appliquant ici la formule $g'+p' : g'-p'$, qui donne généralement le rapport dont il s'agit, que $Ar : Ar :: 7 : 3$, sur quoi il est à remarquer que ce rapport $g'+p' : g'-p'$, ne diffère de celui qui a été déterminé plus haut entre n et n' , qu'en ce que dans celui-ci le terme qui répond à n' est double de $g'-p'$.

H 2

D I S T R I B U T I O N

M É T H O D I Q U E (1)

E T D É S C R I P T I O N

D E S E S P È C E S M I N É R A L O G I Q U E S.

N O T I O N S P R É L I M I N A I R E S

Sur les principes composans des Minéraux.

Mon objet, dans cet article, n'est pas d'exposer les connaissances élémentaires relatives à la chimie des minéraux. Je suppose qu'on les a acquises d'ailleurs, et je veux seulement établir ici, sous un même point de vue, les divers principes composans des substances comprises dans les quatre classes qui subdivisent le royaume minéral. Ce tableau, placé à l'entrée de la méthode, aidera le lecteur à mieux se reconnaître dans les

(1) On retrouvera cette même distribution, réduite en tableau, dans le volume des planches.

tous des genres et des espèces dont elle offre l'assemblage.

J'observai, avant tout, que l'analyse chimique est une opération qui marche par degrés, et dont les produits se ramifient, pour ainsi dire, à mesure qu'elle est poussée plus loin, en sorte qu'un principe retiré d'un minéral, dans une première expérience, peut être décomposé, à son tour, dans une expérience ultérieure, et l'on regarde comme simples les principes qui ont résisté jusqu'ici à tous les moyens connus, pour en extraire d'autres principes plus déguisés.

Or, dans une distribution des minéraux, fondée sur les résultats de l'analyse, ce sont les produits immédiats de cette opération qui déterminent, les uns les genres, et les autres les espèces. Ainsi, dans la classe des substances acidifères, on ne considère que le résultat qui a donné immédiatement, d'une part, la base terreuse ou alcaline, et de l'autre, l'acide uni à cette base, en faisant abstraction des éléments médiate, tels que l'oxygène et le radical, qui concourent à la composition de l'acide. J'ai cru, par cette raison, devoir présenter de préférence le tableau de ces produits prochains de l'analyse, qui ont fourni les bases de la méthode, en indiquant ceux qui ont été décomposés et ceux qui sont simples, ou du moins crus tels, dans l'état actuel de la science.

1°. TERRES. On en compte neuf, dont l'existence est bien avérée, savoir :

1. La silice, qui est comme le fond de toutes les substances connues sous les noms de quartz et de silex. Fondue avec des ash, elle forme le verre commun.

2. L'alumine, ainsi nommée, parce qu'elle est la base du sel que les anciens chimistes appeloient alus. Quelques auteurs lui ont donné le nom d'*argile* ; mais en minéralogie, ce nom désigne un mélange d'alumine, de quartz, et autres principes.

3. La chaux, base des substances appelées calcaires, où elle est unie avec l'acide carbonique, qui s'en dégage par la calcination. Elle entre parmi les principes d'une grande partie des substances terreuses.

4. La magnésie, base de la substance acidifiée, nommée anciennement *Sel d'Epsom*.

5. La zircone, découverte par Klaproth, dans les cristaux nommés *hyacinthes* et *jargons* de Ceylan, qui ne forment plus aujourd'hui qu'une seule espèce, sous la dénomination de zircone. Ils participent de la grande pesanteur spécifique de cette terre, qui entre, au moins pour les trois cinquièmes, dans leur composition.

6. La baryte ou terre pesante, qui fait la fonction de base dans deux substances acidifiées, savoir : la baryte sulfatée, anciennement *spath*

peuant , et la baryte carbonatée , connue d'abord sous le nom de *terre pesante aérienne*.

7. La strontiane , base de la substance acide-fluë , que nous nommons *strontiane oxygénée*. Son nom est tiré de celui de *Strontian* , endroit de l'Ecosse où l'on a trouvé la substance qui la renferme. On l'avoit d'abord confondue avec la baryte ; mais les différences qu'elle a offertes avec cette dernière terre , dans des expériences plus récentes , lui assignent un rang à part (1).

8. La glucyse , découverte par Vauquelin , dans les schistes appelés jusqu' alors *dovals* et *sigues-marines de Sibérie* , et dont le nom , qui signifie doux , agréable , est emprunté de la propriété qu'a cette terre de produire , avec les acides , des dissolutions sucrées.

9. L'yttria , dont M. Gadolin a reconnu , le premier , l'existence dans la substance terreuse , à laquelle cette circonstance a fait donner le nom de *gadolinite*. Celui d'yttria , que porte la nouvelle terre , a rapport à la localité de la substance qui la renferme , et qui se trouve à Ytterby , en Suède. Vauquelin a observé que cette terre avoit de l'analogie avec la glucyse. Elle forme , comme celle-ci , avec les acides , des dissolutions sucrées , mais dont la saveur a quelque chose de plus astringe,

(1) *Tellerus*, Min. et Oeuv. de chimie , tome II , page 491 et suiv.

et qui approche davantage de celle des dissolutions de plomb. L'yttria diffère d'ailleurs de la glaucine, en ce qu'elle n'est pas soluble comme elle dans les acides élastiques; en ce que le sel qu'elle forme avec l'acide sulfurique, au lieu d'être très-soluble, comme quand c'est la glaucine qui fait la fonction de base, est, au contraire, très-peu soluble; enfin, en ce qu'elle est précipitée de ses dissolutions dans les acides, par le prussiate de potasse, ce qui n'a pas lieu pour la glaucine.

Nota. On a parlé d'une dixième terre trouvée dans le Béril de Saxe, et que l'on a nommée *apandite*, parce que ses dissolutions dans les acides n'ont aucune saveur.

2°. *Acides.* Ceux que l'on a réunis jusqu'ici des minéraux, sont au nombre de treize, savoir:

À base élastique non métallique.	{	1. L'acide sulfurique.
		2. L'acide phosphorique.
		3. L'acide carbonique.
Ayant bases pour bases.	{	4. L'acide nitrique.
		5. L'acide arsenique.
À base métallique.	{	6. L'acide molybdique.
		7. L'acide osélique (élastique).
		8. L'acide chromique.
À deux bases, le carbone et l'hydrogène.	{	9. L'acide succinique.
		10. L'acide du mellite ou de l'ibogistein de Werner.

- A base
incertaine. { 11. L'acide muriatique.
 { 12. L'acide fluorique.
 { 13. L'acide boracique.

3°. ALCALES.

1. La soude.
2. La potasse.
3. L'ammoniaque.

4°. COMBUSTIBLES NON MÉTALLIQUES.

1. Le carbone.
2. Le soufre.

5°. MÉTAUX.

1. Le platine.
2. L'or.
3. L'argent.
4. Le mercure.
5. Le plomb.
6. Le cuivre.
7. Le nickel.
8. Le fer.
9. L'étain.
10. Le zinc.
11. Le bismuth.
12. Le cobalt.
13. Le manganèse.
14. L'antimoine.
15. L'arsenic.
16. L'arsenic.
17. Le molybdène.
18. Le titane.

19. Le schéelin.

20. Le tellure.

21. Le chrome.

6°. Houx.

1. Huile de succin.

2. Pétrole.

7°. L'oxygène. Dans tous les métaux oxydés.

8°. L'acmoxène *oxydée*. Dans l'acmoxine, de l'arsène naturel.

9°. L'eau de cristallisation. On sait que ce principe, qui existe en quantité sensible dans les substances acidifères solubles et dans plusieurs substances terreuses, n'appartient point à leur essence, mais est nécessaire à leur cristallisation. Les chimistes ont coutume d'indiquer, dans les résultats de leurs analyses, son rapport avec les autres principes.

Voilà cinquante-deux produits immédiats qui ont été retirés des différens minéraux analysés jusqu'ici. Il s'en trouve plusieurs parmi eux, qui constituent seuls et par eux-mêmes des espèces proprement dites. Ainsi, le quartz pur est uniquement composé de silice ; le talc, d'alumine ; les métaux qu'on appelle naïfs, ont le même degré de simplicité. D'autres produits, qui sortent immédiatement de certaines substances, font ailleurs la fonction de principes médians. Tel est l'oxygène, considéré, d'une part, dans les métaux

oxydes, et de l'autre, dans les substances qui renferment un acide.

Des cinquante-deux principes qui composent le tableau, trente-cinq sont en nombre des êtres simples de la nouvelle chimie, savoir : les neuf terres; deux alcalis, la soude et la potasse; les deux combustibles non métalliques, qui sont le carbone et le soufre; les vingt-un métaux; et enfin l'oxygène. Ajoutez deux autres combustibles, le phosphore et l'hydrogène, puis le calorique et la lumière, et vous aurez l'ensemble des trente-neuf corps que l'on doit considérer comme simples, en plaçant, comme on l'a fait souvent, la simplicité à l'endroit où s'arrête l'expérience.

PREMIÈRE CLASSE

SUBSTANCES ACIDIFIÈRES,

Composées d'un acide uni à une terre ou à un alcali, et quelquefois à l'un et à l'autre.

Cette classe, moins nombreuse que la suivante, renferme des substances, la plupart fusibles au chalumeau, (la chaux sulfatée, la chaux fluorée, la baryte sulfatée, la magnésie boratée, etc.), ou même à la simple flamme d'une bougie, (l'acétine fluorée alcaline, la magnésie sulfatée, la soude boratée, etc.) Plusieurs se dissolvent dans

feru, (la magnésie sulfatée, la potasse nitratée, l'ammoniaque muriaté, etc.), et d'atome dans l'acide nitrique, (la chaux carbonatée, la strontiane carbonatée, la soude carbonatée, la chaux phosphatée, la chaux arseniatée). Une seule, la magnésie boratée, est électrique par la chaleur. Les couleurs sont, en général, peu variées, si ce n'est dans l'espèce de la chaux fluorée.

Parmi les formes primitives connues, le rhomboïde ne se rencontre qu'une seule fois, savoir dans la chaux carbonatée. Deux espèces donnent le cube, la magnésie boratée et la soude muriatée; cinq donnent l'octaèdre, qui est régulier dans la chaux fluorée, l'ammoniaque muriaté, et l'alumine sulfatée alcaline, et simplement rectangulaire dans la potasse nitratée et l'alumine fluorée alcaline. Une seule, la chaux phosphatée, donne le prisme hexaèdre régulier. Les autres espèces, qui sont la chaux sulfatée, la baryte sulfatée, la strontiane sulfatée, la magnésie sulfatée et la soude boratée, ont pour noyau un prisme quadrangulaire, qui est droit dans les quatre premières, et oblique dans la cinquième.

C'est à cette même classe qu'appartient celle de toutes les espèces de minéraux, où la cristallisation a le plus diversifié ses produits, c'est-à-dire, la chaux carbonatée. En général, cette classe est très-favorable à l'étude de la cristallographie, par la facilité de déterminer les formes primitives,

à l'aide de la division mécanique, par la netteté des formes secondaires, et par la simplicité des lois dont la plupart dépendent.

Parmi les substances auxquelles on a donné le nom de sels, comme la magnésie sulfatée, la potasse nitratée, l'arsénique muriaté, etc., nous nous sommes contentés de décrire les plus communes, surtout celles que l'on trouve quelquefois à l'état pur. Nous avons joint à l'indication de leurs caractères, celle des résultats de l'analyse qu'elles présentent, lorsqu'on les fait cristalliser dans un liquide aqueux. Ortez que les résultats de cette opération ne sont, pour ainsi dire, qu'une extension de ceux de la nature, et ne font que diriger ses moyens vers le but qu'elle atteindrait si les circonstances étoient favorables, l'étude des sels cristallisés peut seule nous faire bien connaître ces substances, dont nous n'aurions qu'une idée très-imparfaite, en nous bornant à les considérer dans leur état ordinaire, où elles se présentent sous la forme d'une efflorescence qui n'a aucun caractère pressenti.

Si nous essayons maintenant de faire contraster les caractères de cette première classe avec ceux de la seconde, nous pouvons dire qu'elle se est distinguée, en ce que les corps qu'elle comprend sont les seuls qui aient quelque-une des propriétés suivantes :

1°. Solubilité dans l'eau ou dans l'acide nitrique.

2°. Facilité à la flamme d'une simple bougie.

3°. Electricité par la chaleur, en plus de deux points opposés.

4°. Division en octaèdres régulier, sans que le corps puisse rayer le verre.

5°. Pesanteur spécifique au-dessus de 5, 5, sans que le corps raze le verre.

La classe des substances acidifiables est distinguée de la troisième et de la quatrième, en ce qu'aucun des corps qui y sont compris n'est combustible, et n'a le brillant métallique, ou n'est susceptible de l'acquies par la réduction.

PREMIER ORDRE.

SUBSTANCES ACIDIFÈRES TERREUSES,

Composées d'un acide uni à une terre.

PREMIER GENRE.

CHAUX.

PREMIÈRE ESPÈCE.

CHAUX CARBONATÉE.

Carbonate de chaux des chimistes.

Chaux séchée, de Bern, *t. I*, p. 281. Id., Schlegel, *t. I*, p. 170. Spath calcareo, de Lisle, *t. I*, p. 420. Kalkstein, Klaproth, *t. I*, p. 437. Calc. combined with fixed air, séchée or mild calc. Kirwan, *t. I*, p. 75.

Caractère essentiel. Divisible en rhomboïde de $101^{\circ}4'$ et $76^{\circ}4'$; soluble avec effervescence dans l'acide nitrique.

Caractères physiques. Pouvoir spécifique 2,5
... 2,8.

Durété. Rayant la chaux soignée, rayée par la chaux fluatée.

Réfraction, double à un degré très-marqué, même à travers deux faces parallèles.

Phosphorescence; sensible dans certains variétés, par l'injection de la poussière sur un charbon ardent.

Caract. géom. Forme primitive. Rhomboïde obus (fig. 1) pl. XXIII, dont les angles sont de $100^{\circ} 32' 13''$, et $78^{\circ} 27' 47''$.

Molécule intégrante. Id. (1).

Caract. chim. Soluble avec effervescence dans l'acide nitrique.

Réductible en chaux vive par la calcination.

Analyses de la chaux carbonatée pure, par Bergmann.

Chaux	55
Acide carbonique	54
Eau de cristallisation	(2)

Si l'on ajoute l'eau de cristallisation	100
à la chaux carbonatée pure	155

Caractères distinctifs ; n^o. Entre la chaux soluble et la chaux sulfatée. Celle-ci se délite facilement que dans un seul verre, et ses larmes donnent, au moyen de la percolation, des résidus de 118 et 67^e. La chaux carbonatée, au contraire, se délite dans tous les sens; d'où résultent des angles plans de $100^{\circ} \frac{1}{2}$ et $78^{\circ} \frac{1}{2}$. La chaux sulfatée ne fait point effervescence avec l'acide ni-

(1) La densité habituelle de chaux est 1,65. Celle de la chaux carbonatée est 1,5.

trique comme le chaux carbonatée. 2°. Entre le chaux carbonatée et le chaux fluaté. La première est rayée par l'autre. Elle donne , à l'aide de la division mécanique , des lames , dont les angles sont de 120° et 60° , et les de $101^{\circ}\frac{1}{2}$ et $78^{\circ}\frac{1}{2}$. Sa réfraction est simple , et celle de la chaux carbonatée est double. Elle n'est point effervescente comme celle-ci , par l'acide nitrique. 3°. Entre le chaux carbonatée fibreux et la méso type de même forme. Celle-ci se convertit en gelée dans l'acide nitrique ; l'autre s'y dissout avec effervescence. La méso type se fond au chalumeau en bouillonnant , et non la chaux carbonatée. 4°. Entre la chaux carbonatée et la chabasie. Celle-ci se divise en rhomboïdes peu différens du cube , et la chaux carbonatée en rhomboïdes très-sensiblement cubus. La chabasie se fond au chalumeau en se bouillant , ce que ne fait pas la chaux carbonatée ; elle n'est point soluble dans l'acide nitrique. 5°. Entre la chaux carbonatée et la strontiane carbonatée. Celle-ci a une pesanteur spécifique plus forte dans le rapport d'environ 9 à 7 ; elle se divise par des coupes qui ont peu de netteté , parallèlement aux pans d'un prisme hexaèdre ; et la chaux carbonatée , par des coupes très-nettes , parallèlement aux faces d'un rhomboïde obus. La strontiane carbonatée donne , au chalumeau , une belle lueur purpurine , ce qui n'a pas lieu pour la chaux carbonatée. 6°. Entre la chaux carbo-

matte cristalline et certains cristaux transparents de plomb carbonaté. Ceux-ci ont une pesanteur spécifique plus que double de celle de la chaux carbonatée : ils ne se dissolvent pas comme elle en rhomboïde. Ils noircissent par la vapeur du sulfure ammoniacal, ce que ne fait pas la chaux carbonatée.

V A R I É T É S.

FORMES DÉTERMINABLES.

Spathum, *Waller*, t. I, p. 140. *Spath calcaire*, de *Born*, t. I, p. 107. Pierres calcaires cristallines ; *spath calcaire*, *Stropt*, t. I, p. 181. *Kalk-Spath*, *Krumpholtz*, t. I, p. 453. *Spath calcaire*, *Douglton*, *tabl.*, p. 22. *Foliated and sperry limestone*, *Kirwan*, t. I, p. 36. La *spath calcaire*, *Brochant*, t. I, p. 535.

Spathes calcaires de la plupart des minéralogistes.

Lois particulières de développement observées jusqu'ici (1).

(1) La chaux carbonatée dans ses cristaux doit en former cristallins, non-seulement elle doit présenter les lois des différents loz que les déterminent, et disposer les cristaux selon l'ordre des combinaisons une à une, deux à deux, etc., de ces mêmes loz.

1. P.

2. A.

3. B.

4. B.

5. B.

6. B.

7. E. E.

8. (E. B. D.).

9. (¹E. B. D.)

10. D.

11. D.

12. D.

13. D.

14. a.

15. a.

16. a.

17. a.

18. a.

19. a.

20. a.

21. a.

Combinaisons une à une.

1. Chaux carbonatée primitive. P (fig. 1).
Spath calcaire rhomboïdal, vulgairement *oriental d'Irlande*, de Lisle, t. I, p. 437. Inclinaisons respectives des faces, $104^{\circ} 28' 40''$, et $75^{\circ} 32' 20''$; angles plans, $104^{\circ} 32' 12''$, et $75^{\circ} 27' 47''$; angles de la coupe principale, $108^{\circ} 28' 6''$, et $71^{\circ} 23' 54''$.

Les cristaux de cette variété, donnés immédiatement par la nature, sont ordinairement groupés et transsécides. Les corps que l'on appelle vulgairement *spathe d'Irlande* ou *cristaux d'Irlande*, présentent bien un rhomboïde de la même forme, mais ne sont, le plus souvent, que des fragments d'un cristal différent ou d'une masse irrégulièrement terminée, dont on a fait une variété particulière, à cause de leur transparence et de la propriété qu'ils ont de doubler les objets; propriété dont jouissent également tous les cristaux diaphanes de la même espèce, quelle que soit leur forme.

2. Chaux carbonatée épaisse. $\frac{B}{g}$ (fig. 2) (1).

(1) Dans cette figure et dans plusieurs des suivantes, on a représenté le noyau inscrit dans le cristal secondaire, pour aider à mieux concevoir la formation de la structure.

En rhomboïde très-obtus, dont l'axe est égal à celui du noyau qu'il renferme. Spath calcareux en parallélipèdes rhomboïdaux très-comprimés, de *Lisle*, t. I, p. 504; var. a. Incidence de g sur g , $139^{\circ} 15' 36''$; de g sur g' , $45^{\circ} 34' 22''$; angles plans, $174^{\circ} 18' 50''$, et $65^{\circ} 41' 4''$; angles de la coupe principale, $139^{\circ} 28' 54''$, et $40^{\circ} 36' 8''$.

Prop. géom. La diagonale horizontale est double de celle du noyau, et la diagonale oblique est égale à l'arête du noyau. Cette propriété est générale, quelque soient les angles de la forme primitive.

On a appelé cette variété *spath calcareux double*, désignation qui ne convient qu'à une altération de la même forme, qui sera citée parmi les formes indéterminables.

Se trouve à Bohanya et à Joachimsthal en Bohême; à Andrienberg ou Harta, etc.

3. Chaux carbonatée *interie*. $\frac{E}{f} \frac{E}{f}$ (fig. 3). En rhomboïde aïgé qui présente l'inverse de la forme primitive. Spath calcareux *variétique*, de *Lisle*, t. I, p. 500; var. 12. Incidence de f sur f , $75^{\circ} 29' 47''$; de f sur f' , $101^{\circ} 32' 13''$; angles plans, $75^{\circ} 31' 20''$, et $104^{\circ} 28' 40''$; angles de la coupe principale, $105^{\circ} 26' 6''$, et $71^{\circ} 38' 54''$.

Prop. géom. La diagonale horizontale égale trois fois celle du noyau, et la diagonale oblique égale trois fois l'arête du noyau. Ce résultat est

particulier à la cristallisation de la chaux carbonatée.

Les angles plans des rhombes sont égaux aux incidences mutuelles des faces du noyau, et réciproquement les incidences des faces sont égales aux angles plans du noyau; de là répétition d'erreur. Les angles de la coupe principale sont les mêmes de part et d'autre.

Quelquefois on ne voit que les sommets supérieurs des rhomboïdes aigus, dont les parties inférieures s'allongent par l'effet d'une cristallisation précipitée, en forme d'aiguilles qui convergent vers un centre commun : c'est alors le quartz calcaire strié de quelques auteurs.

Se trouve à Cognac, près de Lyon, en cristaux très-prochaines, quelquefois linsides; et dans les bancs de pierre calcaire des environs de Paris, en petits cristaux transodés et jaunâtres.

4. Chaux carbonatée métastatique $\frac{D}{r}$ (fig. 4).

c'est-à-dire, de transport (1). Dodécaèdres à faces triangulaires scalènes, vulgairement dentic de cochen, de Lisle, crist., t. I, p. 550; var. 1, incidences de r sur r , à l'endroit de l'arête x , $104^{\circ} 28' 40''$; de r sur r , à l'endroit de l'arête x , $144^{\circ} 20' 16''$; de r sur r' , $133^{\circ} 16'$; angles plans de l'axe quel-

(1) Voyez ci-après les propriétés géométriques.

angles r des faces du dodécèdre, mesura^t 32° $15'$; imbr^t 17° $30''$; embr^t 9° $17''$.

Prop. géométriques. L'angle obtus n de l'axe quelconque des faces du dodécèdre est égal à celui du rhombe primitif.

L'incidence de deux faces voisines, à l'endroit d'une des plus courtes arêtes n , est égale à celle des faces du noyau prises vers un même sommet. Ces deux propriétés produisent une espèce de métastase ou de transport des angles du noyau sur le cristal secondaire, ce qui a donné naissance au mot *métastatique*.

La partie de l'axe du cristal secondaire qui excède de part et d'autre l'axe du noyau, est égale à ce dernier axe, ce, ce qui revient au même, l'axe du dodécèdre est triple de l'axe du noyau.

La surface du cristal secondaire est double de celle du noyau, et la solidité de toute la partie de cristal secondaire qui enveloppe le noyau, est pareillement double de la sienne.

Se trouve dans les mines du Derbyshire, et dans beaucoup d'autres endroits. Il y a des dodécèdres qui ont jusqu'à trente-deux centimètres, ou un pied et davantage de longueur. Les géodes calcaires sont aussi souvent tapissées de cristaux de cette variété qui, dans ce cas, ne montrent qu'une de leurs pyramides.

J'ai vu des cristaux métastatiques bipédales, dont la double réfraction, augmentée par l'inclinaison

mutuelle des fibres, faisoit croître à son tour, dans un très-grand rapport, la distance entre les deux images d'un même objet.

Sous-var. a. Chaux carbonatée métastatique transposée.

Pour avoir une idée de cette transposition, supposons que le dodécèdre soit coupé en deux moitiés par un plan perpendiculaire à l'axe. Ce plan sera un dodécagone, qui passera par les milieux des arêtes latérales, telles que *de*, et par des points pris sur les arêtes longitudinales les mêmes saillantes. Concevons de plus, que l'une des deux moitiés, par exemple, la moitié supérieure ayant conservé sa position, l'inférieure ait tourné de gauche à droite, d'une quantité égale à un sixième de circonférence (1), en restant toujours appliquée à la première. Dans ce cas, les petits triangles interceptés par le plan coupant, et dont les plus longs côtés seront les moitiés des arêtes *de*, s'assembleront de manière à former six angles, alternativement rentrants et saillants, composés chacun de quatre de ces triangles. On conçoit aisément que le plan de jonction a la même position qu'une face qui naîtroit du décroissement *A* (Fig. 1). Ainsi, cette espèce de transposition est liée aux

(1) On aura le même résultat, si, supposant qu'elle ait décrit une demi-circonférence. Mais l'autre manière de concevoir le fait est plus simple.

lois de structure, comme les autres accidens de ce genre. Mais il faudroit pouvoir remonter plus haut, pour éclaircir entièrement ces sortes de mystères de la cristallisation.

5. Chert carbonaté contracté $\frac{2}{m}$ (Fig. 5).

En rhomboïde plus aigu que celui de l'événement, et qui présente une espèce de contraste avec l'équise. Incidence de rs' sur rs , $65^{\circ} 42' 4''$; de rs sur rs' , $11^{\circ} 18' 56''$; angles plans, $45^{\circ} 34' 32''$, et $134^{\circ} 25' 28''$; angles de la coupe principale, $40^{\circ} 30' 4''$, et $139^{\circ} 23' 52''$.

Prop. générale. La diagonale horizontale est les $\frac{1}{2}$ de celle du noyau, et l'arête est les $\frac{1}{2}$ de celle du même noyau.

Les angles plans des rhomboïdes sont égaux aux incidences réelles des faces de l'équise, et réciproquement, les incidences réelles des faces sont égales aux angles plans de l'équise. Les angles de la coupe principale sont les mêmes de part et d'autre.

Les quatre rhomboïdes décrits jusqu'ici, pris dans l'ordre suivant, l'équise, le primitif, l'événement et le contracté, forment quatre termes, parmi lesquels les moyens et les extrêmes ont leurs angles plans et leurs angles saillans inversés les uns des autres; et cette inversion, considérée dans le plus obtus et le plus aigu des quatre,

offre en même temps une espèce de contraste, d'où est né le nom du dernier.

Le Cit. Fleuriau a trouvé des cristaux de cette variété dans le pays d'Aunis, à une lieue de la Rochelle.

6. Chaux carbonatée *rigata*. $\frac{1}{2}$ (Fig. 6). En rhomboïde encore plus aigu que le précédent, produit par trois rangées en largeur et deux en hauteur. Incidence de r sur r , $63^{\circ} 44' 55''$; de r sur r' , $116^{\circ} 15' 3''$; angles plans, $27^{\circ} 31' 4''$, et $142^{\circ} 28' 56''$.

Se trouve au Daubigny.

7. Chaux carbonatée *cubique*. $\frac{1}{2}$ (Fig. 7). En rhomboïde aigu, presque cubique. Spécul. calcare cubique. *Journ. de Phys.*, octobre 1790, p. 309. Incidence de A sur A , $87^{\circ} 47' 45''$; de A sur A' , $92^{\circ} 12' 15''$; angles plans, $87^{\circ} 42' 50''$, et $92^{\circ} 17' 50''$.

Observée par le Cit. Dodan, près de Castelnodary. Les cristaux ont depuis deux jusqu'à neuf millimètres d'épaisseur : ils avoient d'abord été pris pour des cubes. La détermination de leur véritable forme, ainsi que celle de la loi de décroissement dont elle dépend, est due à M. Marie, de la société royale de Londres.

Combinaisons deux à deux.

8. Chaux carbonatée simple. $\frac{PA}{P_0}$ (fig. 8) (Q).

La forme primitive dont les deux sommets sont interceptés par deux faces triangulaires, qui servent comme de bases au cristal. Incidence de α sur P , 153° .

Le Ch. Gillet a cette variété dans sa collection.

9. Chaux carbonatée simple. $\frac{PE}{P} \frac{E}{f}$ (fig. 9).

Le rhomboïde inverse élargi vers ses deux sommets, de Lisle, *l. I*, p. 505; var. 13. Incidence de f sur P , $103^\circ 13' 18''$.

Se trouve à Gisors, près de Lyon.

10. Chaux carbonatée simple. $\frac{DP}{uP}$ (fig. 10).

pl. XXXV. De Lisle, *l. I*, p. 505; var. 1. Incidence de u sur u , 120° ; de P sur u , $137^\circ 45' 40''$.

Cette variété est rare.

11. Chaux carbonatée simple. $\frac{PD}{P} \frac{D}{f}$ (fig. 11).

La variété métastatique dont chaque sommet est

(1) Ces figures sont en perspective droite, les deux faces incidentes qui proviennent de débordement à se trouvent représentées par de simples lignes.

intercepté par trois faces rhombes parallèles à celles du noyau. Incidence de r sur P , $151^{\circ} 2' 40''$.

Se trouve dans le ci-devant Dauphiné, en cristaux blancs, ou d'un rouge faible, quelquefois colorés en vert par un mélange de talc chlorite, ayant jusqu'à un décimètre ou environ 44 lignes et au-delà d'épaisseur.

Lorsque les facettes r , r' sont très-étroites, le cristal semble n'être autre chose que la forme primitive légèrement blanchie de part et d'autre, aux endroits de ses arêtes latérales.

12. Chaux carbonatée *irréguale*. $\frac{rP}{cP}$ (fig. 18).

La forme primitive primée dans le sens de ses angles solides latéraux.

Incidence de P sur c , 133° .

Les cristaux que j'ai observés de cette variété, dont j'ignore le lieu natal, étoient blanchâtres, et avoient environ six millimètres ou près de trois lignes d'épaisseur.

13. Chaux carbonatée *rhomboédrale*. $\frac{\frac{1}{2}P}{\frac{1}{2}P}$ (fig.

19). Composée de deux rhomboèdres, le primitif et le misé.

Se trouve en Derbyshire, en cristaux jaunâtres.

J'en ai observé un cristal qui étoit solitaire, et avoit quatre centimètres ou environ 16 lignes de longueur. Les facettes P sont souvent très-petites.

14. Chaux carbonatée prismatique, $\frac{2\Delta}{c2}$ (Fig. 14).

En prisme hexaédre régulier, de Lisle, t. I, p. 514; var. 10.

a. Alternants. Trois pans larges et les intermédiaires étroits.

b. Comprimés. Deux pans opposés plus larges que les quatre autres.

c. Évasés. Quatre pans plus larges que les deux autres.

d. Lamelliformes. En prisme très-court.

Dans certains cristaux, les extrémités sont d'un blanc mat, tandis que la partie intermédiaire est transparente. Dans d'autres, la partie opaque est située vers l'axe, et revêtue d'une enveloppe transparente. Les bases de quelques-uns présentent des hexagones concentriques, et l'on observe même vers leur milieu, l'extrémité d'un petit prisme intérieur, saillant au-dessus du prisme total. Tous ces accidens dépendent de l'accroissement, et n'altèrent point le mécanisme de la structure, en sorte que les joints naturels traversent les parties opaques et celles qui sont transparentes, en restant sur le même plan.

Se trouve dans les mines du Harz, de Marienberg en Saxe, et de Joachimsthal en Bohême. Les prismes ont jusqu'à 27 millimètres ou environ un pouce d'épaisseur et au-delà.

15. Chaux carbonatée apophane. $\frac{\overset{1}{a} \overset{1}{b}}{\overset{1}{a} \overset{1}{c}}$ (fig. 15).

Les facettes a déterminent ou manifestent la position de l'axe, qui sans cela serait difficile à saisir, à cause de la forme presque cubique du rhomboïde. Incidences de a sur c , $103^{\circ} 41' 35''$.

Les cristaux que j'ai vus de cette variété, dont j'ignore le lieu natal, étoient légèrement jaunâtres, et avoient entre cinq et dix millimètres d'épaisseur.

16. Chaux carbonatée uniaxiale. $\frac{\overset{2}{a} \overset{2}{b}}{m \overset{2}{c}}$ (fig. 16).

La variété contrastante basée. Incidences de c sur m , $104^{\circ} 58' 40''$.

Propriétés géométriques. L'incidence de c sur m est égale à la plus grande inclinaison des faces du rhomboïde primitif, et en même temps à l'angle plan obtus de l'inverse. Nous avons vu d'ailleurs que le rhomboïde $\overset{2}{c}$, dont cette variété offre une modification, doit à son tour l'inverse de l'épaisseur. Ainsi, cette variété participe des angles de quatre rhomboïdes différens.

17. Chaux carbonatée blanchâtre. $\frac{Bb}{\overset{3}{a} \overset{3}{c}}$ (fig. 17).

La variété épaisse primitive. Incidences de a sur c , $112^{\circ} 47' 31''$.

18. Chaux carbonatée dodécaédrique. $\frac{\overset{4}{a} \overset{4}{b}}{c \overset{4}{g}}$ (fig. 18).

De Lisle, t. I, p. 507, var. 3; et p. 509, var. 4. Dodécaèdre à plans pentagones égaux et semblables, six à six, les uns verticaux, les autres inclinés. Incidence de g sur e , $116^{\circ} 53' 54''$.

a. *Muscovite* (*fig.* 19). Les pans du prisme sont des triangles isocèles, qui tantôt se touchent par leurs angles latéraux, auquel cas les faces terminales sont toujours des pentagones, et tantôt ne parviennent pas à se toucher, auquel cas les faces du sommet sont des épingones. *Spalh calcaire* en tête de clou, de plusieurs minéralogistes.

Cette variété est une des plus communes. Ses sommets sont souvent sillonnés par des stries parallèles à la hauteur des pentagones, et qui indiquent très-évidemment la marche du décroissement sur les bords supérieurs du noyau. J'en ai vu un cristal qui a deux centimètres ou environ 5 lignes d'épaisseur, sur trois centimètres ou trois lignes de longueur.

19. Chaux carbonatée contractée. $\frac{c}{d}$ (*fig.* 20).

Dodécaèdre à faces pentagonales, dans lequel les bases des pentagones terminaux éprouvent une sorte de contraction, en conséquence de ce que les pans s'inclinent d'une petite quantité, en se rejetant vers les arêtes a contiguës au sommet. Incidence de l'arête x sur le pan i , $106^{\circ} 20' 5''$.

La loi qui produit les faces latérales de cette

variété, n'est qu'une légère déviation de celle d'où dépend le prisme hexaèdre droit. Cette dernière a lieu par des décroissemens de deux rangées en largeur et d'une en hauteur, dont l'expression est $\frac{1}{2}$. Or, d'après la petite inclination des pans de la variété qui nous occupe ici, j'ai cherché paroi toutes les lois mixtes, celle dont le résultat conduisoit à des angles sensiblement égaux à ceux de cette variété, et je suis parvenu au rapport $\frac{1}{2}$, un peu plus fort que $\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{3}$, d'où l'on voit qu'il suffit dans le cas présent, comme dans une multitude d'autres relatifs aux lois mixtes, de faire varier d'une unité l'un des deux termes du rapport, pour que le résultat rentre dans ceux qui sont donnés par les lois les plus simples. Au reste, la cristallisation, en passant, pour ainsi dire, à côté d'un résultat beaucoup plus simple, n'affecte pas la même uniformité que dans les cas ordinaires. Souvent les six pans commencent par être tous verticaux, en partant du support; et dans la plupart des cristaux, il n'y en a que trois qui subissent une inflexion vers le haut, tandis que les trois intermédiaires conservent la position verticale. L'incidence de ceux-ci sur les faces terminales adjacentes est alors de $116^{\circ} 33', 54''$, comme dans la variété précédente. Si, au contraire, on suppose que ces pans s'inclinent en sens inverse des trois autres, et de la même quantité, l'incidence sera de $112^{\circ} 9' 52''$, et la forme du cristal

crystal se trouvera soumise à la distorsion qui résulteroit de l'effet complet de la loi exprimée par le rapport $\frac{1}{2}$.

20. Chaux carbonatée dilaté. $\frac{1}{2} \frac{B}{g}$ (Fig. 21).

Dodécédrique pentagonal, dans lequel les bases des pentagones terminaux éprouvent une espèce de dilatation, en conséquence de ce que les pentagones latéraux s'inclinent d'une petite quantité en se rejetant vers les bases x , x des poissiers, de *Léale*, *t. I*, p. 510, pl. *II*, fig. 10. Incidence de g sur k , $120^{\circ} 59' 5''$; de k sur k , $119^{\circ} 29' 50''$.

Cette variété offre une nouvelle déviation de la loi qui produit le prisme droit, laquelle a lieu en sens contraire de celle d'où dépend la variété précédente, en sorte que les pans qui, dans cette dernière, dépassaient un peu la verticale, en se rejetant vers les arêtes x , restent ici un peu en deçà, comme si la cristallisation oscilloit légèrement autour d'un résultat moyen, qui est celui où les pans sont exactement verticaux. Les cristaux de chaux carbonatée dilaté que j'ai observés, n'ont pas en général d'une forme plus symétrique que ceux de la contractée, et leurs pans étoient alternativement inclinés en sens opposés, sous des degrés sensiblement égaux.

Se trouve dans les gîtes d'Oberstein et du duché des Deux-Ponts.

21. Chaux carbonatée acrochordiforme. $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ D'E' (fig. 22) pl. XXX. Dodécédre très-aigu, dont les deux sommets sont interceptés chacun par trois trapézoïdes. Valeur de l'angle α , $28^{\circ} 57' 20''$.

Valeurs des trois angles de chaque face du dodécédre supposé complet. Grand angle α , $107^{\circ} 53' 15''$; angle moyen β , $67^{\circ} 31' 28''$; petit angle ou angle au sommet, $24^{\circ} 57' 17''$. Incidences de y sur x , $134^{\circ} 25' 2''$; de y sur x' , $108^{\circ} 56' 2''$.

22. Chaux carbonatée disséminée. $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ D (fig. 23).

La variété cristalline augmentée de six faces verticales, trapézoïdales, dont les angles aigus α , α sont tournés alternativement vers l'extrémité supérieure, et vers l'inférieure de l'axe, de Lisle, t. I, p. 536, var. 28; et p. 539, var. 24.

a. Distante. Les trapézoïdes e ne parviennent pas à se toucher. Dans ce cas, les faces r , r sont des pentagones.

b. Proxime (fig. 24). Les faces r , r sont toujours trapézoïdales, comme dans la fig. 21; les faces verticales e , e deviennent des hexagones allongés, dont les parties moyennes forment les six pans d'un pénaire.

Propre genre. Si l'on partage chaque trapézoïde latéral e (fig. 21) en deux triangles isocèles, par une diagonale horizontale, l'un de ces trian-

gles est équilateral, et a sa hauteur double de celle de l'autre triangle. L'angle α étant de 60° , d'après ce qui vient d'être dit, l'angle β est de $98^\circ 12' 45''$, et chacun des angles latéraux est de $100^\circ 53' 57''$.

Se trouve en Derbyshire.

23. Chaux carbonatée biternaire. $\frac{2\text{Ca}}{\text{Mg}}$ (Fig. 23).

La variété constante offrait un double biseau à l'endroit de chaque arête contiguë au sommet.

Se trouve en Angleterre, en Derbyshire; et en France, dans le pays d'Annis, où elle a été observée par le citoyen Flouriau (1).

Combinaisons trois à trois.

24. Chaux carbonatée biternaire. $\frac{2\text{Ca}}{\text{SrP}}$ (Fig. 24).

(1) Ce cristal avait communiqué à Rœss de Lisle, les années 1786, un minéralogiste renommé qui avait bien mérité l'empereur, et on s'est élevé, avec beaucoup d'autorité, plusieurs célèbres calculateurs du pays d'Annis, dont deux, au moins : le premier dans il s'agit ici, et le progressif qui sera le 38°, doivent reconnaître à cette époque. Il avait trouvé, pour la plus petite incidence des faces de la variété métastatique, $144^\circ 1'$, valeur qui ne diffère que de $20'$ de celle que j'ai déterminée par le calcul théorique, tandis que cette incidence, selon Rœss de Lisle, est seulement de $142^\circ 4'$.

La variété bismine augmentée à chaque sommet de deux rhombes parallèles ceux du noyau, de *Idole*, cristal, *t. I*, p. 545, pl. *IP'*, (fig. 10).
Se trouve au Derbyshire.

25. Chaux carbonatée *trichauloïdale*. $\begin{matrix} e \\ e' \end{matrix} \begin{matrix} P \\ P' \end{matrix}$
(fig. 27). Composée de trois rhombes, savoir : le primitif, le milieu et le continuant. Incidence de *e* sur *P*, $145^{\circ} 3' 11''$.

Trouvée par les citoyens Le Bras, Varin et Cambault le jeune, en visitant la grotte d'Anville, dans la ci-devant Franco-Comté.

26. Chaux carbonatée *épidéme*. $\begin{matrix} eBA \\ e'g'e \end{matrix}$ (fig. 28).
Incidence de *g* sur *e*, $155^{\circ} 28' 4''$.

La var. *dolémitides* dont les cristaux sont incisés chacun par une flèche triangulaire équilatérale horizontale.

27. Chaux carbonatée *peristiane*. $\begin{matrix} eE \\ e'f'e \end{matrix} \begin{matrix} BA \\ o \end{matrix}$ (fig. 29), c'est-à-dire, dont les angles *peristiane*. Incidence de *f* sur *e*, $155^{\circ} 26' 4''$; de *f* sur *e*, $116^{\circ} 33' 54''$. Angles plans du triangle *f*, $a=104^{\circ} 28' 40''$; $b=75^{\circ} 31' 30''$.

Prop. géom. Les angles *a* et *b* de l'hexagone *f* sont égaux aux angles obus du rhombe de la variété inverse, auquel correspond cet hexagone; et

si l'on suppose une diagonale menée par les angles i, i , l'hexagone se trouvera partagé en deux triangles, dans chacun desquels les angles adjacents à cette diagonale seront égaux aux angles aigus du rhomboïde de la même variété inverse. Il en résulte que les angles de celle-ci paraissent, malgré les courbures planes qui existent en fait.

L'incidence de f sur a est la même que celle de g sur a (fig. 16), dans la chaux carbonatée dodécédre.

Les triangles $a'ia''$ qui terminent les pentagones verticaux, sont équilatéraux, ainsi que les triangles horizontaux a .

mes. a, a_1 sur ia_1 $30^\circ 15'$; i, i_1 $120^\circ 30'$; a_1, a_1 $90^\circ 30'$; a_1, ia_1 $120^\circ 30'$. Chaux carbonatée hexaédrique. a, a_1, E sur a_1 a_1 $30^\circ 15'$; a, a_1 $120^\circ 30'$; a_1, a_1 $90^\circ 30'$; a_1, ia_1 $120^\circ 30'$ (fig. 16) ; a, ia_1 $120^\circ 30'$; a_1, ia_1 $120^\circ 30'$, parce qu'elle est composée d'un premier rhomboïde aigu, qui est inverse, sur E , et d'un second qui résulteroit du prolongement des faces E, E_1 et qui seroit si aigu, que son angle plus ou moins seroit pour mesure seulement $14^\circ 4' 10''$. De l'ide, a, ia_1 $54^\circ 51'$; sur a_1 $120^\circ 30'$; de E sur a_1 $94^\circ 5' 9''$; de E' sur a_1 $85^\circ 54' 51''$; de f sur a_1 $157^\circ 34' 14''$, et sur a_1 $106^\circ 55' 55''$ (1).

Chaux carbonatée hexaédrique.

(1) De l'ide suppose que les triangles f appartiennent à la chaux carbonatée dodécédre, et qu'on seroit 180° à peu près pour l'incidence de f sur a_1 , au lieu de 157° ;

Se trouve au Hartz. On en voit un très-beau groupe dans la collection du Muséum d'histoire naturelle.

29. Chaux carbonatée orthorhombale. $\begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix}$ $\begin{matrix} A' \\ B' \\ C' \\ D' \end{matrix}$
 $\begin{matrix} E \\ F \\ G \\ H \end{matrix}$ $\begin{matrix} E' \\ F' \\ G' \\ H' \end{matrix}$

(Fig. 31.) La variété prismatique, augmentée de deux faces obliques, disposées six à six autour de chaque base, incidences de y sur y , $134^{\circ} 15' 2''$; de y sur y' , $105^{\circ} 56' 2''$.

30. Chaux carbonatée acutaigüe. $\begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix}$ $\begin{matrix} A' \\ B' \\ C' \\ D' \end{matrix}$
 $\begin{matrix} E \\ F \\ G \\ H \end{matrix}$ $\begin{matrix} E' \\ F' \\ G' \\ H' \end{matrix}$

(Fig. 32.) $pe, XX'Z$. La variété prismatique, dont tous les angles solides sont interceptés par des faces triangulaires. Incidences de z sur z , $100^{\circ} 53' 57''$; de z sur z' , $121^{\circ} 11' 18''$. Valeur de l'angle au sommet du triangle pe , $56^{\circ} 14' 56''$.

J'ai un groupe de cristaux de cette variété idogène, qui m'a été donné par le cit. Dré. Ils sont blanchâtres, lamelleux, et ont environ 8 millimètres du 5 figure 1 d'épaisseur.

Si les triangles z, z', z'', z''' , etc., se prolongeient jusqu'à faire disparaître les pans et les bases du prisme, il en résulteroit un dodécaèdre composé de deux pyramides droites très-allongées, dans

que j'ai montré par des modèles pris sur les cristaux de cristaux que cela se voyoit.

lequel l'angle, en sommet de chaque triangle, ne seroit que de $12^{\circ} 27' 12''$ (1).

31. Chaux carbonatée péridoticaire. $\frac{c}{a} \frac{D}{u} \frac{A}{s}$

(1) Si l'on désigne, en général, par x le nombre d'atomes de molécules constituant le long de A (fig. 1), et par y celui de molécules constituant le long de B , la table suivante indique les différents nombres n de rangées qui peuvent exister dans pour un rapport déterminé entre x et y ; et y en sera toujours un qui produira un dodécaèdre tétragonal. Ce nombre est donné par la formule ou $\frac{n+x}{xy}$.

Or, dans le cas présent, $\frac{x}{y} = \frac{1}{2}$, d'où il suit que $n = 1$.

Ce résultat ne peut être vérifié, avec une précision suffisante, par la mesure de l'incidence de d sur P , qui varie beaucoup, à mesure que l'on fait varier n elle-même, lorsque x et y diffèrent entre eux, comme ici, de plusieurs unités. Mais l'incidence de d sur a varie plus sensiblement, et les angles des triangles d ont une variation encore plus marquée. Ainsi, dans l'hypothèse de $\frac{x}{y} = \frac{1}{2}$, on trouve, pour l'incidence de d sur P , $101^{\circ} 27' 12''$, lequel angle est seulement plus fort de $12^{\circ} 12''$, que celui qui répond au rapport $\frac{1}{2}$. Mais on a pour l'incidence de d sur a , $100^{\circ} 12' 59''$, quantité qui diffère de $1^{\circ} 17' 22''$, de celle qui dépend du rapport $\frac{1}{2}$; et l'on a pour l'angle aigu du triangle P , $98^{\circ} 12' 42''$, dont la différence q° et $16''$ avec l'angle obtus plus haut, est encore plus appréciable. Voyez, pour la démonstration de la formule, la partie géométrique, t. II, à l'angle des décroissemens successifs.

(fig. 33). Prisme à deux pans, de Liéle, à I , p. 515, pl. IP , fig. 79 et 80. Incidence de u sur e , 1264.

32. Chaux carbonatée analogique. $\frac{2DB}{crg}$ (fig. 34).

Se trouve en crinoides en analogie, de Liéle, à I , p. 548, var. 26. Pl. IP , fig. 36.

a. Prisme. Les pans c sont des hexagones obliques comme dans la fig. 33.

b. Distante. Les pans c adhèrent sur les faces g . Leur arête de jonction avec elles laisse un intervalle entre les faces r , r , qui ne sont plus liées entre elles qu'aux extrémités des arêtes x , x .

c. Prisme et distante. C'est la modification qui présente le plus généralement cette variété.

Voyez, dans les généralités sur la cristallisation, (t. I, p. 84) l'exposé des analogies qui rendent cette variété remarquable.

Se trouve au Debschitz. J'en ai un cristal diaphane de 5 centimètres, ou environ au tiers de longueur, sur 15 millimètres, ou environ 6 lignes $\frac{1}{2}$ d'épaisseur.

33. Chaux carbonatée rétrograde. $\frac{2DB}{2rg}$ (fig. 35).

Les faces produites par les deux décroissements fractionnaires semblent rétrogrades, en se rejetant en arrière, du côté de l'axe opposé à celui qui regarde la face sur laquelle passent ces décroisse-

mesure l'incidence de l sur k , l'angl $44^{\circ} 45''$; de l sur g , l'angl $74^{\circ} 34' 15''$. — *Formes et dimensions.*

Se trouve dans les mêmes lieux que la chaux carbonatée diluée, dont elle n'est qu'une modification.

34. Chaux carbonatée hémisphaïque. $\frac{CaCO_3}{2}$ (fig. 33).

37). La variété hémisphaïque dont chaque sommet est remplacé par six facettes e , qui ont cette propriété, que leurs intersections avec les faces c se trouvent sur un même plan perpendiculaire à l'axe. Incidence de l sur e , l'angl $11^{\circ} 34'$; de l sur c , l'angl $34^{\circ} 47'$. De l'angle compris entre e et l sur la face verticale c' , correspondante, l'angl $81^{\circ} 17'$; de l'angle compris entre l et e sur la face verticale c , l'angl $33^{\circ} 34'$.

J'ai plusieurs cristaux disséminés de cette variété qui sont d'un petit volume, mais d'une forme très-prolongée.

35. Chaux carbonatée sphérique. $\frac{CaCO_3}{2}$ (fig. 35).

La variété hémisphaïque dont chaque sommet est remplacé par six facettes, qui forment de très-légères saillies aux extrémités des axes a , a. Incidence de g sur q , l'angl $33^{\circ} 14'$; de g sur la face q de retour, l'angl $5^{\circ} 23'$.

Le C^{te} Gillet a dans sa collection un très-beau groupe de cristaux appartenant à cette variété.

36. Chaux carbonatée azoïque. $\begin{matrix} E \\ f \end{matrix} \begin{matrix} E \\ f \end{matrix} \begin{matrix} D \\ f \end{matrix} \begin{matrix} D \\ f \end{matrix} \begin{matrix} D \\ f \end{matrix} \begin{matrix} D \\ f \end{matrix}$ (fig. 39).

37. Les sections e, y juxtaposées au rebord de l'azote, forment une espèce de zone autour de ses bords inférieurs. Incidence de e sur f , $140^{\circ} 46' 6''$; de y sur y , $154^{\circ} 16' 30''$; de y sur e , $165^{\circ} 31' 20''$.

J'ai des cristaux de cette variété qui ont environ 5 centimètres, de 15 lignes $\frac{1}{2}$ d'épaisseur.

38. Chaux carbonatée, épaissie. $\begin{matrix} E \\ f \end{matrix} \begin{matrix} E \\ f \end{matrix} \begin{matrix} D \\ f \end{matrix} \begin{matrix} D \\ f \end{matrix} \begin{matrix} D \\ f \end{matrix} \begin{matrix} D \\ f \end{matrix}$ (fig. 40).

39. La variété binaire, dans laquelle les angles aigus des trapézoïdes binaires et en même temps les bords les plus saillants, sont toujours émaillés par l'interposition des sections f, f , de D, D , e, e , p, p , 537, var. 15. Incidence de f sur e , $144^{\circ} 14' 20''$.

Se trouve au Drébidel.

40. Chaux carbonatée progressive. $\begin{matrix} E \\ f \end{matrix} \begin{matrix} E \\ f \end{matrix} \begin{matrix} D \\ f \end{matrix} \begin{matrix} D \\ f \end{matrix} \begin{matrix} D \\ f \end{matrix} \begin{matrix} D \\ f \end{matrix}$ (fig. 41).

42. p, p, X, X, P, P . La variété binaire (fig. 42), dans laquelle les arêtes qui séparent les sections e sont interrompues chacune par une nouvelle section.

Cette variété a été trouvée par le Cit. Bléchin, dans le pays d'Artois, près de la Bouchelle.

43. Chaux carbonatée paradoxale. $\begin{pmatrix} E & E & D \\ x \end{pmatrix}$

$\begin{matrix} D \\ f \end{matrix} \begin{matrix} E \\ f \end{matrix} \begin{matrix} E \\ f \end{matrix}$ (fig. 43). Offrait une espèce de paradoxes

que celui seroit encastré dans un cristal. *Journal des Mines*, n°. 14, p. 11 et suiv. Incidence de x sur x' à l'endroit de l'arête g , $153^{\circ} 13' 58''$; de x sur x , pour le pari et d'autre de l'arête e , $92^{\circ} 5' 10''$; de x sur x , $153^{\circ} 51' 12''$; de x sur f , $162^{\circ} 59' 34''$.

J'ai développé, dans les généralités sur la cristallisation (t. I, p. 79 et suiv.), le résultat de la loi intermédiaire qui donne le dodécèdre à triangles scalènes; après pour lents les plans x, x' etc., prolongés jusqu'à s'entre-croiser de toutes parts, on étoit disparétre les facettes r, r, f, f . J'ai remarqué de plus que si l'on substitue, par la pensée, au véritable moyen le rhomboïde hypothétique auquel conduisent les sections faites sur les arêtes h, h , et qui est semblable au rhomboïde inverse, le dodécèdre peut se former de celui-ci, en vertu d'un décroissement exprimé par $\frac{1}{2}$.

Si nous appliquons le cristal dans son état réel, nous prouverons que la substitution d'un moyen fictif au moyen réel, est en quelque sorte, aidée par l'aspect des facettes f, f , qui appartiennent à l'inverse. Mais d'une autre part, les facettes r, r appartiennent au véritable, et leurs arêtes inférieures l, l sont dans le sens des arêtes latérales du véritable moyen. Le cristal porte donc l'impression de deux moyens, l'un réel, l'autre hypothétique, relatifs aux deux dodécèdres; et quoique la cristallisation n'ait travaillé que sur le premier

rayon, elle se pousse, et s'éloigne en se tendant, à un certain point, plus simple même que celui qui a lieu en effet, puisqu'il dépend d'une des lois les plus universelles, tandis que l'autre suppose une loi intermédiaire; *Journal de Chimie, t. III, p. 540, 541.*

Une nouvelle circonstance, digne d'être remarquée, est que le rayon focal tombe à son tour sur des foyers secondaires, originaires du ray. direct.

Cette vérité intéressante a été trouvée par le Cit. Tonnelle, dans ses expériences de réfract. de l'air, à l'aide de l'éclatisme des doubleurs de Saint-Jehan du Saill, département de l'Yonne. Les rayons ont une épaisseur, un diamètre, qu'on voit à l'œil nu, et se pousse, comme l'on sait, à peu près double. *Journal de Chimie, t. III, p. 540, 541.*

Journal de Chimie, t. III, p. 540, 541.

40. Chaux carbonatée cristalline. *Fig. 40.*

(*Fig. 40*). Le rhomboïde se compose de six faces, dont quatre sont inclinées, et deux sont parallèles. Les faces latérales sont inclinées, et chaque face latérale par deux facettes. Incidence de l'air sur les faces latérales.

Se trouve à Caen, près de Lyon, dans les cristaux de chaux carbonatée cristalline.

Journal de Chimie, t. III, p. 540, 541.

41. Chaux carbonatée cristalline. *Fig. 41.*

Le rhomboïde cristallin, dont chaque angle solide latéral est intercepté par une face, verticale, et chaque sommet, par six facettes très saillantes.

Les trois lois de dédoublement ont une marche ascendante, en partant des angles ou des bords inférieurs du noyau incidant de n sur n , à l'endroit de l'arête a , $161^{\circ} 43' 13''$; de a sur la face de retour, à l'endroit de l'arête g , $101^{\circ} 52' 13''$.

Propr. géom. Chacune des arêtes terminales, situées contre g , est inclinée de 45° sur l'axe.

L'inclinaison de n sur la face de retour, à l'endroit de l'arête g , est égale à l'angle obtus du rhombe primitif.

Si l'on suppose que les plans n , n se prolongent jusqu'à s'entrecroiser, en masquant toutes les autres faces, il en résultera un dodécaèdre, dans lequel le grand angle de chaque triangle sera droit.

J'ai observé différents groupes de cristaux de cette variété, dont les plus gros avaient environ 7 millimètres, ou environ 2 lignes d'épaisseur.

Coordonnées quatre à quatre.

42. Chaux carbonatée rhomboïde $\begin{matrix} cPBA \\ : \\ cPg\alpha \end{matrix}$ (Cg. 45)

Dérivée de trois formes remarquables, savoir : le rhomboïde primitif, l'équiaxe et la variété prismatique.

Le Ch. Gillet a donné dans le *Journal des Mines* (n^o. 54, p. 458), une description de cette variété jusqu'alors inconnue, à laquelle il a joint ses observations sur un accident remarquable qu'elle

présente dans un groupe de cristaux qui faisoit partie de sa collection, et qui lui a paru venir du Harz. Cet accident consiste en ce que plusieurs des cristaux dont il s'agit, offrent différents passages à la forme du prisme hexaédre régulier, en sorte que, d'une part, la matière enroulée en cristal trifurme subit une interruption, qui laisse à découvert une partie plus ou moins considérable de la surface de ce cristal, et que, d'une autre part, elle est plus opaque, comme si elle fut venue après coup s'appliquer, par lames successives et décroissantes, sur les faces parallèles à celles du noyau. « Ordinairement, dit le Cit. Gillet, « la formation masque la structure; on peut dire « que, dans ce groupe, la formation a suivi l'or- « dre de la structure ». Ce naturaliste a bien voulu enrichir ma collection de ce marbre unique, que j'apprécie surtout, en ce qu'il y a été placé par la main de l'artiste.

43. Chaux carbonatée déliée, (c'est-à-dire, qui donne des éclaircissements). $\left(\begin{array}{c} E' E B D' \\ a \end{array} \right)$
 $\frac{DE}{f} \frac{EP}{P}$ (Fig. 46). La variété paradoxale, dans laquelle la présence des facettes P, P , qui appartiennent au véritable noyau, semble éclaircir le paradoxe. Trouvée par le Cit. Champeaux, à quelque distance de l'endroit où l'autre avoit été observée par le Cit. Touzelien.

44. Chaux carbonatée double. $\begin{matrix} E & ED & B \\ f & r & g \end{matrix}$

(fig. 47). La variété progressive, dont chaque sommet est remplacé par trois facettes. Incidence de g sur f , $143^{\circ} 7' 48''$.

45. Chaux carbonatée cursive. $\begin{matrix} D & DB \\ r & r & g \end{matrix}$ (fig. 48)

La variété constructive, dans laquelle les arêtes terminales les plus saillantes sont interceptées par des facettes hexagonales. Ces facettes étoient très-étroites, mais très-nettes, sur les cristaux que j'ai observés. Incidence de g sur r , $158^{\circ} 49' 45''$.

46. Chaux carbonatée légèrulée. $\begin{matrix} D & DDB \\ m & r & P \end{matrix}$ (fig. 49). Combinaison de deux rhomboïdes, savoir :

P et r , et de deux dodécédres D , D . Incidence de r sur r , $166^{\circ} 37' 4''$; de r sur la face de retour, à l'endroit de l'arête x , $101^{\circ} 50' 52''$; de r sur P , $170^{\circ} 26' 29''$; de m sur l'arête x , $163^{\circ} 4' 21''$; de m' sur l'arête x' , $157^{\circ} 23' 54''$.

Se trouve au Derbyshire. Les cristaux que j'ai observés étoient transparents, d'une couleur grise, et entremêlés de pyrite cubreuse.

Combinaison cinq à cinq.

47. Chaux carbonatée circonscrite. $\begin{matrix} D & E & B & B \\ r & f & r & g \end{matrix}$

(Ag 50) pl. XXVIII. Journ. des Mines, n°. 28, p. 504. La variété continue, dans laquelle les arêtes obliques les plus saillantes sont remplacées chacune par une facette.

Se trouve au Derbyshire, en cristaux lamellaires. Parmi ceux que j'ai observés, quelques uns avoient environ 16 millimètres ou 7 lignes d'épaisseur.

Noté. On connaît encore plusieurs variétés de formes cristallines, relatives à cette espèce, dont les unes ont été citées par Romé de Lisle, et les autres existent dans différentes collections. Mais il n'a pas été possible jusqu'ici de les déterminer, surtout à cause de la petitesse de certains faits, dont il seroit nécessaire de mesurer les inclinaisons.

A C C I D E N S D E L U M I È R E.

Cristaux.

1. Chaux carbonatée limpide.
2. Chaux carbonatée incolore. J'ai vu des cristaux qui appartenaient, les uns à la variété cristalline, les autres à la linaire, où cette couleur approchoit de celle du quartz, dit améthyste.
3. Chaux carbonatée rouge.
4. Chaux carbonatée rose pâle. Quelques cristaux de la variété linaire.
5. Chaux carbonatée orangée.
6. Chaux carbonatée jaunâtre. Une partie des cristaux.

cristaux du Derbyshire ; les petits rhomboïdes inverses des environs de Paris.

7. Chaux carbonatée *blanche*.

8. Chaux carbonatée *vert-ombre*. Quelques cristaux du Derbyshire.

9. Chaux carbonatée *blanchâtre*.

10. Chaux carbonatée *gris*.

11. Chaux carbonatée *noir*. J'ai observé cette couleur sur des cristaux de chaux carbonatée dodécédre, d'une forme très-régulière, et qui se divisaient par des coupes très-nettes.

En général, les cristaux de cette espèce ne présentent guère que des nuances de la couleur blanche, et ont rarement des teintes vives. Les fragments que l'on rencontre quelquefois, avec ces teintes peu ordinaires, en imposent souvent à l'œil. Mais la structure ou l'effervescence dans les acides, rend l'observateur sur la voie avec la même facilité.

Transparence.

1. Chaux carbonatée *transparente*.

2. Chaux carbonatée *translucide*.

3. Chaux carbonatée *opaque*.

FORMES INDÉTERMINABLES.

En cristaux irréguliers.

1. Chaux carbonatée *lenticulaire*. Il arrive quelquefois, par l'effet d'une cristallisation gênée, que

Tout II.

L

les arêtes latérales de la chaux carbonatée équiale s'éloignent, de manière qu'il se forme, en cet endroit, une ligne courbe autour du cristal. Aux autres arêtes aussi les autres arêtes s'élèvent, et la surface du cristal prend de la convexité. Le cristal se présente alors à peu près sous la forme d'une lentille, ce qui lui a fait donner le nom de *apath lentillaire*, que l'on a même transporté au rhomboïde équiale, dont la forme n'a subi aucun arrondissement.

2. Chaux carbonatée *apiculaire*. Cette variété présente, en quelque sorte, l'inverse de ce qui arrive à la précédente. Tandis que dans cette dernière la chaux carbonatée équiale est élargie et comme comprimée, l'autre résulte d'une modification du rhomboïde contractant, qui s'aigrit et s'étance plus ou moins. Les cristaux, dont on ne voit, dans ce cas, que le sommet supérieur, sous la forme d'une pyramide triangulaire, composent, par leur groupement, des espèces de bouquets aux extrémités desquels on voit les cristaux ou les conchions calcaires, qui souvent en sont revêtus ou leur servent de base.

a. *filonné*. Les faces de la pyramide trièdre sont creusées en filon ou en gouttière.

3. Chaux carbonatée *tétracèdre*. Cette variété, que le Cit. Lamy a rapportée de ses voyages, offre des pyramides quadrangulaires, dont les faces striées parallèlement aux côtés de la base,

l'aspect des espèces d'estaléites. On voit, par la division mécanique, que chaque pyramide est composée de lames empilées sur une des faces du noyau. Mais on risquerait de se tromper, en essayant de ramener à des lois régulières la structure de ces pyramides, dont la petitesse, jointe aux inégalités de leurs plans, s'oppose aux mesures précises qu'exige l'application de la théorie.

En masses.

4. Chaux carbonatée laminaire. En masses irrégulièrement terminées, mais dont l'intérieur présente des lames continues, quelquefois assez transparentes pour se prêter à l'observation de la double réfraction.

5. Chaux carbonatée fibreuse. En fibres ou aiguilles blanchâtres, ordinairement adhérentes suivant leur longueur, quelquefois libres en tout ou en partie. Il y en a dont les filamens ont un aspect soyeux.

6. Chaux carbonatée lamellaire. Ordinairement blanche; composée de petites masses cristallines, dont l'arrangement irrégulier fait que la surface présente une multitude de facettes diversément inclinées. Susceptible de poli.

Cette variété occupe les fentes de quelques marbres colorés. On peut y rapporter une partie des marbres statuaire de Paros.

7. Chaux carbonatée saccharée, c'est-à-dire ; ayant l'apparence du sucre ordinaire. *Marmor unicolor album*, *Waller*, t. I, p. 133. a. *Marbre blanc*, à grain fin, luisant, de *Born*, t. I, p. 187. *Marbre statuaire*, de *Lille*, t. I, p. 374. *Marbre grec ou indien*, *ibid.*, *ibid.* *Korniger kalkstein*, *Kunze*, t. I, p. 455. La pierre calcaire grasse, *Brochant*, t. I, p. 531. Blanche et composée de grains cristallins, beaucoup plus fins que dans la variété précédente (1). Susceptible de poli. Tel est le marbre statuaire des modernes, que l'on tire de Carrare.

Les marbres créés de différentes couleurs, plus ou moins vives, étant des mélanges de matières calcaires avec une proportion variable et très-variable de substances étrangères, sont renvoyés à l'appendice.

8 Chaux carbonatée compacte. *Gewächs dichter kalkstein*, *Kunze*, t. I, p. 457. La pierre calcaire compacte commune, *Brochant*, t. I, p. 525.

(1) *Reaumur de Lille* dit que la cristallisation confuse de la matière calcaire dans la variété dont il s'agit ici, peut être comparée à celle du sucre en pâte, qui est une cristallisation de sucre candi, ce que le marbre blanc est au quartz calcaire ou cristallin décoloré. Cette comparaison est plus juste que celle qu'on a faite de la même substance avec la sile cristallisé confusément, et qui a suggéré la dénomination de *marbre nébuleux*.

Composée de grains très-serrés et indiscernables à l'œil. Cassure ternie, lisse, tirant un peu sur l'ondulée, quelquefois écailleuse. Susceptible d'un certain degré de poli. Couleur ordinairement blanchâtre ou grise. J'en ai vu qui avoient une teinte de rouge incarnat. Voyez le Journal des Mines, *en* 30, p. 479 et suiv., où les citoyens Brougnart et Gillet ont donné plusieurs détails intéressans sur cette variété.

« Chaux carbonatée compacte dendritique. Marbres de Hesse, de quelques naturalistes.

1. *Dendrites superficielles*. Elle est composée de feuilletés, entre lesquels un fluide, chargé de fer, a pénétré en vertu de la même attraction qui a lieu dans les tubes capillaires, et s'est étendu par veines, en déposant des grains ferrugineux, rangés à la file les uns des autres. Il suffit de détacher les feuilletés pour apercevoir la dendrite qui s'est formée à la surface de jonction (1).

2. *Dendrites profondes*. Elle est pleine de fissures, dans lesquelles un fluide semblable s'est introduit et a laissé de petits dépôts métalliques. Pour que ces dépôts se présentent sous la forme de dendrites, il faut que la pierre soit taillée dans un sens perpendiculaire aux fissures. Dans ce cas, les

(1) Voyez sur cet objet le mémoire du citoyen Dubouton, inséré parmi les actes de l'académie des sciences, pour l'année 1784, p. 687 et suiv.

taillés dont une face est marquée , se rapprochent à peu près dans le même ordre sur la face opposée (1).

9. Chaux carbonatée granulaire. Pierre à chaux commune, de Bern, *t. I*, p. 284. Variété du gémmeier schlier kalkstein, *Kraussling*, *t. I*, p. 437. Compact fine stone, var. B, *Kirwan*, *t. I*, p. 82. Pierres calcaires, *Dauvenot*, *tabl.*, p. 21. Pierres à bâtir, des Parisiens. Blanches ou grises. Cassure terne et terreuse. Non susceptible de poli.

1. A gros grain. Exemple, la pierre d'Arcueil.

2. A grain fin. Exemple, la pierre de Tournay.

Nota. Le nom de pierre de laie ne désigne point une localité, mais une certaine nature de pierre, qui est en général plaine, fine, et facile à tailler. On la tire des carrières voisines du faubourg Saint-Jacques, d'une montagne près de Saint-Leu-sur-Foix, des plaines de Cretail, près de Paris, etc.

10. Chaux carbonatée argyreuse. Craie columbina solide, *Waller*, *t. I*, p. 27. Craie compacte, de Bern, *t. I*, p. 281. Kreide, *Kraussling*, *t. I*, p. 433. Chalk, *Kirwan*, *t. I*, p. 77. Terre calcaire com-

(1) Il y a des marbres dans qui présentent aussi des dendrites. Mais parmi les substances susceptibles de cet accident, on en trouve dont les fragments se dissolvent avec effervescence dans l'acide nitrique, sans laisser de résidu sensible.

pocte, creie, *Dand.*, *tabl.*, p. 21. La creie, *Brochant*, *t. I*, p. 521. D'une belle couleur blanche, lorsqu'elle est pure. Cassure fibreuse. Moins pesante que la chaux carbonatée grossière; friable, laissant des traces de son passage sur les corps durs; happant à la langue.

11. Chaux carbonatée spongieuse. Creie siliaceuse, spongiens, molle; *aguricus mineral*, *F'atler*, *t. I*, p. 30. Creie spongieuse, molle de pierre, de *Born*, *t. I*, p. 281. *Berguick*, *Erwerling*, *t. I*, p. 450. Molle de pierre; terre calcaire spongieuse, *Dandeman*, *tabl.*, p. 21. *Aguric mineral*, *Kirwan*, *t. I*, p. 76. Le lait de montagne ou l'aguric mineral, *Brochant*, *t. I*, p. 529. *Aguric mineral* des anciens naturalistes. Blanche, à grains très-fins; douce au toucher; très-friable; spongieuse; très-légère, suffit entendre un petit frémissement lorsqu'on la plonge dans l'eau, et s'écroulant un moment, avant de tomber au fond.

12. Chaux carbonatée pulvérisée. Creie siliaceuse. *Facies fine*, de *Born*, *t. I*, p. 281. Variété du *berguick*, *Erwerling*, *t. I*, p. 450. Terre calcaire en poudre; *facies fine*, *Dandeman*, *tabl.*, p. 21. On lui a donné ainsi le dénomination de lait de Jure, qu'il conviendrait plutôt d'appliquer, ainsi que l'ont fait quelques-uns, à la même substance délayée dans les eaux, si de pareils noms ne choquaient point par eux-mêmes toutes les conventions.

F O R M E S I M I T A T I V E S.

Chaux carbonatée concrétionnée. Stalactites calcarees, etc., *Waller*, t. I, p. 387 et 388, n^{os} 8 et 9. Spalh calcare en stalactites et stalagmites, de *Lisle*, t. I, p. 554. Stalactite, de *Bern*, t. I, p. 298. Stalactites et stalagmites, *Striagr.*, t. I, p. 180. Kalksinter, *Werner*, catal., t. I, p. 528. Fungus kalkstein, *Koenig*, t. I, p. 469. Striated or fibrous lime stone; stalactite, alabaster, sinter, *Kirwan*, t. I, p. 55. Concretions per stalactites, *Danderson*, tabl., p. 22. La pierre calcaire fibreuse, ou la stalactite calcaire, *Brochant*, t. I, p. 549.

a. *Fistulaire*. Conique ou cylindrique, ayant un canal intérieur à l'endroit de son axe, mais qui est sujet à s'obstruer pendant l'accroissement de la concrétion. Celle-ci présente alors, au même endroit, une espèce de paroi médullaire. On trouve des concrétions fistulaires en longs cylindres, qui ont quelque ressemblance avec un tuyau de plume. J'en ai vu qui se terminoient inférieurement en rhomboïde inversé. D'autres sont formées d'un cylindre garni, vers le bas, d'une espèce de rondelle, au-dessus de laquelle la concrétion se termine en sphéroïde tout hérissé de pointes cristallines, ainsi que la rondelle elle-même. Dans ce cas, ainsi que dans celui où la concrétion finit en rhomboïde, sa partie inférieure plongerai dans

une eau stagnante , qui s'élevoit , dans la cavité , jusqu'à une certaine hauteur , et qui a formé les aspérités du cylindre.

Cette variété , considérée par rapport à sa structure , est , suivant les circonstances ; ou lamellaire : les cylindres en traya de plume le sont quelquefois au point que l'on peut y faire des sections parallèles aux faces d'un rhomboïde semblable au prismal , dont l'axe se confondroit avec celui du cylindre ; ou lamellaire , c'est-à-dire , composée de lames entrecroisées ; ou fibreuse , c'est-à-dire , formée de couches striées du centre à la circonférence , ce qui est le cas le plus ordinaire ; ou enfin , compacte , à grain fin , avec une cassure terne , souvent écailleuse.

3. *Stratiforme*. Composée de couches qui s'étendent , en formant ordinairement des ondulations plus ou moins sensibles. Elle est aussi , tantôt lamellaire , tantôt fibreuse , et tantôt à grain fin et serré , et à cassure presque terne , avec des couleurs blanchâtre , gris , jaune de miel , disposées par bandes ou par taches. La couleur jaune de miel provient d'un mélange de matière ferrugineuse , et c'est à elle que certaines concrétions doivent la finesse de leur grain et le peu d'éclat de leur cassure.

4. *Tuberculeuse*. Formant des espèces de tubercules plats , lamellaires ou composés de couches concentriques.

Lorsque les masses qui appartiennent aux variétés précédentes ont pris un accroissement considérable, les morceaux que l'on en détache sont employés, par les artistes, sous le nom d'*albâtre calcaire*. *Voyez les annotations.*

d. *Coralloïde*. *Stalagmites coralloïdes*, *FPaller*, t. II, p. 348. *Stalactite ramusee*, très-blanche, etc., fleur de fer, de *Born*, t. I, p. 308. *Spath calcaire ramusee*, *Des Feui*, *Dandevon*, *ibid.*, p. 22.

Elle est blanche et ferme, tantôt des cylindres plus ou moins allongés, terminés en pointe, divergens entre eux, et dont quelques-uns sont fleur-ciel, tantôt des espèces de ramoux contournés en différens sens, et qui s'entrecroisent. La surface est, ou lisse, ou hérissée de très-petites saillies qui la font chatoyer et lui donnent un aspect soyeux, ou couverte de pointes cristallines très-saillies, hémisphériques et inclinées à l'axe. L'intérieur est marqué de stries légères et parallèlement inclinées. J'y ai observé, à l'endroit de l'axe, une espèce de canal très-étroit.

Cette variété se trouve dans les cavités qui interrompent les filons de la chaux carbonatée ferrifère (vulgairement *fer spathique*), ce qui lui a fait donner le nom de *fer ferré*.

e. *Géodique*. *Ustens cristallins (calcaires)*, *FPaller*, t. II, p. 618. *Géode calcaire*, de *Lisle*, t. I, p. 365.

Ces géodes sont souvent tapissées, à l'intérieur,

de cristaux métastatiques, tellement engagés les uns dans les autres, qu'on ne voit qu'une partie de leur pyramide supérieure. On en trouve aussi qui sont occupés par des cristaux dodécédres, à plans pentagones, et d'autres dont la cavité est toute bouchée d'aiguilles très-déliées.

f. Globulifères. Stalactites calcarees, globulæ, etc., *colifera*, *Waller*, t. II, p. 383. Stalactites globuleuses, etc., *pisolites*, de *Born*, t. I, p. 303. Concrétions globuleuses ovoïdes, plus ou moins arrondies, de *Lécl*, t. I, p. 564. *Roognen*, *Enverling*, t. I, p. 442. *Rebenstein*, *ibid.*, p. 475. Concrétion calcaree par sédimens arrondis, *Dandenton*, *ibid.*, p. 22. *Oviformes* *lune stone*, *Kirwan*, t. I, p. 91. L'oolite, *Bruchant*, t. I, p. 329. La pierre de pois ou la pisolite, *ibid.*, p. 335.

Cette variété est en masses arrondies, d'un diamètre, plus ou moins considérable, et quelquefois très-petit, tantôt solitaires ou simplement engagées dans la pierre qui leur sert de gangue, tantôt adhérentes les uns aux autres, en forme de grappe. En les brisant, on aperçoit quelquefois un noyau d'une substance étrangère, autour duquel la matière calcaree est disposée par enveloppes concentriques.

Nous réunissons ici, sous un même nom, les corps que les naturalistes ont appelés oolites, pisolites, roognen, rognons, oolites, arénites, etc., en les comparant à des œufs, des pois, des grânes

de porot, d'arobe, des grains de sable, etc., ou boursat minéral, dragées de Tiroli, etc. ; toutes dénominations qui se ressemblent du temps où l'on s'attachoit plus à la mesure des grosseurs qu'à celle des angles.

g. *Incrustante*. Stalactites calcareus crustaceus, etc., incrustatus, *Haller, t. II, p. 500*. Stalactine (incrustant différents corps), *de Bern, t. I, p. 258*. L. C. 2, 1, 2, 3, etc. Concrétions calcaires par incrustation, *Daubenton, tabl., p. 22*.

Elle provient des dépôts que la matière calcaire a laissés autour de quelques corps, ordinairement étrangers au règne minéral, comme des branches d'arbre, des osseaux, etc.

Les sédiments déposés sur un fond pierreux ou terreux, ont été appelés *rylé* par les uns, et *stérone* par d'autres.

L'*ostéocole* de l'ancienne pharmacie, ainsi nommée parce qu'on lui attribuoit la vertu d'agglutiner, en peu de temps, les os fracturés, n'étoit autre chose qu'une incrustation, dont la cavité étoit restée vide par la destruction du végétal qui l'avoit occupée, ou s'étoit remplie, par la suite, de chaux carbonatée pulvérisante, délayée dans l'eau.

h. *Pseudomorphique*. Modelée en ossein, en corne d'homme, etc.

Observat. La chaux carbonatée, dite *pierre d'âpre*, renferme souvent des pseudomorphoses qui proviennent de différents coquillages, et dont on

grand nombre sont encore revêtus de leur coquille. Il y a des blocs immenses, presque entièrement composés de ces espèces de noyaux, liés entre eux par un ciment calcaire, dans lequel on distingue, soit à la vue simple, soit à l'aide du microscope, de nombreux débris des mêmes coquilles. Quelquefois un bloc qui présente un tissu uniformément granuleux, est un assemblage de coquilles microscopiques, que l'œil prend pour des grains calcaires. Les blocs, dans l'un et l'autre cas, portent le nom de pierres calcaires coquillières. Ils sont, à la chaux carbonatée grossière, ce que sont, à l'égard des marbres secondaires, ceux qu'on a nommés lamachelles.

CHAUX CARBONATÉE

Unir à différentes substances, de manière à constituer sa structure ou quelque autre de ses principaux caractères.

L. CHAUX CARBONATÉE ALUMINIFÈRE.

Dolomite, Saussure, *voyage dans les Alpes*, n°. 1929.

Commun Dolomite, Kérass, t. I, p. III.

Géogr. phys. Pesanteur spécifique 2, 85.

Tissu, granuleux, souvent avec une apparence plus ou moins feuilletée, surtout lorsqu'elle est mélangée de mica.

Dureté. Cassure peu cohérente; celle qui est blan-

cha s'agrippe souvent entre les doigts, par une légère pression.

Phosphorescence, sensible dans l'obscurité, par la percussion d'un corps dur. Quelques morceaux sont privés de cette propriété.

Caractères chimiq. Fusant une lente effervescence avec l'acide nitrique.

Analyse par Boussure le fil.

Chaux.....	44,89.
Alumine.....	5,85.
Magnésie.....	1,40.
Oxyde de fer.....	0,74.
Acide carbonique.....	46,00.
Perte.....	1,71.
	<hr/>
	100,00.

V A R I É T É S.

Form.

Chaux carbonatée aluminifère granulaire.

a. Massive.

b. Feuilletée.

Couleurs.

1. Chaux carbonatée alumine. blanchâtre.

2. Chaux carbonatée alumine. grise.

R E M A R Q U E S.

1. Le nom de *Dolomite* donné à cette substance,

a été emprunté de celui du célèbre Dolomieu, qui, le premier, a fixé sur elle l'attention des naturalistes. On la trouve disposée par couches, au Mont Saint-Gothard, et dans beaucoup d'autres lieux. La blanche renferme quelquefois du mica en petites lames rhomboïdales. Ailleurs, elle s'associe des substances métalliques, telles que l'arsenic sulfuré rouge, le cuivre pyriteux, et le cuivre gris. On trouve aussi du mica dans celle qui est grise. La greenalite est encore une des substances qui accompagnent la dolomie, et ordinairement elle participe de sa couleur blanche ou grise.

2. On observe une gradation de passages ou de sources intermédiaires entre la chaux carbonatée saccharide, ou le marbre blanc, et la dolomie, proprement dite.

II. CHAUX CARBONATÉE FERRIFÈRE, avec manganèse.

* Carbonate de fer des chimistes.

Ferrum calcareum lapideum haerens, minerâ alba, vel fusca, siccâ lapidea, etc. Minerâ ferrifera, Pfaffer, t. II, p. 261. Minerâ de fer spathique, de Lavoisier, t. II, p. 281. Fer spathique, minerâ de fer blanche, de Berzélius, t. II, p. 290. Fer avec manganèse et terre calcaire, minéralisé par l'acide acétique; minerâ de fer blanche, pierre d'aune, Schlegel, t. II, p. 174. Spallinger eisenstein, Koenig, t. II, p.

Sag. Fer minéralisé par l'acide carbonique ; fer spathique , *Dauvenot* , *tabl.* , p. 48. Iron mineralized by fixed air; calcareous or sparry iron ore , *Klein* , *t. II* , p. 190.

Caractères physiques. Pesant. spécif. 3,672. Celle de la variété perlée est de 3,876.

Dureté, plus grande que celle de la chaux carbonatée.

Poussière, blanche ou grise.

Caract. géométr. Divisible en rhomboïdes semblables à la forme primitive de la chaux carbonatée pure. Quelquefois les faces mises à découvert par la division mécanique, ont une courbure qui fait varier de quelques degrés leurs incidences respectives ; mais celles-ci sont constantes dans les morceaux où les lames ont leurs faces sur un même plan.

Caract. chim. Faisant une effervescence et légère effervescence avec l'acide nitrique. La variété perlée d'une couleur blanche y jaunit. Un fragment exposé au feu du chalumeau , devient attirable à l'aimant.

Analyse par Bergmann (1).

Chaux	70
Oxyde de fer	54
Oxyde de manganèse	84
	<hr/>
	100
	<hr/>

(1) *Opusc.* t. II, p. 228.

Les proportions de ces trois principes subissent des variations très-sensibles dans les différents morceaux.

Analyse de la variété perlée, par Berthollet.

Chaux carbonatée	96
Oxyde de fer et de manganèse...	4
	<hr/>
	100
	<hr/>

VARIÉTÉS.

FORMES.

Déterminables.

1. Chaux carbonatée ferrifère primitive, P (fig. 1) pl. XXIII. De Lisle, t. III, p. 185; var. a. Mêmes angles que ceux de la chaux carbonatée pure primitive. Voyez p. 132. Les variétés suivantes jusqu'à la 6^e. exclusivement se trouvent aussi parmi celles de la chaux carbonatée pure.

2. Chaux carbon. ferrifère équiaxe. $\frac{B}{E}$ (fig. 2).
Voyez p. 132.

3. Chaux carbonatée ferrifère inverse. $\frac{E'E}{f}$ (fig. 3). Voyez p. 133.

4. Chaux carbonatée ferrifère contraçante. $\frac{a}{m}$ (fig. 4). Voyez p. 137.

5. Chaux carbon. ferrifère saute. $\frac{PA}{P \frac{1}{2}}$ (fig. 5).

Tome II.

M

De Lisle, t. III, p. 285; var. 2. *Voyez* p. 159.

6. Chaux carbonatée ferrifère *hexaédre*. $\frac{P}{P_{70}}$

(fig. 6). Incidence de m sur P , $149^{\circ} 28' 40''$.

Je n'ai point été à portée d'observer la troisième variété de *Boué de Lisle*, *Créteillogr.* t. III, p. 286, qui représente, selon ce savant naturaliste, le rhomboïde primitif dont les six bords latéraux sont légèrement tronqués en biseau.

Indéterminables

7. Chaux carbonatée ferrifère *hexaédre*, de *Lisle*, t. III, p. 286; var. 4. C'est l'équiane dont les faces et les arêtes sont arrondies.

8. Chaux carbonatée ferrifère *contournée*. Elle se présente sous la forme de petits rhomboïdes, dont toutes les faces forment un pli dans le sens de leur diagonale oblique. Quelquefois les cristaux sont unis en manière de lames replées comme les bords d'un chapeau. J'en ai de cette modification qui ont 15 millimètres, en près de 7 lignes de largeur.

9. Squariforme. En rhomboïdes si petits et tellement serrés les uns contre les autres, qu'ils imitent un thau écailleux.

9. Chaux carbonatée ferrifère *laminaire*.

10. Chaux carbonatée ferrifère *lamellaire*. En petites lames ordinairement entrecroisées les unes

dans les autres. J'en vu des morceaux de cette variété, d'une couleur brune, qui avoient une grande ressemblance avec le zinc sulfuré ou la biterre de la même couleur.

11. Chaux carbonatée ferrifère amorphe. En masses compactes, quelquefois cellulaires et spongieuses.

ACCIDENTS DE LUMIÈRE

Couleurs.

1. Chaux carbonatée ferrifère blanche.
2. Chaux carbonatée ferrifère grise.
3. Chaux carbonatée ferrifère jaune.
4. Chaux carbonatée ferrifère brune.

Chargement.

Chaux carbonatée ferrifère perlée. Souvent blanche, et quelquefois jaune, avec des reflets perlés. Spath siliceux rhomboïdal, dit spath perlé, de Lède, *t. I*, p. 425. Chaux manganésée, de Bern, *t. I*, p. 554 et suiv. Braun spath, Kewenig, *t. I*, p. 479. Sidero calcis, Karsen, *t. I*, p. 166. Le spath bruisant ou le beau spath, Bruchant, *t. I*, p. 565.

ANNOTATIONS.

1. La chaux carbonatée ferrifère occupe communément des terrains primitifs, où elle forme des filons plus ou moins considérables. On en trouve

abondamment à Alver, dans le ci-devant Dauphiné; à Baygerry, dans la basse Navarre, où ses cristaux, qui sont d'une forme lenticulaire, accompagnent le cuivre gris; à Elencars, en Sicile; à Hattenberg, en Carinthie, et dans une multitude d'autres endroits. Le Cit. Leclerc a cherché la variété inverse, en petits cristaux isolés et très-réguliers, à Mongalon, entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Mauléon, dans les hautes Pyrénées; ils y étoient engagés dans des masses de charax sulfatée. Le citoyen Lannoy a rapporté d'Espagne d'autres cristaux, qui appartenoient à la variété rhomboïdale, et avoient aussi une gangue gypsée, dont la couleur tiroit sur le blanc de lait.

2. Cette substance, suivant Bergmann, est naturellement blanchâtre, ce qui l'a fait nommer *mine de fer blanche*; mais sa surface exposée à l'air brunit peu à peu, et finit même par noircir, ce qui provient du manganèse qui s'y trouve mêlé (1). En même temps la substance se décompose, devient plus tendre et perd son fluë in-melléux.

3. La chaux carbonatée ferrifère a été rangée jusqu'ici parmi les mines de fer, sous les noms de *fer spatique* et de *carbonate de fer*. Mais on en séparât la variété perle, et on la plaça dans la classe des pierres. Romé de Lile l'au-

(1) Berzs., Opusc., t. II, p. 187.

ciot un spath pesant, qui est noire baryte sulfatée, en convenant toutefois qu'elle avoit beaucoup de rapport avec le spath calcaire. La structure de ses cristaux m'a fait reconnaître, depuis long-temps, qu'elle appartenoit réellement à la chaux carbonatée, et le Cit. Berthollet, à qui j'en avois rendu un morceau, en le priant d'en faire l'analyse, n'y a trouvé que de la matière calcaire, avec une petite quantité de fer et de manganèse, dans la proportion d'environ quatre grains sur cent (1).

En restituant cette dernière substance à sa véritable espèce, j'avois d'abord placé l'autre parmi les mines de fer, à l'exemple de tous les minéralogistes. Mais j'ai changé d'avis, en réfléchissant que d'une part le spath perlé devoit être considéré comme le rudiment du fer spathique, ou, ce qui revient au même, le fer spathique comme le dernier terme d'une gradation qui commence par le spath perlé, et que d'une autre part les deux substances présentaient la structure de la chaux carbonatée, et se différoient de celle-ci que par une quantité de fer et de manganèse variable à l'infini. J'ai donc cru devoir les mettre ensemble, et en même temps les réunir à la chaux carbonatée, dont la structure est le terme commun qui

(1) Sans d'une même en la structure des cristaux, p. 116 et suiv.

reste consistant en milieu de toutes les diversités qui proviennent du mélange dont j'ai parlé.

4. Quant à la manière dont le nature a produit le fer spathique, plusieurs chimistes ont regardé cette substance comme le résultat d'une combinaison directe de fer et d'acide carbonique. Suivant cette opinion, le fer spathique seroit une véritable mine de fer qu'il faudroit placer dans le genre de ce métal. Mais on peut demander pourquoi la combinaison dont il s'agit auroit donné naissance à une molécule intégrante parfaitement semblable à celle de la chaux carbonatée, et pourquoi d'ailleurs le carbonate de fer renfermeroit toujours une certaine quantité de chaux, qui va quelquefois jusqu'à la moitié de la mine totale?

Romé de Lisle pensoit, d'après le Cit. Sage (1), que le fer spathique devoit son origine à un spath calcaire décomposé, dans lequel la terre métallique du fer auroit remplacé la terre calcaire, en s'emparant de l'acide qui étoit uni à celle-ci. Il cite, entre autres exemples d'un effet semblable, les colonnines, qui ont conservé la forme du spath calcaire, auquel elles ont succédé, et le bois pétrifié, qui présente encore le tissu ligneux. Mais les colonnines n'ont pas la structure du spath calcaire; elles ne l'imitent que par la forme extérieure. Dans le bois pétrifié, l'organisation est dé-

(1) Géol., t. III, p. 252. Voyez aussi à la page 82.

truite; il n'en reste que l'apparence. Enfin, ce qui infirme encore d'avantage l'opinion de Roud de Lisle, c'est que l'acide carbonique a plus d'affinité avec la chaux qu'avec le fer, et ainsi on ne peut pas supposer que le fer ait enlevé soit seule à la chaux par une affinité prépondérante.

5. Il est, au contraire, infiniment probable que le fer spathique a été produit comme d'un seul jet, c'est-à-dire, que la chaux carbonatée a cristallisé accidentellement plus ou moins de fer dans sa cristallisation, de manière que ses molécules conservaient leur tendance à s'arranger suivant les lois qui leur étoient propres.

Ce qui paraît ajouter un nouveau degré de vraisemblance à cette opinion, c'est la propension qu'a la substance dont il s'agit ici, à s'offrir sous des formes contournées, dans le cas d'une cristallisation précipitée. Nulle part la chaux carbonatée pure n'offre un pareil accident. Or, il est assez naturel de penser que les molécules ferrugineuses ont influé dans l'espèce de perturbation qu'éprouvoit l'affinité réciproque des molécules calcaires, ce qui suppose que les unes et les autres se sont réunies au moment même de la cristallisation.

Je crois avoir suffisamment motivé le parti que j'ai pris de ranger le fer spathique à la suite de la chaux carbonatée, qui lui imprime le caractère invariable de sa propre structure; et j'ai d'autant

moins balancé , que le spath perlé , qui appartient véritablement à cette même espèce , n'étant , pour ainsi dire , que le premier anneau d'une chaîne dont le reste est formé par les différentes modifications du fer spathique , il convenait de faire partir la chaîne entière d'un même point d'attache.

Nous revenons cependant sur le fer spathique , en parlant du fer oxydé , mais pour en faire le sujet d'une simple observation , relative aux qualités qui rendent cette substance précieuse , comme mine de fer.

III. CHAUX CARBONATÉE QUARTZEUSE.

Grès calcareo-quartzeux , de Liège , *t. I* , p. 307.
Quartz en grès et substance calcaire , Dandenton , *ibid* , p. 24.

Caract. phys. Pesant. spécif. 2 , 6.

Durcié. Rayant le verre ; souvent détrempant par le choc du briquet.

Cassure , grasse et écailleuse ; brillante sous certains aspects.

Surface extérieure , d'un blanc grisâtre. Surface intérieure , souvent d'un gris sombre.

Transparence nulle.

Caract. géom. Divisible par la percussion , en rhomboïde , semblable à la chaux carbonatée primitive. Les joints naturels sont très-sensibles , lorsqu'on fait mouvoir les fragments à la main.

Caract. chim. Soluble en partie, avec effervescence, dans l'acide nitrique.

VARIÉTÉS

FORMES

1. Chaux carbonatée quartzeuse *avoye*. En rhomboïde aigu, semblable à celui de la var. 3 ci-dessus, p. 111.

2. Chaux carbonatée quartzeuse *cassérillienne*. Formée de masselons, disposés en grappe ou en choux fleur.

3. Chaux carbonatée quartzeuse *avoye*.

Cette substance est jusqu'ici particulière au sol de la France. On la trouve dans les carrières de grès, voisines de Fontainebleau, dont le citoyen Lavoisier a donné une description très-détaillée dans les Mémoires de l'Acad. des Sc., de 1775. Il y en a aussi aux environs de Nemours. Les cristaux, dont quelques-uns ont plusieurs centimètres d'épaisseur, forment des grappes, dont le volume varie entre des limites très-étendues. On en rencontre aussi de solitaires, d'une forme très-régulière, engagés dans le sable. Quoique les uns et les autres soient en général d'une dureté assez considérable, ceux qu'on retire de certaines boîtes sont friables et s'égrènent facilement entre les doigts.

Tous ces cristaux ont absolument la même forme et la même structure que le rhomboïde de la chaux carbonatée inverse. Seulement il est plus difficile de les diviser dans le sens de leurs lames composées, et c'est surtout en faisant mouvoir leurs fragments à une vive lumière, que l'on aperçoit bien sensiblement leurs joints naturels.

Le Cit. Cordier, ingénieur des mines, qui a examiné avec attention le gisement des cristaux de Fontainebleau, a reconnu qu'ils s'étoient formés dans des cavités où la matière du grès, par l'effet d'une cause quelconque, avoit subi un relâchement dans sa texture, qui l'avoit réduite à l'état de sable.

Les molécules calcaires, amenées par l'infiltration dans ces cavités, avoient pénétré dans les interstices des grains quartzeux, qu'elles avoient saisis et enveloppés, en même temps qu'elles obéissent à leur tendance vers la forme du rhomboïde inverse, de manière que ces grains n'avoient fait autre chose qu'interrompre la continuité de la structure, sans en déranger le mécanisme. Dans les endroits où le sable laisoit des vides plus ou moins considérables, on trouve des cristaux de chaux carbonatée pure, ou dont une portion est à l'état de pureté, et l'autre mélangée de quartz, auquel cas la première s'est formée dans un espace libre, et la seconde dans le sable même, ce qui achève de prouver que le quartz

n'est ici qu'une espèce de hors d'œuvre, dans le résultat des lois de la structure. La partie calcineuse qui a maîtrisé la cristallisation n'était cependant pas la plus considérable ; elle ne formait qu'environ le tiers de la masse dans les cristaux que le Cit. Sage a soumis à l'analyse.

IV. CHAUX CARBONATÉE MAGNÉSIFÈRE.

Spath magnésien, *Seign.*, t. I, p. 207. Bitter-spath, *Kemmerling*, t. III, p. 253. Lime stone mixed with magnesia, 3 family, *Kirwan*, t. I, p. 92. Le spath magnésien, *Brochant*, t. I, p. 160.

Caract. phys. Rejoint la chaux carbonatée ordinaire.

Caract. géom. Divisible, avec une grande netteté, en rhomboïdes semblables à celui de la chaux carbonatée primitive.

Caract. chim. Soluble lentement et sans effervescence dans l'acide nitrique. Quelquefois il en excite une légère, lorsqu'il est réduit en poudre.

Analysé par Klaproth, du bitter-spath du Tyrol.

Chaux carbonatée.....	52
Magnésie carbonatée.....	45
Oxyde de fer et de manganèse....	3

100

V A R I É T É S.

F O R M E S.

1. Chaux carbonatée magnés. primitive.
2. Chaux carbonatée magnés. amorphe.

A C C I D E N T D E L U M I È R E.

Couleurs.

1. Chaux carbonatée magnés. blanchâtre.
2. Chaux carbonatée magnés. brune.

Transparence.

1. Chaux carbonatée magnés. transparente.
Elle l'est quelquefois assez pour permettre d'observer sa double réfraction.

2. Chaux carbonatée magnés. translucide.

On trouve cette substance dans les montagnes du Tyrol et du pays de Salzbouurg, et dans le Wernochland, province de Suède. Les cristaux que j'ai observés étoient incrustés dans un tuf feuilleté. On pourroit aisément les distinguer de ceux de chaux carbonatée ferrugineuse, par la transparence, et par le poli vil et égal des lames qui s'en détachent, à l'aide de la division mécanique.

V. CHAUX CARBONATÉE PÉTIDE.

Spectrum frictione frigidum, lapis stilus, Wailier, t. I, p. 148. Stuck-stein, Koenigsberg, t. I,

p. 487. Swine stone, Kirwan, *t. I*, p. 83. La pierre pesante, Brochant, *t. I*, p. 567. Vulgairement pierre de pore.

Caract. phys. Odeur très-fétide et semblable à celle des œufs pourris, lorsqu'on la frotte avec un corps dur.

Electricité. Isolée, elle en acquiert une vitreuse.

Couleur, blanche ou gris.

Caract. chim. Soluble avec une vive effervescence dans l'acide nitrique. Au chalumeau, elle perd son odeur.

Elle est susceptible des mêmes modifications de formes que la chaux carbonatée ordinaire, et on la trouve en prismes hexagonaux, qui se divisent très-nettement en rhomboïde primitif, plus souvent lamellaire, et souvent aussi terreuse et grossière.

Quant à l'odeur fétide qu'exhale cette substance, le Cit. Vauquelin l'attribue à la présence de l'hydrogène sulfuré.

On a trouvé, en plusieurs endroits, d'anciens momens de sculpture, exécutés avec la chaux carbonatée fétide lamellaire, ou à l'état de marbre.

VI. CHAUX CARBONATÉE BITUMINEUSE.

Caract. phys. Electricité résineuse par le frottement.

Odeur, bitumineuse, augmente par l'action du feu.

Couleur, noire.

Caract. chim. Soluble avec effervescence dans l'acide nitrique.

Exposée à un feu actif, elle perd sa couleur et devient blanche.

Les marbres appelés marbres noirs de Dinant, de Namur, etc., et employés pour le carrelage des églises, appartiennent à cette substance. Ils ont une cassure terne, avec un grain fin et serré.

La chaux carbonatée est quelquefois en même temps stérile et bitumineuse.

Les marbres étant des mélanges de chaux carbonatée et d'argile en toutes sortes de proportions, doivent être renvoyés à l'appendice qui terminera ce traité.

ANNOTATIONS GÉNÉRALES.

G E N E R A L.

1. La chaux carbonatée est la substance minérale la plus abondante de toutes celles qui existent à la surface du globe. Elle appartient à toutes les époques, et occupe des domaines dans toutes les espèces de sols. La nature l'a travaillée, l'a modifiée dans tous les temps, et continue de la faire concourir à une infinité de ses opérations actuelles.

Dans l'ancien sol ou sol primordial, non-seulement elle entre parmi les principes constitutifs des substances qui produisent les roches; mais

encore elle se présente solitairement en masses ou en bancs incrustans, dont le caractère particulier est d'avoir une texture lamellaire ou écailleuse, qui annonce une cristallisation confuse. Elle domine encore davantage dans le sol secondaire, dont plus de la moitié lui doit son existence. Elle se trouve dans les terrains tertiaires, associée avec l'argile, et y constitue les marnes. Elle tend à remplir une infinité de grottes, ou elle est amenée par l'infiltration. Elle incruste souvent l'intérieur des canaux qui servent à conduire les eaux. Elle est en cailloux roulés et en bûches dans le sol de transport, et on la retrouve dans le sol volcanique, où elle a été mise à découvert par les agens qui ont produit les explosions.

La chaux carbonatée cristallisée occupe les cavités des masses calcaires de toutes les époques. Elle existe dans presque tous les filons. Les diverses contrées semblent se l'approprier à l'envi l'une de l'autre. La Saxe, l'Angleterre, ainsi que l'Espagne, l'Italie et la France, ont rempli les cabinets des amateurs de superbes cristaux solitaires ou groupes de chaux carbonatée, dite *spath calcaire*; et il serait aussi difficile de citer des contrées où elle ne se trouve pas, que de faire l'énumération de tous les lieux où elle se trouve (1).

(1) Le *Rédacteur* de cet article n'a été fourni par le citoyen Delabarre.

C R I S T A U X N É O V L I E R S .

2. On chercheroit en vain , dans tout le règne minéral , une espèce qui se prît à davantage que celle-ci à une étude approfondie de la cristallisation. Abondance de cristaux , diversité de formes , netteté des coupes qui résultent de la division mécanique , tout se réunit pour offrir en même temps au naturaliste un objet digne de tout son intérêt , et des moyens propres à exalter ses efforts pour y atteindre.

Cette partie de la cristallographie , ainsi que je l'ai dit ailleurs , est celle qui m'a donné les bases et les premiers développemens de la théorie des dérivés. Mes calculs , dirigés alors vers les formes qui se présentent le plus ordinairement , ne m'offrirent que les lois les plus simples , parmi toutes celles dont il faisoit voir la possibilité. Mais ayant cherché depuis à étendre mes observations sur toutes les cristallisations connues de la même substance , j'ai été conduit à des lois nouvelles et intermédiaires , qui dérogent sensiblement à la simplicité des précédentes. Au reste , il n'est pas surprenant que la même fécondité qui a répondu dans le sein du globe les cristallisations calciques en tant de lieux différens , et avec tant de profusion , se montre encore dans la diversité des moyens employés à les produire ; et l'on remarque

remarque d'ailleurs que ces lois minces ou intermédiaires, qui compliquent la structure de certains cristaux, sont ordinairement associées à des lois beaucoup plus simples, qui interviennent dans la même structure, comme pour attester la dépendance mutuelle où elles sont les unes à l'égard des autres, et écarter toute idée d'anomalie et d'exception proprement dite.

3. Mais ce qui est digne surtout d'attention, dans la cristallisation de la chaux carbonatée, c'est la série de propriétés géométriques qui se développe, au moyen de la comparaison des formes originales de cette substance. L'inversion des angles, dans quatre rhomboides différents, considérés deux à deux, la reproduction de ceux du moyen sur le cristal métastatique, la constance de ceux du persistant, malgré le changement de figure qu'ont subi les fibres, les hypothèses curieuses auxquelles se prête le paradoxe, les nombreux rapports qui lient l'analogique avec d'autres cristaux, etc., sont autant de résultats d'une géométrie qui paraîtroit mériter d'intéresser par elle-même, comme simple objet de spéculation, indépendamment de ses applications à des étres réels.

4. Le calcul analytique qui conduit à ces résultats, offre un autre avantage relatif à un moyen tout-à-propre à faciliter l'étude de la cristallographie; c'est de fournir, dans beaucoup de cas, des méthodes perceptibles, faciles et précises pour repré-

senier les cristaux en bois. Nous en citerons ici un exemple, tiré du solide métastatique.

Faites d'abord un prisme hexaédre régulier *ay* (fig. 54), dont le côté vertical en soit égal à quatre fois et demie le côté *ai* de la base. Ensuite ayant ouvert un corps d'une quantité double de *ai*, prenez sur les six arêtes verticales les parties *ab*, *de*, *g'*, etc., égales chacune à cette ouverture, en partant alternativement des extrémités supérieure et inférieure des arêtes. Par les points *b*, *d*, *f*, *x*, etc., faites passer les droites *bd*, *df*, *fx*, etc.; coupez enfin le prisme de manière que les sections passent par ces droites, et en même temps par les centres *o* ou *x* des bases du prisme. Vous aurez deux sections qui produiront le dodécaèdre cherché *ox*, avec des angles exactement égaux à ceux du cristal donné par la nature.

En général, dans l'exécution des cristaux artificiels, relatifs aux différentes espèces de minéraux, on va bien plus sûrement au but, et l'on évite la lenteur et l'embarras des tâtonnements, lorsqu'on est dirigé par la théorie des lois de la structure.

C O N C L U S I O N S

5. La chaux carbonatée, déjà si abondante en résultats de la cristallisation régulière, semble ne plus reconnaître de bornes dans la production des

formes initiales qui résultent de l'infiltration du liquide chargé de ses molécules , à travers les voûtes des cavités souterraines. Dans plusieurs endroits, ces cavités sont des espèces de grottes, où l'on va voir d'un spectacle également curieux et imposant. Les naturalistes y admirent la fécondité de la cause qui a donné naissance à cet assemblage , où les peurs de l'effrayé se multiplient à l'infini, où la variété des positions le dispute à celle des formes ; et ceux que la simple curiosité y amène , déjà séduits d'avance par le mot de pétrifications, sous lequel les habitans du pays leur ont désigné les concrétions, s'abandonnent à des illusions qui métamorphosent, à leurs yeux, tous ces accidens en imitations fidèles des objets dont ils offrent une ébauche imparfaite. L'imagination ajoute ce qui manque à la ressemblance.

6. A mesure que le liquide continue de fournir de nouveaux matériaux , la scène change ; les concrétions deviennent plus nombreuses ; elles prennent de l'accroissement ; les unes s'abaissent peu à peu de la voûte vers le sol ; les autres s'élèvent du sol vers la voûte ; elles finissent souvent par se réunir , et s'en forme de nouvelles qui adhèrent latéralement aux premières ; et lorsque les masses ont acquis un certain volume , la grotte est devenue une carrière d'albâtre.

7. Ailleurs, des eaux chargées de molécules calcaires, les déposent sur tous les objets qu'elles baignent, et forment à l'entour une espèce d'enduit

sous lequel les plantes les plus délicates conservent leur figure et leur port. J'ai, depuis long-temps, dans ma collection, une tresse de lustre d'eau (*chama vulgaris*, Lén.) , retirée des baigns du château d'Anzy, près de Paris, et dont les traits caractéristiques percent, pour ainsi dire, tellement à travers l'enveloppe pierreuse, produite par l'incrustation, que l'œil d'un botaniste reconnoît facilement la plante.

8. On voit auprès des bains de Saint-Philippe, dans la Toscane, une espèce de manufacture d'incrustation, établie par le docteur Veyri. Une eau chargée de matière calcaire, tombe sur une croûte de bois, d'où elle rejaillit sur des moules de bas-relief, placés à des distances convenables. Lorsque l'incrustation a pris une épaisseur suffisante, on la détache, et l'on y retrouve tous les traits du bas-relief fidèlement rendus dans une matière qui a le blancheur du plus beau marbre de Carrare (1). L'ingénieur auteur de cette idée a, pour ainsi dire, trompé la nature, en la faisant de devenir artiste.

D O U B L E E X T R A C T I O N.

9. La chaux carbonatée a été la première substance à laquelle on ait reconnu la propriété de causer

(1) Voyez la traduction des lettres de Parker, sur la minéralogie de l'Italie, p. 375; et les lettres du docteur Donato, t. I, p. 288.

une double réfraction aux rayons de la lumière, ou, ce qui revient au même, de doubler les images des objets vus à travers deux faces opposées. C'est à Erasmus Bartholin (1) que nous devons la connaissance de ce phénomène, dont l'explication a exercé la sagacité de plusieurs savans très-distingués, à la tête desquels paroissent Huyghens et Newton; et ce qui prouve la difficulté du sujet, c'est la variété des opinions entre tous ces savans, dont chacun, sans s'arrêter à ce qui auroit été fait par les autres, essayoit de se tracer une route particulière, en sorte qu'au milieu de ce conflit d'autorités et de résultats sur un sujet qui a été retourné de tant de manières, et que l'on auroit traité de regarder comme épuisé, il paroit également difficile soit de choisir dans ce qui a été dit, soit de dire quelque chose de nouveau.

Je vais d'abord présenter la série des observations que l'on peut faire, en regardant les images des objets à travers les rhomboïdes connus sous le nom de *spath d'Islande*. J'ajouterai, en faveur de ceux qui seroient bien aises de connaître ce sujet sous le point de vue de la physique, quelques développemens sur la théorie du phénomène, et sur les résultats des recherches particulières que j'ai entreprises pour en déterminer la loi, et me mettre à portée d'apprécier les divers sentimens entre les-

(1) *Expér. crit. Lith.*, p. 2.

quels se sont partagés les auteurs qui ont traité le même sujet.

1^{re}. *Observation.*

10. Concevons un rhomboïde de (Fig. 55) pl. XXXIII, situé de manière que a et a' soient les deux angles solides composés de trois angles obtus, et que la base inférieure bc repose sur un papier. Supposons de plus que l'on ait marqué le papier d'un point d'encre en p , qui coïncide avec un point quelconque de la petite diagonale de . Placez votre œil de manière que le rayon visuel soit dans le plan $acde$, terminant par les petites diagonales ac , de des bases, et par les arêtes intermédiaires ad , ec (1); vous verrez deux images du point p , situées l'une et l'autre sur la direction de la diagonale de , et celle qui se trouvera la plus voisine de l'angle solide a , paraîtra plus ordonnée que l'autre, en dessous de la base supérieure $a'b'c'd'$.

(1) Pour assurer que le rayon visuel est dans ce plan, on peut tracer sur le même papier une ligne d'une couleur particulière, comme d'un rouge faible, qui passe par le point d'encre p , et qui doit plus longue que la diagonale de , pour déposer le papier de manière qu'elle coïncide avec cette diagonale. L'œil aura la position indiquée lorsqu'il verra cette ligne simple, c'est-à-dire, lorsque ses deux images concourront sur une seule direction, et qu'en même temps elles seront sur le prolongement de la partie visible des du rhomboïde.

11. Si le rayon visuel sort de plus eade, en s'écartant à droite ou à gauche, alors les deux images ne seront plus sur la diagonale da , ni même sur une parallèle à cette diagonale. Elles seront sur une ligne qui fera un angle plus ou moins ouvert avec da , en sorte, cependant, que l'image la plus extérieure sera toujours la plus voisine de l'angle a .

III. Observation.

12. On rendra l'espèce de tendance de la seconde image vers l'angle n très-sensible, en opérant de la manière suivante. Soit $daug$ (fig. 54) la même base que fig. 53; soit p un point visible situé au milieu de la diagonale da . Placez votre œil directement au-dessus du point p , en sorte que l'image la plus extérieure réponde à quelque point i de la même diagonale. Alors, sans déplacer l'œil, faites faire au rhomboïde une révolution, de manière que sa base $daug$ tourne autour du point p , comme autour d'un centre. Vous verrez tourner en même temps l'image i , qui suivra l'angle obtus n , et à mesure que cet angle décrira la circonférence de cercle nab , le point i décrira la courbe continue dae .

III. Observation.

13. Au lieu de marquer le papier d'un simple point, tracez-y une ligne droite, et faites tourner le rhomboïde au-dessus de cette ligne. Vous obser-

verrez que la plus grande distance entre les deux images a lieu, sous une même direction du rayon visuel, que vous supposez ici dans le plan de la coupe principale adne, lorsque la ligne est située parallèlement aux grandes diagonales des deux bases. Ces images se rapprocheront à mesure que la ligne fera un angle moins ouvert avec les mêmes diagonales, et lorsqu'elle leur sera devenue perpendiculaire, c'est-à-dire, qu'elle coïncidera, au contraire, avec les petites diagonales, les deux images se confondront, de manière cependant que l'axe dépassera l'autre (1).

IV^e. Observation.

14. Si vous substituez un cercle à une ligne, les deux images de ce cercle s'entrecouperont. Cette expérience rend très-sensible la différence de distance entre les images, par rapport à la base supérieure du rhomboïde.

V^e. Observation.

15. Prenez le rhomboïde, en appliquant l'index sur l'arête ad (fig. 53) et le pouce sur l'arête en, et

(1) Les directions sous lesquelles les deux images coïncident, varient à mesure que le rayon visuel, placé hors de la coupe principale, change lui-même de position. Nous sommes obligés de vous le dire ad aux fins qui servent comme de bases à tous les autres.

placez sa base supérieure ad/ le plus près possible de l'œil, de manière que l'une des deux images du point *p* soit située derrière l'autre, par rapport à vous. Alors faites glisser doucement, en desens du rhomboïde, une carte qui, étant appliquée à la base inférieure, s'avance de δ vers *a*, jusqu'à ce qu'elle cache une des deux images. Vous remarquerez, avec surprise, que cette image, dont la carte vous déroche d'abord la vue, n'est point celle qui est située du côté où vient la carte, mais celle qui est de votre côté. Cette expérience intéressante est due au Cit. Monge.

VI. Observation.

26. Si l'on pose le rhomboïde sur un papier marqué de deux points, et que l'on fasse varier les distances de ces points, relativement à une position déterminée de l'œil, on trouvera qu'il y a un terme où, au lieu de quatre images, on n'en voit plus que trois; dans ce cas, deux des premières images se réunissent en une seule, d'une teinte plus foncée.

Si, en même temps, l'œil est dans le plan *acde*, il faudra, pour que cet effet ait lieu, que les deux points soient sur la diagonale *de*.

Si l'œil s'écarte ensuite de la position où il voyoit deux des images se confondre, celles-ci se sépareront, et cela d'autant plus que la position de l'œil changera davantage; et il faudra pour les voir de nouveau se confondre, augmenter la distance entre

les deux points , si le rayon visuel , en variant son inclination , s'est rapproché du point e , et diminuer cette distance , si le rayon visuel s'est incliné en sens opposé vers le point a . Nous supposons toujours que ce rayon ne sorte pas du plan $abce$, auquel cas il est nécessaire , pour ramener les quatre images à n'en faire plus que trois , de laisser toujours les deux points sur la direction de la diagonale ba .

Il n'en sera pas de même si le rayon visuel sort du plan $abce$. Voici ce que j'ai observé à cet égard. Soit ba (fig. 55) la même diagonale que fig. 53 , et p , r les deux points visibles. Concevons que le rayon visuel étant d'abord incliné vers b , et situé dans le plan $abce$ (fig. 53) , l'œil fasse un mouvement circulaire en allant de e vers f ; l'observateur ne pourra voir coïncider deux des images qu'en plaçant les points p , r (fig. 56) sur une direction inclinée à la diagonale. Supposons que le point p reste fixe ; il faudra placer le point r à la droite de la diagonale , comme en r' . Tandis que le rayon visuel s'approchera de plus en plus d'un plan qui couperoit à angle droit la section principale , la distance nécessaire entre le point r' et la diagonale les augmentera. Elle sera la plus grande possible , lorsque le rayon visuel se trouvera dans le plan dont nous venons de parler. Au-delà de ce plan , en allant de f vers a (fig. 53) , il faudra diminuer la distance , en laissant toujours le point r' (fig. 56) sur une oblique qui diverge du côté de a , par rapport à la diago-

nale. La distance devien dra nulle , lorsque le rayon visuel tombera de nouveau , mais en sens contraire , sur le plan abne (*fig. 53*). Si ce rayon continue sa révolution en allant de *a* vers *d* , les mêmes effets auront lieu dans un ordre opposé , c'est-à-dire , que pour obtenir la coïncidence des images , il faudra placer le point *r* de l'autre côté de la diagonale comme en *r'* (*fig. 56*). Nous verrons dans la suite l'utilité de ces observations , relativement à la théorie du pléisme.

VII. Observation.

17. Reprenons le cas où il n'y a qu'un seul point visible *p* (*fig. 53* et *55*), situé sur la diagonale *ba* , et où le rayon visuel est dans le plan abne. Si ce rayon est en même temps perpendiculaire sur *ba* , et que le point *p* soit sur sa direction , l'image la plus voisine de l'angle *b* , ou la moins enfoncée en dessous de la base *acgf* sera vue à sa vraie place , tandis que l'autre sera déplacée. Mais il y a aussi une circonstance où celle-ci est vue sans déplacement ; c'est lorsque le rayon visuel *ar* (*fig. 55*) étant parallèle aux arêtes *ab* , *ac* , environ à deux degrés près , le point *p* se trouve sur la direction de ce même rayon (1).

(1) Pour vous assurer que l'une ou l'autre des deux images n'est point déplacée , ayant tracé une ligne d'encre faible plus longue que la grande diagonale du rhom-

VIII. Observation.

18. Tailler un rhomboïde de manière à faire naître deux faces artificielles triangulaires $ac'd$, $a'm'd'$ (fig. 57), qui interceptent les deux angles solides a , a' (fig. 55), et soient perpendiculaires à l'axe qui passe par ces angles. L'image d'un point vu à travers ces deux faces paraîtra simple, pourvu que le rayon visuel soit perpendiculaire à ces mêmes faces, et que le point soit situé sur sa direction. Car si l'œil s'écarte d'un côté ou de l'autre, les deux images qui coïncidaient en une seule, se sépareront.

Il suit de là qu'un cristal transparent de rhombes cuboctaèdre hachés, ferait voir les objets simples, sous une certaine position de l'œil.

IX. Observation.

19. Au lieu d'un seul rhomboïde, prenez-en deux, que vous mettrez en contact par une de

boîte, et dont le milieu sera marqué d'un point d'entre, faites-le coïncider avec la grande diagonale, de manière qu'elle le dépasse de chaque côté. Vous sçavez que l'une ou l'autre des images du point p est vue à sa vraie place, lorsque l'image de la ligne rouge dont elle occupe le milieu, sera vue sur la même direction que les parties extrêmes de cette ligne.

leurs bases (1), et placez le rhomboïde inférieur sur un papier marqué d'un point d'encre. Si les faces homologues des deux rhomboïdes sont respectivement parallèles, l'œil ne verra que deux images d'un même point, comme s'il n'y avait qu'un seul rhomboïde : seulement elles seront plus écartées l'une de l'autre. Les choses étant dans cet état, faites tourner doucement le rhomboïde supérieur au-dessus de l'inférieur. Bientôt vous verrez paraître deux nouvelles images qui d'abord seront très-faibles, et ensuite s'agrandiront peu à peu d'intensité; en même temps les deux premières images s'affaibliront par degrés, et finiront par disparaître, ce qui arrivera avant que le rhomboïde mobile ait fait un quart de révolution. Passé ce terme, si vous continuez de le faire tourner, les mêmes effets auront lieu dans un ordre inverse; c'est-à-dire, que les deux premières images reparaîtront, et que leur teinte, d'abord légère, se renforcera peu à peu, tandis que les deux autres diminueront d'intensité, jusqu'à ce qu'elles deviennent nulles vers la fin de la demi-révolution du rhomboïde mobile (2). Alors les couples principales étant tournées en sens contraire, mais tou-

(1) Ce serait la même chose, si les bases étant séparées, se trouvaient parallèles l'une à l'autre.

(2) Tous ces différents états sont sujets à quelques exceptions, lorsque le rayon visuel est très-oblique et prend certaines positions. Car alors on ne voit que deux images

pour sur un même plan, comme le représente la fig. 58, l'œil ne verra plus que deux images, mais beaucoup plus rapprochées que dans le premier cas. Il n'en verra même qu'une seule, si les deux rhomboïdes étoient exactement de même hauteur. Si vous achèverez la révolution du rhomboïde supérieur, les effets précédens reparaîtront en suivant de même une marche rétrograde.

29. Je passe maintenant aux résultats qui concernent la théorie du phénomène, et peuvent aider à en déterminer les lois.

Soit toujours *abce* (fig. 59) *pl. XXX*, la section principale du rhomboïde. Si un rayon de lumière tombe suivant une direction *st* perpendiculairement à la surface du rhomboïde, il se divise en deux parties, dont l'une *st* sera sur le prolongement du rayon incident, comme dans le cas ordinaire, et l'autre *sf* s'écartera de la précédente, en se rejetant vers l'angle aigu *b*, et en faisant avec *st* un angle *fsi* d'environ 64° , c'est-à-dire, qu'il y aura une double réfraction du rayon de lumière (1).

J'appellerai désormais le rayon *st*, rayon ordinaire; le rayon *sf*, rayon d'aberration, et la distance *st* ou *st'* l'on devra en voir quatre, si réciproquement.

(1) Si de l'angle *a* on abaisse *ax* perpendiculaire sur *bc*, et que l'on prenne *xy* égale au sinus de *bc*, l'angle *xyx* sera sensiblement égal à l'angle *fsi*. Cet angle est de 64° , suivant Huyghens et Newton.

tance f' de l'un à l'autre, prise sur la base inférieure du rhomboïde, amplifiée d'aberration.

Si le rayon incident se trouve obliquement sur la surface du rhomboïde, il se divisera toujours en deux parties, dont l'une, qui sera le rayon ordinaire, se réfractera en se rapprochant de la perpendiculaire au point d'incidence, suivant une loi analogue à celle des réfractions communes, et qui est telle que le sinus de réfraction est à celui d'incidence constamment comme 3 à 5. L'autre partie, qui sera le rayon d'aberration, s'écartera toujours de la précédente, pour se rapprocher de l'angle δ , quelle que soit la direction du rayon incident. Nous verrons dans la suite quelle est la loi de cette seconde réfraction.

21. Supposons à présent qu'un rayon de lumière traverse deux rhomboïdes situés l'un au-dessus de l'autre. Si les sections principales coïncident dans le même plan, ou sont respectivement parallèles, soit que leurs bords latéraux ab , en s'inclinent dans le même sens, ou en sens contraires, comme on le voit (fig. 38), chacun des rayons ordinaire et d'aberration qui sortent seuls du premier rhomboïde ne se décomposent pas en passant dans le second, mais s'y réfractent suivant la même loi que dans le premier.

Si les deux rhomboïdes sont tellement disposés que leurs sections principales se croisent à angle droit, alors chacun des deux rayons seuls du

premier rhomboïde restera encore simple en pénétrant le second. Mais ces rayons changeront de fonction, c'est-à-dire, que celui qui étoit rayon ordinaire dans le premier rhomboïde, se dirigera dans le second comme rayon d'aberration, et réciproquement.

Mais dans toutes les positions intermédiaires, c'est-à-dire, dans celles où les sections principales seront inclinées entre elles, chacun des deux rayons sortis du premier rhomboïde se partagera de nouveau dans le second, en un rayon ordinaire, et un rayon d'aberration, qui se dirigeront conformément à l'inclinaison du rayon dont ils seront les subdivisions. Ces résultats méconnus sont de Newton.

22. Il est à remarquer que les rayons d'aberration ont cela de commun avec les rayons ordinaires, qu'en repassant du rhomboïde dans l'air par une face parallèle à celle par laquelle ils étoient entrés, ils prennent une direction qui est elle-même parallèle à celle du rayon incident.

23. Nous n'avons considéré, jusqu'ici, que les résultats les plus généraux de la réfraction du rayon d'aberration, ceux sur lesquels on ne peut élever aucun doute. La difficulté consiste à déterminer, d'une manière précise, la route de ce rayon. Or, les sentimens sont partagés à cet égard. Newton et Huyghens admettoient pour la réfraction de ce rayon, une loi particulière, différente de la loi commune.

commune. D'autres physiciens, au contraire, pensant que ce rayon se réfracte selon la loi ordinaire; et cette idée a été la plus généralement suivie. Nous allons essayer d'apprécier chaque opinion, et de rectifier celle qui nous paraît approcher le plus de la vérité.

14. Huyghens faisoit consister la propagation de la lumière dans des espèces d'ondulations qui étoient, en général, d'une figure circulaire (1). Mais il supposoit que la lumière, en pénétrant un rhomboïde calcare, y produisoit des ondulations de deux figures, l'une circulaire comme dans les autres corps, l'autre elliptique, particulière au cas présent; et c'étoit à ces dernières ondulations qu'il attribuoit la réfraction extraordinaire. Il manie cette hypothèse avec beaucoup d'art, et il parvient même à ce résultat très-remarquable, que la somme des deux amplitudes d'aberration, sous deux incidences égales en sens contraire, est une quantité constante, double de celle qui a lieu sous l'incidence perpendiculaire, c'est-à-dire, double de la ligne *fi* (fig. 39).

Quand même on admettroit la théorie d'Huyghens, sur la propagation de la lumière, l'idée de ces ondes elliptiques, qui se combinent avec des ondes circulaires dans la double réfraction, seroit

(1) Christ. Majoull opera vetique, et L. Fresneus de Aether; Traité de la lumière, par le même. Leyde, 1820.

trop l'air d'une supposition purement gratuite, et les propriétés de l'ellipse pourroient tout au plus servir ici à représenter géométriquement la loi du phénomène. Mais j'ai trouvé qu'elles ne satisfaisoient à l'observation qu'entre certaines limites; et quant au résultat qui en dérive, relativement à la somme constante des deux amplitudes d'aberration sous des incidences égales et continues, nous verrons qu'il a lieu généralement dans une infinité d'hypothèses différentes, parmi lesquelles nous tâcherons de déterminer la véritable.

25. Newton, qui considéroit la propagation de la lumière comme l'effet de l'émission en ligne droite des particules du corps lumineux, a ramené sa théorie de la double réfraction à cette hypothèse également simple et heureuse. Suivant ce célèbre géomètre, la matière du cristal d'Irlande agissoit sur la lumière par deux attractions différentes, l'une analogue à celle qu'exercent en général sur ce fluide tous les corps transparents, l'autre particulière au cristal lui-même, et dépendante de certaines circonstances que nous serons connaître dans la suite. Telles étoient les directions des deux rayons réfractés qui provenaient d'une même incidence, qu'elles donnoient une quantité constante, égale à fl (fig. 59), pour l'amplitude d'aberration, dans tous les cas possibles, et non pas, comme l'avoit dit Huyghens, pour la somme des deux amplitudes correspondantes. De plus, Newton

pensoit que l'amplitude d'aberration étoit toujours parallèle à la diagonale du (Fig. 55), quelle que fût la direction du rayon incident (1).

26. Ce avant illustre consolait les résultats d'Huyghens qui l'avoit précédé dans ses recherches ; et il est assez surprenant qu'en les abandonnant il leur ait substitué une loi qui nous a paru s'accorder encore moins avec l'expérience. Nous allons mettre les observateurs à portée d'en juger par eux-mêmes, en partant de notre ancienne observation, dans laquelle les quatre images, données par deux points, se réduisent à trois.

Soit st (Fig. 56) un rayon de lumière qui tombe, suivant une direction quelconque, sur la base supérieure du rhomboïde. Soit sr le rayon ordinaire, et sr' le rayon d'aberration, auquel cas pr sera l'amplitude d'aberration. Soient pp' , rr' les rayons émergens qui, d'après ce qui a été dit, seront parallèles à st . Au lieu du rayon st , supposons deux points visibles, l'un en r' et l'autre en p' , qui envoient des rayons vers le rhomboïde, dans toutes sortes de directions. Il est évident que parmi tous ces rayons, celui qui suivra la direction $r'r$ se divisera au point d'émergence, de manière que rr sera encore le rayon réfracté ordinaire. Car, à cause du parallélisme des rayons st , $r'r$ considérés successivement comme rayons incidents, le

(1) *Optice Revisée*, lib. 3, par. 26.

rayon réfracté et sera exactement la même fonction à l'égard de l'un et de l'autre. Par une raison semblable, le rayon qui suivra la direction $p'p$ se décomposera dans le rhomboïde, de manière que le rayon d'aberration sera entre ps .

La proposition sera toujours vraie, quelles que soient les positions des points visuels le long des lignes $r'r$, $p'p$; d'où il suit que si l'on suppose l'un en r et l'autre en p , ps et rs seront les routes des rayons qui arriveront en s , et tout se passera comme dans l'hypothèse du rayon incident rs . Les choses étant dans cet état, supposons un œil placé en s . Cet œil verra deux des quatre images données par les deux points se confondre sur la direction rs . Donc, toutes les fois que cette réunion a lieu, la distance ps entre les deux points est l'amplitude d'aberration, relativement à un rayon incident qui auroit la direction sous laquelle l'œil voit l'image unique formée par la réunion dont on a parlé.

Or, nous avons vu qu'il étoit nécessaire, dans ce cas, de changer la distance entre les deux points, à mesure que la position du rayon visuel varioit elle-même; d'où il suit que l'amplitude d'aberration n'est pas une quantité constante, comme Newton l'avoit pensé.

Elle n'est pas non plus constamment parallèle à la petite diagonale bs ; car nous avons vu que quand le rayon visuel n'étoit pas dans le plan abs

(Ag. 53) (et il en faut dire autant de tout autre plan parallèle à celui-ci), on ne pouvait faire concourir deux images en une seule, qu'en plaçant les deux points visibles sur une ligne inclinée à la diagonale. Donc, dans tous les cas de ce genre, l'amplitude d'aberration, qui mesure la distance entre les deux points, fait elle-même un angle avec la diagonale.

Il paroît que Newton ayant fait ses expériences avec des rhomboïdes d'une hauteur peu considérable, et n'ayant pu montrer avec assez de précision les distances et les positions des rayons de lumière qu'il introduisoit immédiatement à travers ces corps, aura été entraîné par l'extrême simplicité de la loi qui sembloit s'offrir à son observation.

27. Parmi ceux qui ont cru pouvoir ramener la réfraction du rayon d'aberration aux lois ordinaires, le plus grand, et entre autres Buffon (1), ont cru qu'un rhomboïde de chaux carbonatée étoit composé de couches entrecroisées, de deux densités différentes, produisant chacune une réfraction particulière, avec un rapport constant entre les sinus, comme dans les substances dont la réfraction est simple. Suivant Buffon, ce rapport est celui de 5 à 3 pour une substance, et celui de 10 à 7 pour l'autre.

Cette hypothèse, qui paroît très-admissible au

(1) Hist. nat. de minér., t. III, liv. 12, c. VII, p. 217 et suiv.

premier coup d'œil, ne tient pas contre un examen tant soit peu réfléchi. Car, supposons que dans la coupe principale *acbd* (Fig. 61), les lettres C, D, F, G indiquent les coupes particulières de l'une des deux substances, et *e*, *d*, *f*, *g* celles de l'autre substance. Soit *p* un point visible situé derrière le rhomboïde, et *pa* un rayon envoyé par ce point perpendiculairement à *ba*. Ce rayon parvenu en *a* rencontrant la surface *ac* à laquelle il est incliné, se repliera dans la tranche *d*, suivant une direction *ae*, qui dépendra de la densité de la tranche *d*. Arrivé ensuite en *e*, il passera dans la tranche D, en prenant une direction *ed* parallèle à *ba*, et perpendiculaire sur *ac*, d'où il suit qu'il repassera dans l'air par la ligne *ea* étendue sur le prolongement de *et*. Donc, un œil situé en *a* verra l'image du point *p* sur la ligne *ea*, d'où il suit que cette image paraîtra déplacée, puisqu'elle sera vue en *p'*. Donc, on ne pourrait jamais voir à travers le rhomboïde une des deux images d'un point dans sa vraie situation, en plaçant l'œil de manière que le rayon visuel étant perpendiculaire à la base du rhomboïde, le point dont il s'agit fût sur le prolongement de ce rayon, ce qui est manifestement contraire à l'observation.

Il en sera de même, si l'on suppose d'autres couches qui croisent les précédentes, dans des directions parallèles aux lignes *ac* et *ba*. On con-

coût bien ainsi que comme toutes ces différentes couches auroient des épaisseurs extrêmement petites, les déviations du rayon pl , au lieu d'une seule que représente la figure, seroient très-multipliées, ce qui ne fait que fortifier la difficulté. La même hypothèse paroitra encore moins admissible d'après ce que nous dirons dans la suite (1).

23. Il résulte de tout ce qui précède, que la réfraction du rayon d'observation est soumise à une loi particulière, distinguée des lois connues. J'ai entrepris de déterminer cette loi, mais seulement pour les rayons situés dans le plan $abac$ (fig. 53), le temps ne m'ayant pas permis de poursuivre plus loin ce travail. Je donne ici le résultat auquel je suis parvenu, représenté à l'aide d'une construction que l'on verra aisément.

Nous avons vu que quand le rayon incident ac (fig. 52) étoit perpendiculaire sur ac , auquel

(1) Si l'on parvenoit à faire varier la réfraction du rayon d'observation dans les lacs connues, on auroit en supposant que le plus réfringent fut à peu près perpendiculaire aux autres ab , ac , puisque le rayon d'observation n'éprouveroit aucune déviation lorsqu'il est à peu près parallèle à ces autres. Telle étoit l'hypothèse de La Hire (Mémoires de l'Académie des Sciences, an 1702). Mais j'observe, d'une manière générale, qu'il n'y auroit aucun plan, quelle que fût sa position, auquel on pût ramener la réfraction du rayon d'observation, avec un rapport constant entre les sinus. Voyez la partie géométrique ci-dessus, p. 32.

cas le rayon ordinaire continuoit sa route dans le rhomboïde , la direction ef du rayon d'aberration devoit pour l'amplitude fI , une quantité égale au tiers de dx , ou de la distance entre l'angle δ et la perpendiculaire ax .

Maintenant soit ae (fig. 6a) un rayon incident oblique sur ae , et ef le rayon réfracté ordinaire, dont il est facile de déterminer la position d'après le rapport 5 à 5 entre les sinus. On demande la position du rayon d'aberration ef .

Soit toujours ax une perpendiculaire sur de , et ay la position du rayon d'aberration dans le cas de l'incidence perpendiculaire. Par le pied de la ligne ax , menez xao , qui fasse, avec ax , un angle de 60° ; puis par le pied du rayon ordinaire ef , menez de parallèle à xo . Prenez sur de la partie de égale à ax . La ligne ef , menée par le sommet du rayon ordinaire et par le point e , sera la direction du rayon d'aberration relatif à l'incidence suivant ae .

Si l'on suppose que l'incidence ait lieu en sens contraire, suivant une direction $a'e'$, alors le rayon ordinaire étant représenté par $e'f'$, le rayon d'aberration $e'f'$ sera encore situé entre le périclète et l'angle δ , et l'on aura l'amplitude d'aberration par une construction semblable à celle que nous avons indiquée relativement au rayon incident ae .

On voit par là que de ou $e'e'$ est une constante. Mais l'amplitude ef ou $e'f'$ est nécessaire-

ment une variable. Si l'on suppose que les deux incidences st , $s't'$ soient égales en sens contraire, on aura $f'P$ plus petite que fI , de manière que leur somme sera double de l'amplitude xy relative à l'incidence perpendiculaire. Cette somme est donc elle-même une quantité constante. Or, j'ai prouvé (1) que cela avoit toujours lieu, quelle que fût la valeur de l'angle $\Delta\alpha\sigma$, pourvu que l'on eût $\Delta\sigma$ ou $I'ut'$ égale à $\alpha\sigma$ (2). Parmi tous les cas possibles, j'ai choisi celui qui m'a paru s'adapter le mieux à l'observation, et il est remarquable que ce cas soit celui où la ligne $\alpha\sigma$ fait, avec $\alpha\tau$, un angle de 60° , tandis qu'elle fait, avec $\alpha\sigma$, un angle qui est, à très-peu près, de $104^\circ \frac{1}{2}$, c'est-à-dire, égal au grand angle du rhombo primitif.

Quelque étendu que soit déjà cet article, malgré l'attention que j'ai eue de me restreindre à ce qui m'a paru le plus important, je ne puis me dispenser d'y joindre, d'après les principes qui viennent d'être exposés, l'explication des faits découverts par les observations que j'ai citées au commen-

(1) Mém. de l'Acad. des Sciences, 1788, p. 44. Voyez aussi dans ce traité la partie géométrique, p. 23.

(2) C'est la même raison qu'Huyghens avoit déduite des propriétés de l'ellipse, dont il attribuoit la figure aux cordes de lumière, qui produisoient, selon lui, le relief des minéraux.

ment, et quelques détails sur la cause physique d'où paraît dépendre le phénomène.

29. Examinons d'abord la marche que suivent les deux rayons qui nous font apercevoir la double image d'un point à travers un rhomboïde.

Soit toujours *acbd* (*fig. 63*) la section principale. Soit *p* le point visible situé à une certaine distance en dessous du rhomboïde, et *e* la position de l'œil. Parmi tous les rayons que le point *p* envoie vers le rhomboïde, il y en a un, tel que *pf*, dont la partie *ft*, considérée comme rayon ordinaire, après avoir repassé dans l'air, parvient à l'œil suivant une direction *te*, parallèle à *pf*. L'autre partie, qui est le rayon d'aberration, prend une direction telle que *ft*, en se réfractant vers l'angle aigu *c*, et comme après son émergence en *e*, suivant une ligne *ae*, ce rayon redevient parallèle à *pf*, il est perdu pour l'œil. Maintenant, entre tous les autres rayons qui partent du point *p*, il y en a un second, dont la direction *pe* se rapproche tellement de *pf*, que *ce* étant le rayon ordinaire qui en provient, le rayon d'aberration ou croise le rayon *te* au point *k*, et après son émergence en *e*, suit une direction *ae* parallèle à *pe*, et qui va aboutir à l'œil. On conçoit que cette supposition est toujours possible, puisque l'on est le maître de prendre le rayon *pe* sous telle inclination que l'on veut, par rapport à *pf*. L'œil verra donc deux images du point *p*, l'une sur la direction *at*, et qui sera l'image or-

dire, l'autre sur la direction na , et qui sera l'image d'aberration. Quant au rayon oe , il est évident, qu'à cause de son parallélisme avec po , après son émergence en r , suivant une ligne telle que ro , il ne peut passer par l'œil.

A mesure que le point p se rapprochera de la ligne da , le point k descendra vers cette même ligne; et lorsque le point p touchera da , le point k se confondra avec lui, de manière que la double image subsistera toujours.

On voit par là pourquoi l'image ordinaire est toujours plus voisine de l'angle aigu k , que l'image d'aberration. C'est une suite du croisement des rayons oe et ir au point k .

En. En exposant la première et la quatrième observation, nous avons dit que l'image d'aberration, celle qui se rapproche le plus de l'angle obtus n , étoit plus enfoncée que l'autre au dessous de la base supérieure du rhomboïde. Il s'agit d'expliquer cette différence.

Remarquons d'abord que les rayons, à l'aide desquels on voit l'image d'un point situé derrière un milieu diaphane, forment un cône, dont la base est contigüe à la surface du milieu la plus voisine de l'œil. Au-dessus de cette surface, ils se replient vers l'œil, par l'effet de la réfraction, en formant un cône tronqué, dont la plus petite base se confond avec la base du premier cône, et dont l'autre base, qui est plus distée, a un diamètre égal à

celui de la prisme par laquelle les rayons entrent dans l'œil.

Quelque opinion que l'on adopte sur la distance précise à laquelle on aperçoit l'image vue par réflexion (1), il est certain que, toutes choses égales d'ailleurs, cette distance est plus grande lorsque les deux diamètres des bases du cône tronqué diffèrent moins entre eux, ce qui fait que le sommet du même cône prolongé par l'imagination derrière la surface réfléchissante, est plus éloigné de cette surface.

Cela posé, concevons que au (*fig 64*) représente toujours le même rhomboïde, et que p étant un point visible situé sur la base inférieure, produise le cône bise, à l'aide duquel l'œil aperçoit l'image ordinaire du point p . Nous supposons d'abord cet œil situé de manière que le rayon visuel se trouve dans le plan de la section principale. Tous les rayons d'aberration qui correspondent aux rayons ordinaires, dont le cône pèse-est l'assemblage, sont perdus pour l'œil, d'après ce qui a été dit plus haut. Mais il y a un second cône (2) formé par d'autres rayons d'aberration, à l'aide duquel l'œil voit l'image d'aberration du point p , et de même tous les rayons ordinaires correspondans sont perdus pour l'œil.

(1) Voyez Newton, *Opticks mathematicæ*, edit. Lammont et Grenet, 1744, p. 128.

(2) Nous n'avons point représenté ici ce second cône, pour ne pas trop compliquer la figure.

Prenez dans le cône lpo les deux rayons pk , pe , qui aboutissent à l'extrémité du diamètre situé perpendiculairement à la diagonale ac , et rétablissez pour un instant les deux rayons d'aberration qui leur correspondent : il est facile de voir que ces derniers rayons doivent se trouver aux extrémités u , f de deux lignes obliques par rapport à la diagonale ac , puisque dans ce cas les amplitudes d'aberration divergent à l'égard de cette diagonale, ainsi qu'il a été dit plus haut. Donc, si l'œil étoit placé de manière à recevoir ces mêmes rayons qui sont perdus pour lui, leur distance uf étant plus grande que la distance ko , le point de concours imaginaire de ces rayons, derrière la surface $adef$, seroit plus éloigné que celui des rayons ordinaires kr , oe .

Concluons de là que les lois, suivant lesquelles se réfléchissent les rayons d'aberration, tendent, en général, à rendre la distance entre ces rayons, pris de deux côtés opposés, plus grande que celle entre les rayons ordinaires, puis d'après la même condition.

Or, cette augmentation de distance, que nous venons de trouver en comparant ensemble les rayons ordinaires qui composent le cône $plors$ et les rayons d'aberration correspondans, devant toujours avoir lieu, proportion gardée, pour les autres rayons d'aberration qui sont à portée de l'œil, et lui font voir l'image d'aberration ; il en

résulte que la réfraction d'aberration tend à élargir la plus petite base du cône trouqué, plus que ne le fait la réfraction ordinaire. Donc, si l'on suppose ce cône prolongé derrière la surface réfringente, le point de son axe, relativement auquel toutes les directions se compensent, et que Newton appelle *centre d'irradiation*, doit se trouver plus reculé par rapport à l'œil et à la surface réfringente, que le point correspondant du cône formé par les rayons ordinaires. Donc le lieu apparent de l'image d'aberration sera aussi plus éloigné que celui de l'image ordinaire.

Si l'on conçoit que le rayon visuel soit incliné en sens contraire vers le point a , on aura des conclusions analogues, en appliquant le raisonnement que nous venons de faire.

Si le rayon visuel sort de la section principale et se rejette de côté, de manière que, par exemple, il se rapproche du point f , alors $k' o'$ (fig. 65) étant la base inférieure du cône trouqué, les lignes $k' n'$, $o' p'$ s'inclineront dans le même sens. Mais la ligne $o' p'$ s'écartera davantage que la ligne $k' n'$ de la direction parallèle à at , d'où il suit que l'on aura encore $n' p'$ plus grande que $k' o'$, quoique dans un inclinaison rapport que quand le rayon visuel coïncideroit avec la section principale. L'image d'aberration sera donc vue aussi, dans ce cas, plus loin que l'image ordinaire; mais la différence des distances sera moins sensi-

Me que dans le premier cas, ce qui n'a paru conforme à l'observation.

31. Le mouvement de rotation que fait l'image d'aberration autour de l'image ordinaire, dans la seconde observation, provient de ce que les rayons qui produisent la première de ces images et qui vont de bas en haut, ont une tendance à se rejeter toujours vers l'angle aigu ϵ (Fig. 53), ainsi du même côté que n , ainsi que nous l'exposerons plus en détail, en parlant de la cause physique du phénomène.

32. Dans la troisième observation, les images de la ligne vue à travers le rhomboïde, sont au maximum de leur distance respectives, lorsque cette ligne est parallèle à la grande diagonale, ou, ce qui revient au même, lorsqu'elle est perpendiculaire à la section principale. Car cette position est celle où les rayons d'aberration, qui tendent à se rejeter toujours vers la région du petit angle solide ϵ , sont à l'extrémité de la même section, s'écartent le plus des rayons ordinaires, par une suite de ce que leurs mouvements approchent davantage d'être perpendiculaires à la direction de la ligne observée. Supposons, au contraire, que cette ligne coïncide avec la petite diagonale de , alors chacun de ses points correspondra à un autre point plus voisin de l'angle δ , et tellement situé que, si ces deux points existaient seuls, deux de leurs images n'en seraient plus qu'une, d'où il résulte que l'image

de la ligne elle-même formera une série d'images doubles ou qui se recouvriront mutuellement, excepté aux extrémités.

23. Le résultat de la cinquième observation est très-facile à concevoir, d'après le croquis que subissent dans le rhomboïde les rayons oa , &c. (Fig. 63), qui, après leur émergence, font voir à l'œil les deux images du point p sur les directions oa , &c. Car l'acte en étant celui qui regarde l'observateur, la carte qui s'avance de δ vers a doit intercepter d'abord le rayon incident po , auquel appartient le rayon émergent oa , qui produit l'image située du côté de l'observateur.

24. Les faits que présente la sixième observation n'ont pas besoin d'autre explication, puisqu'ils ne sont autre chose que les données qui ont servi à déterminer la loi physique du phénomène.

25. Le premier résultat de la septième observation est conforme aux lois ordinaires de la réfraction. Le second, dans lequel on voit l'image d'aberration sur la direction du rayon visuel ac (Fig. 55), qui alors est à peu près parallèle à l'arête ab , dépend de la loi particulière à laquelle ce rayon est soumis. J'ai trouvé, dans ce cas, pour l'angle ac , $75^{\circ} 38'$, tandis que l'angle aba n'est que de $71^{\circ} 33'$, ce qui fait une différence de $4^{\circ} 5'$.

Selon Huyghens, l'angle ac est de $75^{\circ} 20'$, et l'angle aba de $70^{\circ} 57'$, ce qui donne pour différence $4^{\circ} 23'$. Ce devant être le cas que la dif-

férence

Espace dont il s'agit, et que Bartholin croyoit nulle, n'est d'être nulle, pour épargner un travail superflu à ceux qui chercheroient la cause de la propriété du rayon extraordinaire, dans un pénétranda parallèle aux arêtes du rhomboïde (1).

36. Lorsque, dans la huitième observation, le rayon visuel, est perpendiculaire sur les faces opposées, *a'ac'b'* (fig. 27), et que le point visé est une *ss* direction, le rayon de lumière qui part de ce point ne pourroit se réfléchir dans l'intérieur du rhomboïde, qu'autant que sa partie d'observation se rejeteroit, de préférence, vers quelque'un des angles solides *e, c, g*. Mais la position de cette partie, la même relativement à ces trois angles, il en résulte pour elle une espèce d'équilibre, de manière qu'elle conserve sa route conjointement avec le rayon perpendiculaire, qui appartient à la réfraction ordinaire, et ainsi l'œil voit les deux images se confondre en une seule. Mais elles se séparent, dès que l'œil venant à s'écarter de la perpendiculaire, le rayon incident qui lui fait voir l'image d'aberration, est forcé de prendre, en traversant le rhomboïde, une position inclinée, qui le ramène plus près de l'un des angles *e, c, g* que des deux autres.

37. En rapprochant la neuvième observation du

(1) *Opera reliqua, t. II. Tractatus de lumine, cap. 6, § 2^e, 25*; et *Traité de la lumière, Leyde, 1730, p. 67*.

résumé des expériences de Newton , dans lesquelles ce célèbre géomètre faisoit passer un rayon de lumière successivement à travers deux rhomboïdes placés l'un derrière l'autre , on conçoit d'abord que quand les sections principales coïncident ou sont parallèles , on ne doit voir que deux images du point visible , puisque chaque des rayons qui a traversé le premier rhomboïde reste simple en pénétrant le second. Ces images seront plus distinctes qu'avec un seul des rhomboïdes , si les sections principales ont leurs arêtes latérales respectivement parallèles , comme cela est évident. Au contraire , elles se rapprocheront , si les sections principales sont placées en sens inverse l'une de l'autre , comme dans la fig. 58 , parce qu'alors les effets de la réfraction du rayon d'observation s'entre-détruisent plus ou moins , suivant que les hauteurs des rhomboïdes approchent plus ou moins d'être égales.

Si les sections principales sont perpendiculaires l'une sur l'autre , il n'y aura encore que deux images , puisque chaque rayon ne fait que changer de fonction , sans se décomposer , en passant d'un rhomboïde dans l'autre.

Mais si les sections principales sont dans quelque une des positions comprises entre le parallélisme et l'angle droit , l'œil doit voir alors quatre images , l'une produite par un rayon qui fait dans les deux rhomboïdes la fonction de rayon ordinaire ; une seconde , par un rayon qui fait dans

les deux rhomboïdes la fonction de rayon d'aberration; une troisième, par un rayon ordinaire à l'égard du premier rhomboïde, devenu rayon d'aberration dans l'autre rhomboïde; et une quatrième, par un rayon qui présente le cas inverse du précédent.

38. Quant à la cause physique d'où dépend le phénomène, Newton a fait sur cet objet une hypothèse qui parut singulière au premier abord, mais qui gagna à être examinée de près et comparée avec les faits observés. Au reste, il l'a placée dans ses questions d'optique, où il interroge continuellement son lecteur, et semble avoir pris à chaque fois du doute et de l'incertitude, pour nous conduire plus librement tous les aperçus qui s'offroient à son génie.

Newton supposait que les molécules de la lumière avoient deux espèces de pôles, sur lesquels la matière du spath d'Islande exerçait une action particulière, dont le centre étoit placé dans la région du petit angle solide. D'après cette idée, il considérait chaque rayon simple comme un prisme quadrangulaire infiniment délié, dans lequel tous les pôles dont nous venons de parler étoient rangés sur deux pans opposés, que nous appellerons pans d'aberration. Lorsque le rayon, en pénétrant le rhomboïde, par exemple, en allant de la base supérieure *adef* (fig. 65) vers l'inférieure *bcgh*, présentait l'un de ces mêmes pans à l'angle solide *P*,

la force dont il s'agit l'attiroit à elle, tandis que quand il présentait à l'angle à l'un des deux autres pans, que l'on peut appeler *pan de réfraction ordinaire*, la matière du rhomboïde n'exerçait sur lui d'attraction que celle qui lui éloit commune avec les milieux ordinaires.

Cela posé, parmi tous les rayons simples il en est formé un faisceau de lumières qui tombe sur la surface du rhomboïde, les uns subissent leurs pans de réfraction ordinaire et les autres leurs pans d'aberration tournés vers le petit angle solide. Le faisceau se divise donc en deux parties, dont l'une ne subit que la réfraction ordinaire, tandis que l'autre, attirée par la force qui réside dans le petit angle solide, sera soumise à la réfraction d'aberration.

Cette hypothèse acquiert un nouveau degré de vraisemblance, lorsqu'on l'applique au phénomène des quatre images produites par la superposition de deux rhomboïdes, et aux variations que subissent ces images dans leur intensité, à mesure que s'opère la révolution du rhomboïde supérieur. Ces effets indiquent que le faisceau d'aberration dans lequel tous les pans d'aberration étoient d'abord exactement tournés vers la région d'où découle la force qui agit sur eux, se dissolvent peu à peu, à mesure que, pendant la rotation du rhomboïde, cette région change de position; en sorte que les molécules échappent, les unes après les autres, à la force attractive, pour subir la réfraction ordinaire. Le

contraire arrive par rapport aux rayons de l'autre faisceau, qui avoient d'abord leurs plans d'obscuration à angle droit sur la région d'où émane la force qui produit l'absorption. Car ces plans se trouvent peu à peu dans une position plus favorable à l'égard de la force dont il s'agit, subissant son action les uns après les autres, et le faisceau finit par être tout entier dans le cas de l'absorption. On croit voir une affinité dont l'intensité augmente ou diminue, suivant que les corpuscules sur lesquels elle agit sont plus ou moins en prise à son action, de manière que le nombre des corpuscules attirés s'accroît ou diminue lui-même par des quantités proportionnelles.

39. Je terminerai cet article en observant que les faisceaux intérieurs du rhomboïde ont un pouvoir réfléchissant quelquefois très-sensible, en sorte qu'une portion des rayons qui leur parviennent obliquement, en partant d'un point visible situé derrière la base inférieure, étant repoussés de bas en haut, et repassant dans l'air, font voir à l'œil plusieurs images produites par réflexion, indépendamment de celles qui sont dues à la réfraction.

U T A C R A.

40. Les usages de la chaux carbonatée sont si connus, qu'il suffit de les exposer brièvement. Le plus étendu de tous et le plus intéressant, est

de servir à la construction des édifices , sous le nom de pierre à bâtir. Cette substance est susceptible d'une infinité de nuances, relativement à sa couleur et à sa solidité. On réserve celle qui est pleine , fine et facile à tailler , pour les ouvrages de sculpture. La pierre d'île de Rhé est recherchée comme très-propre à être employée pour les rampes, les chapiteaux , les colonnes , les chaudières , etc. C'est, en quelque sorte, le marbre de ceux qui se bornent à la propreté, sans prétendre à la magnificence.

41. La même substance, dépouillée, par l'action du feu, de son acide carbonique et réduite à l'état de chaux , est employée dans la composition du mortier qui contribue tant à la solidité des constructions. Les sables ou autres corps susceptibles, qui sont comme le fonde du mortier, étant insolubles dans l'eau , et incapables , par eux-mêmes, de contracter de l'adhérence , il est nécessaire que les molécules d'une substance soluble , telle que la chaux , agissant sur leurs grains par son affinité , serve à les lier, et forme avec eux une espèce de pâte qui prend peu à peu une forte consistance par le dessèchement.

42. A mesure que la chaux carbonatée ou cristallisation confuse devient plus dure et, pour ainsi dire , plus raffinée, elle approche aussi davantage d'être insensible au poli , et lorsque ce poli a une certaine viscosité , et qu'il fait ressortir des teintes agréables à l'œil , la substance prend le nom de marbre. Mais d'après ce que nous avons dit plus

tant, nous devons nous borner ici aux marbres qui sont dans un état voisin de celui de pureté. Tel est surtout le marbre blanc, appelé aussi *marbre statuaire*, parce qu'il est le seul que les sculpteurs emploient pour représenter les personnages célèbres dans l'histoire ou dans les fables. Le plus connu des marbres statuaire anciens, étoit celui de l'île de Paros. Chez les modernes, les marbres destinés au même usage, se tirent principalement des environs de Carrare, vers la côte de Gênes. Leur grain est plus fin que celui qu'on observe dans plusieurs fragments de statues antiques, et, par là même, ces marbres se prêtent davantage à la délicatesse et au fini du travail.

43. Le marbre blanc est du nombre des corps qui n'isolent qu'imparfaitement, et tiennent comme le milieu entre les corps conducteurs et les corps schodectriques. C'est sur cette propriété qu'est fondé l'usage du condensateur, imaginé par le célèbre Volta, pour rendre sensibles de très-petites quantités d'électricité, fournies par des corps environnans, en les déterminant à s'accumuler sur un disque de métal auquel un plateau de marbre blanc sert de support (1).

44. Il en est de l'application du mot d'*atmosphère*

(1) Voyez, pour plus ample explication, l'exposition raisonnée de la théorie de l'électricité et du magnétisme, d'après les principes d'Épinoë, p. 220, note a, et les leçons de Teyssie normale, t. VI, p. 88.

comme de celle du roc de marbre. Tout ce qui est pierre calcaire n'est point marbre, et tout ce qui a été stalactite n'est point albâtre. Il faut, pour cela, que la substance des concrétions soit susceptible, après le poli, de flatter l'œil par ses couleurs, dont les plus ordinaires sont le jaunâtre, le jaune de miel, le rouge et le brun. Elles sont distribuées par bandes ondulées, par couches concentriques ou par taches, en sorte que l'on a appliqué aux albâtres les dénominations de veine, d'œuf, de panaché, etc., dans le même sens qu'à certaines variétés de quartz-agathe. Le blanc s'y trouve aussi souvent seul; mais il est rare de rencontrer de l'albâtre entièrement de cette couleur, surtout si l'on entend par là le blanc de lait tirant sur celui du marbre. Le Cit. Dolomieu en a donné un morceau qu'il a trouvé à Orisk, près de Rome.

Cependant, c'est de l'opinion que l'albâtre étoit, en général, d'une couleur blanche, qu'est né l'usage si connu, blanc comme l'albâtre. Mais cette opinion avoit rapport à une autre substance qui a porté aussi le nom d'albâtre, qui est, pour l'ordinaire, d'un blanc de neige, et que l'on emploie aux mêmes usages que l'albâtre calcaire. La substance dont il s'agit est une variété de la chaux sulfatée, que nous ferons connoître en parlant de cette espèce de minéral.

L'albâtre diffère du marbre, non-seulement par la distribution des couleurs, mais aussi par une

meindre poreté, et en même temps par un certain degré de transparence qui provient de sa texture plus continue et plus uniforme. On a appelé *albâtre arabe*, celui qui avoit toute la perfection dont cette pierre est susceptible, relativement à la variété des zones qui le colorent, et à la netteté de son poli.

On trouve d'anciennes statues, dont la matière est l'albâtre. On employoit souvent cette substance pour faire des colonnes et des vases de différentes figures. Il y avoit de ces vases, dans lesquels on renfermoit des parfums, pour les conserver. On voit aussi, dans les cabinets d'antiques, des tables d'albâtre. Ces ouvrages sont quelquefois percés d'un trou provenant d'une stalactite factice, qui s'est trouvée comprise dans la masse. Les ouvriers avoient soin de reboucher ce trou avec un morceau du même albâtre.

45. Le felds de la scythie, connu sous le nom de *felds d'Espagne*, est une craye que l'on élève dans l'orient, et à laquelle on fait subir différentes préparations, avant de la séparer en pains, auxquels on donne d'abord la forme de parallélépipèdes tronqués sur leurs arêtes, et après le dessèchement, celle de cylindres à bases convexes. Les carriers se disposent de retourner les parallélépipèdes, comme on la paroit devoir être nécessaire, pour que la face qui étoit d'abord en dessous rebasse, comme les autres, l'action du dessèchement. Ils les placent sur des

modèles de creux, qui enlèvent, par imbibition, l'humidité de la face en contact avec eux, en même temps que l'évaporation agit sur les faces exposées à l'air.

 I^{re} ESPECE

CHAUX PHOSPHATÉE.

Phosphate calcique des chimistes. *Id.*, *Dauvenoten*, *ibid.*, p. 22. Anorthoste basaltine, *Sage*, *Éléments de minéralogie*, t. I, p. 231. *De Idée*, t. II, pag. 254. Chaux phosphorée, apatite, de *Born*, t. I, p. 363. Gemme apatit, *Swenckfj.*, t. I, p. 322. Chaux phosphorée, *Solign.*, t. I, p. 191. Calc. combined with the phosphoric acid, *Kirwan*, t. I, p. 128. Blatträger apatit, *Karsten*, *Mineral. tabellen*, p. 36. L'apatite commune, *Brochant*, t. I, p. 582. Cette synonymie se rapporte aux cinq principales variétés de formes cristallines.

Chrysolithe ordinaire ou proprement dite, de *Idée*, t. II, p. 271; excluez les synonymes cités par cet auteur. Chrysolithe, de *Born*, t. I, p. 68. H. E. u. 3. Spargel stein (piers d'asperge), *Swenckfj.*, t. III, p. 323. Asperagolithe d'*Abildgaard*. Muschelschier apatit, *Karsten*, *ibid.* La pierre d'asperge, *Brochant*, t. I, p. 586. Cette synonymie est relative aux variétés 6 et 7 de formes cristallines.

Erdiger apatit, *Königsberg, t. I, p. 508*. Gemmae apatit, *Karsten, ibid.* L'apatite terreuse, *Brachant, t. I, p. 584*. C'est notre variété terreuse, n°. 22.

Caract. caractérist. Soluble très-lentement et sans effervescence dans l'acide nitrique : divisible parallèlement aux pans et aux bases d'un prisme hexaèdre régulier.

Caract. phys. Pouss. spécif., 3,2583 — 3,2.

Durété. Non éraillante sous le briquet. Ne rayant point ou que légèrement le verre.

Réfraction, simple.

Phosphorescence. La poussière des cristaux, excepté les variétés 6 et 7, et celle des masses informes et terreuses, donne une lueur phosphorique, par l'inspection sur un charbon ardent. Cette dernière variété devient aussi luissante par la trituration, ou par le frottement de deux morceaux l'un contre l'autre, dans l'obscurité.

Caract. géom. Forme primitive. Le prisme hexaèdre régulier (fig. 66) *pl. XXX*. Les divisions parallèles aux pans sont les plus sensibles.

Molécule intégrante. Prisme triangulaire équilatéral (fig. 67) (1).

Caract. chim. Insoluble au chalumeau. Soluble lentement et sans effervescence dans l'acide nitrique. La variété terreuse y en excite quelquefois une légère.

(1) La hauteur *ad* du triangle de la base est l'arête du cube $\sqrt{3}$ à $\sqrt{2}$.

Analyse par Klaproth, de la variété nommée *apellite*.

Chaux.....	55.
Acide phosphorique.....	45.
	<hr/>
	100.

Analyse par Vanquelin, de la variété nommée *chrysolithe*.

Chaux.....	54,28.
Acide phosphorique.....	45,72.
	<hr/>
	100,00.

Analyse par les Chèvres Bertrand, Pelletier et Donadai, de la variété terreuse de l'Estramadure.

Chaux.....	59,0.
Acide carbonique.....	1,0.
Acide phosphorique.....	34,0.
Acide muriatique.....	4,5.
Acide fluoïque.....	1,5.
Silice.....	2,0.
Far.....	1,0.
	<hr/>
	100,0.

Caract. distinctifs. 1°. Entre la chaux phosphatée primitive et l'émeraude. Celle-ci émaille sous le briquet et raye le quartz, ce que l'autre ne fait jamais. Sa pesanteur spécifique est moindre, dans le rapport d'environ 9 à 10. Sa poussière n'est point phosphorescente par le feu,

comme celle de la chaux phosphatée. 2^e. Entre la chaux phosphatée en cristaux indéterminables et les autres pierres nommées gemmes, qui offrent quelquefois des couleurs analogues à la sienne, telles que la cynophane, la tourmaline, la topaze et l'émeraude, dite béryl; celles-ci effleurissent toutes par le choc, du briquet et repunt le quartz. Il est rare que la chaux phosphatée raze le verre, et elle ne le fait que légèrement. Le tourmalin a de plus la propriété de s'électriser par la chaleur. 3^e. Entre la chaux phosphatée grossière et la chaux carbonatée, dite pierre calcaire. La première fait une effervescence peu sensible, et l'autre une très-marquée avec l'acide nitrique. En poussière donne une très-belle phosphorescence par le feu, et qui n'a pas lieu pour la chaux carbonatée.

V A R I É T É S.

F O R M E S.

Déterminables.

1. Chaux phosphatée primitive MP (Fig. 65).
Prisme hexaédre régulier.

2. Chaux phosphatée péridodécédre. $\begin{matrix} M & G & P \\ & M & e & P \end{matrix}$

(Fig. 66). Incidence de e sur M , 150° . Les pans e sont souvent striés longitudinalement, par l'effet du décroissement qui les a produits.

3. Chaux phosphatée *annulaire*. $\frac{M \hat{A} \hat{B} P}{M, r, P}$ (fig. 69).

Incidence de r sur M , $112^{\circ} 12' 58''$, et sur P , $137^{\circ} 47' 32''$.

4. Chaux phosphatée *émarginée*. $\frac{M \hat{A} \hat{B} P}{M, s, r, P}$ (fig. 70).

C'est la réunion des seconde et troisième variétés.

5. Chaux phosphatée *antélinéaire*. $\frac{M \hat{A} \hat{B} P}{M, r, r, P}$ (fig. 71).

La variété annulaire augmentée à chaque sommet de six facettes qui naissent sur les angles solides de la forme primitive. Incidence de r sur P , $123^{\circ} 12' 32''$.

6. Chaux phosphatée *pyramidale*. $\frac{M \hat{B}}{M, s}$ (fig. 72).

Incidence de s sur M , $129^{\circ} 17' 53''$; de s sur x , $143^{\circ} 7' 48''$.

a. *Conciforme*. Ayant une arête à la place de l'angle solide terminal.

7. Chaux phosphatée *diédricale*. $\frac{M \hat{G} \hat{B}}{M, s, x}$

(fig. 73). Donne pour un prisme, et donne lieu pour l'ensemble des deux pyramides.

Indéterminables.

Tiers lamellaire.

8. Chaux phosphatée massive *lamellaire*.

9. Chaux phosphatée *granuliforme*.

Tous non lamellaires.

10. Chaux phosphatée terreuse. Couleur blanchâtre, diversifiée à certains endroits par des taches, ou par des zones jaunâtres ou rougeâtres. Crista fin et serré. Surface mamelonnée sur certains morceaux.

ACCIDENS DE LUMIÈRE.

Couleurs.

1. Chaux phosphatée *limpide*. Quelques cristaux des cinq précédentes variétés.

2. Chaux phosphatée *violettes*. *Id.*

3. Chaux phosphatée *verdâtre*. *Id.*

4. Chaux phosphatée *jaune-verdâtre*. Une grande partie des cristaux des sixième et septième variétés.

5. Chaux phosphatée *orangée*. Plusieurs cristaux des mêmes variétés.

6. Chaux phosphatée *bleu-verdâtre*. Quelques cristaux de la sixième variété.

7. Chaux phosphatée *brunâtre*. *Id.*

Transparences.

1. Chaux phosphatée *transparente*. La plupart des cristaux des sixième et septième variétés, et plusieurs de ceux des précédentes.

2. Chaux phosphatée *translucide*.

3. Chaux phosphatée apaque. La variété *irregulière*.

D E S C R I P T I O N .

1. La chaux phosphatée, connue d'abord sous le nom d'*apélite*, se trouve en Saxe et en Bohême, où elle accompagne les mines d'étain. J'en ai un groupe, qui est entremêlé de fer arsenical en masses, et de cristaux de quartz, de chaux fluatée et de baryte sulfatée. Les cinq premières variétés de formes cristallines se rapportent à ces deux localités. Les prismes sont ordinairement courts à proportion de leur largeur. Le plus volumineux que j'ai vu avoit 2 centimètres ou environ 8 lignes $\frac{1}{2}$ de largeur, sur 8 millimètres ou 3 lignes $\frac{1}{2}$ de hauteur.

Les cristaux, nommés en France *chrysolite*, ont été trouvés par le Cit. Lecoq, en Espagne, au Mont Capera, près du cap de Gaire, dans le royaume de Murcie. Leur gangue est une pierre blanche ou jaunâtre, qui paroit corallée, et que plusieurs minéralogistes Français ont regardée comme une lave. Ils sont quelquefois accompagnés de fer oligiste lamellaire. Leur cristallisation est celle des variétés 6 et 7. J'en ai observé un qui avoit deux centimètres de longueur entre les deux sommets de ses pyramides. Mais la plupart sont sensiblement plus petits. Leur surface a communément beaucoup d'éclat.

Les cristaux orangés proviennent du même endroit.

droit. On seroit tenté de les confondre, au premier coup d'œil, avec la variété de quartz, nommée *égyptienne* de Gaspardelle, dont la différence d'ailleurs très-sensiblement, par leur structure et par la mesure de leurs angles.

Le roche tertiaire d'Arendal, en Norwége, offre des cristaux pyramidaux de la même substance, qui sont d'un blanc-verdâtre, et quelquefois d'une couleur brune. J'en ai de ces deux teintes, qui se sont été donnés, les uns par M. Abildgaard, les autres par M. Marthey. Brevement leur pyramide est nettement prononcée. Leur structure s'accorde avec celle des autres variétés, et le Cit. Vanquelin, d'après une expérience, les a reconnus pour appartenir à cette espèce. On les trouve dans la mine de Marboé.

Les gangues de ces cristaux, lesquelles sont composées d'amphibole très-ferrugineux, de chaux carbonatée, etc., ressemblent aussi de la chaux phosphatée amorphe en masse ou en grains lamelleux.

A l'égard de la variété terreuse, elle se trouve en Espagne, dans l'Estramadure, où elle forme des collines entières. Elle y est déposée par couches entrecoupées de quartz. Elle a commencement de la ressemblance, par son aspect, avec certaines pierres calcaires à grain fin. Quelques morceaux présentent des indices de lames. On voit, par

Fourneau de Bowles, sur l'histoire naturelle d'Espagne, qu'elle a été connue de ce savant (1).

2. L'histoire de la chaux phosphatée offre un exemple remarquable des progrès qu'a faits la minéralogie, depuis que l'on a commencé à chercher dans la composition même des substances, et dans leurs caractères les plus constants, les principes de la méthode relative à leur classification. Les cristaux en prismes hexaèdres réguliers ayant été regardés, par Romé de Lisle, comme une variété de l'émeraude, et ceux qui sont pyramidés, comme une graine particulière, que ce savant nomma *chrysothèse granulée* dans la première édition de sa *Cristallographie*, et *chrysothèse ordinaire* dans la seconde. L'éclat extérieur de ces cristaux, dont quelques-uns jouissent d'une belle transparence, leur couleur assez agréable, quoique d'un fin ou pâle lilas, leur forme pyramidale ressemblent tout un petit volume, tout paroît annoncer à l'œil une véritable gemme, c'est-à-dire, une de ces productions propres à être travaillées en ornemens, par le travail de l'art (2). Et il paroit même que c'est pour être jugé très prétendue gemme d'après les épreuves faites sur des morceaux taillés; que la ressemblance de celui-ci

(1) *Idem* de Paris, 1786, p. 8p.

(2) Le Cit. Bowles le nomme *chrysothèse des joailliers*; *Idem* *opusc.*, N°. 151.

faisoit confondre avec elle, qu'on lui a attribué une pesanteur spécifique différente de la sienne, une dureté beaucoup plus grande et une double réfraction.

Quant à la variété infusible qui se trouve dans l'Estomacure, sa phosphorescence l'avoit fait prendre pour un fluide calcareux.

3. Klaproth découvrit, en 1788, la vraie nature de la chaux phosphatée en prismes hexaèdres (1). Proust reconnut les mêmes principes dans celle de l'Estomacure (2), et l'analyse en fut répétée, avec une plus grande précision, par les citoyens Bertrond, Pelletier et Donadei (3).

4. La variété nommée *alépyadite* est restée beaucoup plus long-temps hors de sa vraie place. Elle y a été enfin ramené par le citoyen Vauquelin (4), qui y a trouvé la chaux et l'acide phosphorique combinés, dans un rapport sensiblement égal à celui que Klaproth avoit déterminé pour la première variété.

5. La théorie des lois de la structure avoit devancé tacitement cette découverte. Le travail du citoyen Vauquelin n'ayant donné occasion de

(1) Journ. de phys., mars, 1788, p. 242.

(2) *Ibid.*, avril, p. 313.

(3) *Annales de chimie*, 1792, p. 79.

(4) *Bulletin de la société philosophique*, Brissot, n. 6 de la 24^e, p. 69.

comparer les molécules intégrantes des deux substances, déjà déterminées depuis long-temps, je trouvais que j'avois été conduit par le calcul à la même forme et précisément aux mêmes dimensions (1). Seulement la distance de plusieurs années entre les époques auxquelles ces résultats ont été calculés, m'avoit empêché d'apercevoir le lien qui les unit, et d'en déduire les conséquences qui se présentent naturellement. Et peut-être même y a-t-il quelque chose de plus favorable dans cette coïncidence parfaite de deux résultats pris indépendamment l'un de l'autre, et qui ne laissent aucun lieu au soupçon d'avoir négligé, pour les faire cadrer ensemble, les petites différences que peut donner l'observation, et qu'on se permet

(1) Voyez le *Journal des mines*, N°. 35, p. 682. Quelques auteurs ont supposé que Yanquellin, en faisant l'analyse de la substance dont il s'agit, avoit eu intention d'en comparer la composition avec celle de la pierre nommée *adryaïs* par les allemands. La vérité est que ce savant profita de ce que le conseil des mines venoit de recevoir une certaine quantité de ces cristaux qu'on appeloit les *adryaïs*, dont on lui rendit une partie, pour les analyser, et il s'est dit entre lui, dans cette opération, que de déterminer la nature d'une substance dont les principes composans sont déjâ connus il avoit analysé, quel-que temps auparavant, nous le savons, et Delonville avoit prouvé que ce minéral étoit la chaux des allemands. Voyez l'article *pyrites*.

quelquefois trop facilement de mettre sur son compte.

J'ajouterais que les variétés connues des mêmes substances ne se ressemblent que par la forme de leur prisme hexaèdre, qui leur est commune avec un grand nombre d'autres minéraux. Les cristaux diffèrent très-sensiblement de part et d'autre, par le nombre et par l'inclinaison de leurs facettes, en sorte qu'on ne saurait pas tenté de rapprocher ces deux substances, en se bornant à la configuration extérieure des cristaux.

6. Le peu de dureté de la chrysoïte, et la difficulté de la briller, m'avoit aussi fait reconnaître, avant que la chimie l'eût fait passer dans la classe des substances acides, qu'elle devoit au moins être effacée de la liste des gemmes (1). Elle est si tendre et si rebelle au poli, qu'on peut assurer, ce me semble, qu'elle ne s'est jamais rencontrée dans le commerce, parmi les pierres taillées qui portent le nom de chrysothère.

7. Je n'ai point trouvé que le poudre de cette substance fût phosphorescente, comme celle des autres variétés. Mais c'est ici un des caractères qui dépendent d'une cause accidentelle, puisque la combinaison artificielle de la chaux et de l'acide phosphorique en est dépourvue (2). Cette pro-

(1) *Journal des mines*, N°. 28, p. 302.

(2) *Annales de chimie*, 1780, p. 35.

poix⁽¹⁾ est surtout très-sensible dans le chaux phosphatée grossière, jetée en poudre sur un charbon ardent. La fumée qu'elle donne est plus vive et moins fugitive que celle de la chaux fluatée : c'est une des expériences qui font spectacle.

8. L'endroit de la province de l'Extremadure où cette même substance abonde, est aux environs du village de Logroño, dans la juridiction de Trucillo. Elle y est employée pour la construction des maisons et des murailles d'enclos (2).

9. Le citoyen Seneque, digne fils du célèbre naturaliste de ce nom, ayant décomposé, à un violent feu de fusion, la chaux sulfatée, par l'acide phosphorique concret, a obtenu de la chaux phosphatée artificielle, en masses lamellaires grâs-sières, et lui a reconnu la propriété de s'électriser, à l'aide de la chaleur, en deux points opposés, dont l'un manifeste l'électricité vitrée, et l'autre la résineuse; découverte d'autant plus intéressante, que c'est ici le premier exemple d'une substance produite par l'art, qui jouisse de cette propriété (3).

Cette chaux phosphatée diffère, en ce point, de celle de la nature, que j'ai tout simplement d'électriser, par le même moyen (3). Le citoyen

(1) *Journ. de phys.*, avril, 1788, p. 245.

(2) *Extrait d'un mémoire lu à la société philomathique, le 25 juillet, an 8.*

(3) La substance dont il s'agit étant le produit d'une

Sensure a observé aussi qu'elle devenoit lumineuse dans l'obscurité, lorsqu'on la pressoit avec le bout d'une plume, en quoi elle se rapproche de la chaux phosphatée terreuse de l'Estramadure. Mais en poussière, prise sur des charbons ardens, n'est pas phosphorescente, non plus que celle des produits artificiels du même genre obtenus par d'autres chimistes.

III. ESPECES

CHAUX FLUATÉE.

Fluor de chaux des chimistes.

Fluor minéral, *Waller*, t. I, p. 178. Spath fluo-
sile ou vitreux, dit aussi spath phosphorique et
fluor spathique, de *Linde*, t. II, p. 1. Chaux fluorée,
de *Born*, t. I, p. 355. Chaux fluorée, fluor minéral,
Sciogr., t. I, p. 106. Fluor, *Konwings*, t. I,
p. 515. Spath. fluor, *Daubenton*, tabl., p. 19. Calc
combined with the sparry acid., *Kirwan*, t. I,
p. 124. Le fluor, *Brochant*, t. I, p. 598.

Caractère caractérist. Insoluble dans l'eau ; divisible
en octaèdre régulier.

Caract. phys. Pes. spécul. 3,0343. . . 3,5911.

Vérification, et en habileté en chimistes pourraient indi-
quer un excès d'acide phosphorique, il est possible qu'elle
ait acquis des qualités physiques qui manquent à la chaux
phosphatée naturelle.

Durci. Rayant la chaux carbonatée.

Réfraction, simple.

Phosphorescence. Sa poussière, jetée sur un charbon ardent, répand une lueur ordinairement blanchâtre ou verdâtre. Deux morceaux frottés l'un contre l'autre brillent dans l'obscurité.

Car. géom. Forme primitive. L'octaèdre régulier. On l'obtient facilement par la division mécanique. Molécule intégrante. Le tétraèdre régulier.

Caract. chim. Fusible au chalumeau en verre transparent.

Décristallisation sur un charbon animal.

Caract. distinct. Entre la chaux fluatée et 1^{re}, la chaux carbonatée ; celle-ci est rayée par l'autre. Les angles plans de ses lames sont de $101^{\circ} \frac{1}{2}$ et $98^{\circ} \frac{1}{2}$, au lieu de 120° et 60° . Sa réfraction est double, celle de la chaux fluatée est simple. Enfin la chaux carbonatée fait effervescence avec l'acide nitrique, ce qui n'a point lieu pour la chaux fluatée, 2^o. La baryte sulfatée ; celle-ci a une pesanteur spécifique plus grande dans le rapport d'environ 4 à 3 ; sa division mécanique donne des angles solides composés de 3 plans, dont deux sont perpendiculaires sur le troisième. Dans la chaux fluatée, tous les plans sont inclinés entre eux. 3^o. La chaux sulfatée ; celle-ci est rayée par la chaux fluatée ; les angles plans de ses lames sont de 113° et 67° , au lieu de 120° et 60° . Elle s'effolfe et blanchit par l'action du feu ; la chaux fluatée y décristallise, et se disperse en petits éclats.

VARIÉTÉS

FORMES.

Déterminables.

1. *Chaux fluorée primitive* P (fig. 74) pl. XXXI. De *Edsle*, t. II, p. 15; après IL. Incidence de deux faces voisines quelconques l'une sur l'autre, $109^{\circ} 28' 15''$.

a. *Cubiforme*. En octaèdre, dont les sommets sont en arêtes, au lieu d'être de simples points.

C'est ici le lieu d'éclaircir une difficulté que présentent, relativement à leur structure, toutes les substances minérales qui ont un octaèdre pour forme primitive. Ce que nous dirons ici de l'octaèdre régulier s'applique à tous les autres solides du même genre.

Soit *bp* (fig. 75) l'octaèdre dont il s'agit. Si l'on se borne à le subdiviser de la manière la plus simple, à l'aide de vingt-quatre plans qui passent par les milieux *A*, *i*, *l*, *t*, *r*, etc., de ses arêtes et en même temps par le centre, la division donnera six octaèdres partiels et huit tétraèdres. La pyramide *abce* représente la moitié extérieure d'un des octaèdres partiels, d'où l'on voit que dans chacun de ces octaèdres, un des angles solides *a* se confond avec un de ceux de l'octaèdre total, et l'angle solide opposé coïncide avec le centre.

— D'une autre part, le triangle équilatéral *AG* re-

présente une des faces d'un des tétraèdres partiels , d'où l'on voit que chacun de ces tétraèdres n'a que cette seule face située à l'extérieur, les trois autres étant engagées dans le solide, où elles se réunissent en un point commun qui se confond avec le centre.

Chaque octaèdre partiel subdivisé à son tour par les milieux de ses arêtes, se résout en six octaèdres et huit tétraèdres, et chaque tétraèdre en quatre tétraèdres et un octaèdre. On concevrait ce second résultat, si l'on considère que les coupes faites parallèlement aux quatre faces du tétraèdre, en passant par les milieux des arêtes, interceptent les quatre angles solides, d'où il résulte qu'elles détachent quatre tétraèdres. Mais, de plus elles mettent à découvert quatre triangles équilatéraux, lesquels, joints à ceux qui sont les restes des faces du tétraèdre total, donnent la surface d'un octaèdre.

De quelque manière que l'on s'y prenne pour subdiviser un octaèdre, on sera toujours en moins des solides de deux formes, sans jamais pouvoir réduire à l'unité le résultat de la division.

Soit maintenant en (fig. 76) un rhomboïde aghi ayant ses angles du sommet de 60° . Supposons que l'on fasse dans ce rhomboïde deux coupes qui passent par les diagonales horizontales bg , be , ge , et df , gf , df ; il est facile de voir que ces coupes détacheraient deux tétraèdres réguliers beg , dge , et que la partie qui restera entre ces tétraèdres sera un oc-

taïdre semblable en tout à celui de la fig. 75 (1).

Concluons de là qu'un octaèdre régulier peut être considéré comme le résidu d'un rhomboïde aigu de 60° , dont on aurait séparé deux tétraèdres réguliers. Réciproquement, on pourra faire passer la forme d'un octaèdre régulier à celle du rhomboïde aigu de 60° , en ajoutant au premier deux tétraèdres réguliers placés sur deux quelconques de ses faces opposées. La fig. 77 représente le rhomboïde provenant de l'addition des tétraèdres sur les faces gff' , hhe' ; dans la fig. 78 les tétraèdres additionnels reposent sur les faces gpf , beh' ; et dans la fig. 79, ils reposent sur les faces ghf' , dcp .

Supposons que le rhomboïde soit coupé par une infinité de plans parallèles les uns aux faces de ce rhomboïde, et les autres aux triangles deg , eff' (fig. 76) chacun des petits rhomboïdes qui résulteraient des premières coupes, si elles existaient seules, sera absorbé, à l'aide des secondes, en un octaèdre régulier plus deux tétraèdres; et il est visible que ces différentes coupes produiront le même effet relativement à l'octaèdre hp , que dans l'hypothèse précédente, où nous avons considéré cet octaèdre comme subissant des divisions et subdivisions

(1) Cet octaèdre, par une suite de la manière dont il a été prouvé, se trouve les touraî, de manière que deux de ses faces opposées, savoir deg et eff' , ont des positions harmoniques.

successives, dont chacune donnerait un certain nombre d'octaèdres et de tétraèdres toujours plus petits.

Il suit de là que les tétraèdres renfermés dans cet octaèdre composent, avec les octaèdres partiels, des rhomboïdes dans tous les sens, ou, ce qui revient au même, que chaque octaèdre est enveloppé par huit tétraèdres. Réciproquement, chaque tétraèdre étant adjacent par une de ses faces à un octaèdre, est enveloppé par quatre tétraèdres.

Or, les molécules intégrantes d'un cristal étant nécessairement similaires, il m'a paru vraisemblable que la structure étoit ici comme celle d'une multitude de vases occupés soit par l'eau de cristallisation, soit par quelques autres substances; en sorte que s'il nous étoit donné de pousser la division jusqu'à sa limite, l'une des deux espèces de solides dont il s'agit disparaîtroit, et tout le cristal se trouveroit seulement composé de molécules de l'autre forme.

Pour mieux faire concevoir comment l'octaèdre, quoiqu'uniquement composé d'une seule espèce de solides élémentaires, peut donner, à l'aide de la division mécanique, des solides fins de trois formes différentes, je vais employer une comparaison tirée d'une figure plane. Soit *ahcfig* (fig. 80) un hexagone régulier, composé d'un nombre presque infini d'hexagones pareillement réguliers d'une extrême petitesse, entourés de triangles équilatéraux; il est visible qu'en divisant l'hexagone total parallèlement à tous ses côtés, on seulement à quelques-

uns, on pourra obtenir, à volonté, soit d'autres hexagones plus petits, tels que *amp*, soit des triangles équilatéraux, tels que *bea*, soit enfin des rhombes, tels que *beaf*, de manière que chacune de ces figures sera elle-même un assemblage d'hexagones et de triangles. Il est clair encore qu'en ajoutant à l'hexagone sur deux quelconques de ses côtés opposés, deux triangles équilatéraux *ayb*, *daf*, que l'on doit concevoir comme étant eux-mêmes des assemblages d'hexagones et de triangles, on aura un rhombe *cagy* tout composé de figures de l'une et l'autre espèce.

Imaginons maintenant que les triangles deviennent nuls, et laissent des vides aux places qu'ils occupoient. Les mêmes divisions seront toujours les mêmes, et les figures qui en résultent s'offriront encore à l'œil sous le même aspect, parce que les vides sont imperceptibles. Il en faut dire autant de l'hypothèse dans laquelle ce serait, au contraire, les hexagones qui s'évanouiroient. Or, les petits hexagones placés dans le grand, répondent aux petits octaèdres, les triangles équilatéraux aux tétraèdres, et les rhombes aux rhomboïdes. Il y a cependant cette différence, que l'on peut se représenter chaque hexagone comme un assemblage soit de six triangles équilatéraux, soit de trois rhombes, sans aucun vide, au lieu que la structure de l'octaèdre ne peut être ramené, même par la pensée, à l'unité de figure, sans supposer des vides dans

son intérieur. Mais c'est ici un de ces exemples qu'il ne faut pas pousser à la rigueur, et qu'on ne propose que pour aider l'intelligence, en parlant aux yeux.

Chaque octaèdre étant, comme nous l'avons vu, enveloppé par huit tétraèdres, et chaque tétraèdre par quatre octaèdres, quelle que soit celle des deux formes que l'on suppose, les solides qui resteront se joindront exactement par leurs bords, en sorte qu'à cet égard il y aura continuité et uniformité dans toute l'étendue de la masse.

Or, comme dans toutes les autres espèces de minéraux, dont la structure ne laisse aucune équivoque sur la forme de la molécule intégrante, cette forme est toujours ou le parallépipède, ou le prisme triangulaire, ou le tétraèdre; si dans les cas douteux, semblables à celui-ci, on adopte le tétraèdre, toutes les formes de molécules se trouveront réduites aux trois qui sont les plus simples que l'on puisse concevoir, et qui paroît fournir une raison de préférence en faveur du tétraèdre.

J'observe ici, à ce sujet, que l'on ne peut employer autrement des tétraèdres réguliers, qu'en les réunissant par leurs bords, comme il vient d'être dit, pour qu'il résulte de leur ensemble un corps qui soit lui-même régulier, en sorte que se refusant à l'hypothèse que je propose, on seroit enchaîné des résultats de la cristallisation une forme qui, par sa grande simplicité, semble y réclamer une place.

Mais le point essentiel est que les deux formes étant tellement assorties entre elles, dans l'intérieur du cristal, qu'elles composent de petits rhomboïdes, les lames de superposition appliquées sur le noyau, dans les formes secondaires, décroissent par des sauts d'un ou plusieurs rangs de ces rhomboïdes, en sorte que la molécule constructive conserve l'analogie des autres cristallisations, et que le fonds de la théorie subsiste, indépendamment du choix que l'on pourroit faire entre l'une ou l'autre des formes que l'on obtient par la division mécanique (voyez t. I, p. 55).

2. Crux fluide cubique. $\begin{matrix} A & A' \\ & \diagdown \quad \diagup \\ & C \end{matrix}$ (fig. 81). De *Idole*, t. II, p. 7; esp. 1^{re}.

On voit (fig. 81) le noyau octaédre renfermé dans le cube, et dont les angles solides i, i' , coïncident avec les milieux des faces du cube. On y voit aussi le rhomboïde que l'on peut extraire par des coupes qui partent de deux angles solides opposés f, f' du cube, et qui passent par les diagonales contiguës à ces angles. Le rhomboïde dont il s'agit est composé de l'octaédre, et des deux tétraèdres appliqués sur les deux faces du même octaédre, qui sont tournées vers les angles f, f' .

3. Crux fluide dodécédre. $\begin{matrix} B & B' \\ & \diagdown \quad \diagup \\ & C \end{matrix}$ (fig. 82)
pl. XXXII. En dodécédre rhomboïdal. Incidence

de deux faces voisines quelconques l'une sur l'autre, 120° .

Le décroissement fait naître sur chaque face AAA du noyau (fig. 74) une pyramide triangulaire, dont la base est indiquée par abc (fig. 83), et qui a son sommet en z. On a donc huit pyramides, et par conséquent vingt-quatre triangles isocèles, qui, étant deux à deux sur un même plan, donnent douze rhombes.

4. Chaux fluatée cubo-octaédre. $\begin{matrix} P & A & A' \\ & \nearrow & \nwarrow \\ P & & P \end{matrix}$ (fig. 84).

De Lisle, t. II, p. 14; var. 2. Incidence de z sur P, $125^\circ 15' 52''$.

Si les faces P ne parvenaient pas à se toucher, auquel cas elles conserveraient la figure triangulaire, les faces z seraient des octogones au lieu de carrés.

Si les faces P s'entrecoupent, elles se changeraient en hexagones, dont tous les angles seraient de 120° , tandis que les faces z seraient toujours des carrés.

Les cubes de chaux fluatée ont quelquefois, aux endroits de leurs angles solides, des facettes accidentelles, qui produisent des facettes parallèles aux faces du noyau, et situées comme P, P. Mais il est facile de les distinguer à leur poli, de celles qui sont le résultat immédiat de la cristallisation.

5. Chaux fluatée émarginée. $\begin{matrix} PAB \\ P' & \end{matrix}$ (fig. 85). De

Lisle,

Lisle, t. II, p. 13; var. 4. Incidence de s sur P, $144^{\circ} 44' 8''$.

J'ai dit (t. I, p. 35) que dans le cas où la forme primitive et celle des molécules intégrantes différaient du parallépipède, non-seulement les décroissemens se faisoient par des constructions de petits groupes de molécules équivalens à des parallépipèdes, mais que l'on pouvoit même substituer un noyau de cette dernière forme au véritable noyau. J'en citerai un exemple, à l'occasion de la variété dont il s'agit ici. Soit *Ac* (fig. 90) le noyau fictif semblable au rhomboïde de la fig. 76. Si l'on suppose un cristal secondaire dérivé de ce noyau, qui ait pour signe représentatif FAAD , il sera semblable à la chaux fluatée émeraillée. Les faces P, A, répondent aux faces P, P (fig. 85), et les faces A, D, répondent aux facettes s , s .

6. Chaux fluatée cubo-dodécédre. $\begin{matrix} A & A' & EB \\ i & i & s \end{matrix}$
(fig. 86). De *Lisle*, t. II, p. 14; var. 2. Incidence de s sur i , 133° .

7. Chaux fluatée doédre. $\begin{matrix} A & A' \\ i & i \end{matrix} \left(\begin{matrix} \frac{1}{2} \\ AB'B \\ x \end{matrix} \right)$ (1).

(1) Les lettres renfermées dans la parenthèse se rapportent à l'angle solide situé au devant, qui a la même position que s (fig. 86).

(fig. 87). Le cube avec vingt-quatre arêtes géométriques qui semblent former une bordure autour de chaque carré. De *États*, t. II, p. 15. Incidence de x sur a , $125^{\circ} 55' 40''$; et sur i , $151^{\circ} 34' 55''$.

On saisira plus aisément la structure de cette variété, en la comparant avec celle de la précédente. Dans celle-ci, les faces a , a (fig. 86) sont produites par des décroissements qui agissent parallèlement aux bords B , B (fig. 74) du noyau, de manière que si l'on menait sur la face a décrite en avant (fig. 86), une ligne qui passât par les angles a , i , le milieu de cette ligne répondrait au milieu x d'une des arêtes cd (fig. 88) du noyau (1), laquelle serait coupée à angle droit par la ligne dont il s'agit. Concevons maintenant que le décroissement devienne intermédiaire, et que les bords des lames de superposition, au lieu d'être parallèles aux arêtes cd , cd , etc., s'inclinent à leur égard, en prenant successivement des positions analogues aux lignes ru , rv , gh , gf , etc. La géométrie fait voir que, dans ce cas, les deux faces produites l'une par la série des bords alignés comme ru , rv , l'autre par celle des bords qui répondent à ru , rv , seront toujours sur un même

(1) Cette ligne représente le noyau dont chaque face a été considérée en une multitude de triangles; parmi lesquels les uns sont des hexaèdres, et les autres des faces de tétraèdre.

plus parallèle à celui du triangle pqr ; de même il se formera vers l'angle r deux faces situées sur un seul plan parallèle à celui du triangle lep . Or, à un certain terme, les faces pqr , lep s'entre-croiseront sur une ligne qui aura la même position que celle qui seroit menée de n en t (fig. 86). Il en résulte qu'en lieu d'une seule face r , on en aura deux désignées par x , x' (fig. 87), qui produiront le même effet que si les deux moitiés de la face r (fig. 86), dont l'une est située à droite et l'autre à gauche, de la ligne menée de n en t , au lieu de venir de niveau, s'étoient inclinées l'une sur l'autre, ainsi qu'on le voit fig. 87.

4. Chaux fluatée *hemimorpha*. $\left(\frac{1}{2}AB'B'\right)$ (fig.

83). La var. précédente, dans laquelle les décroissemens ayant atteint leur limite, produisent six pyramides appliquées sur les faces du cube. De Bern., *cartel.*, t. I, p. 363. VI. B. n. 17, et Pl. I, fig. 1. Incidence de n sur x , $126^{\circ} 56' 8''$; de x sur x' , $154^{\circ} 9' 16''$. La théorie fait voir que, dans l'hypothèse d'un noyau cubique, le décroissement d'où naissent les pyramides seroit beaucoup plus simple, et auroit lieu par trois rangées sur toutes les arêtes du cube. On voit dans la collection du Cit. Lefebvre, conseiller des mines, un très-bel échantillon de cette variété.

— C'est à une loi du même genre, mais beaucoup

plus rapide dans sa marche, et qu'il seroit très-difficile de soumettre au calcul, qu'est due la forme de certains cristaux que l'on prendroit d'abord pour des cubes, mais qui, vue de près, se présentent comme des polyèdres à vingt-quatre faces triangulaires isocèles, très-peu inclinées sur les faces du cube, en sorte qu'il en résulte six pyramides extrêmement cathédrales.

9. Chaux fluaté *triforme*. $\frac{PBB'A'A'}{P'o'r}$ (fig. 162)

pl. XXXIX. Dérivée de la forme primitive par les facettes P , du dodécaèdre rhomboïdal par les facettes o , et du cube par les facettes r .

10. Chaux fluaté *spéculéide*. En octaèdres, composés de lames carrilignes, ce qui donne aux lacs une forme bombée. C'est comme le passage de la cristallisation régulière à la coaction. Cette variété a été trouvée par le Cit. Champoux, dans les environs d'Antun, département de Saône et Loire.

Indéterminables.

11. Chaux fluaté *concordionné*. Formée par bandes ou par zones, comme les albâtres calcars.

12. Chaux fluaté *amorphe*. Elle présente communément un assemblage confus de fragmens, qui semblent être incorporés dans des couches de la même substance, souvent avec mélange de ma-

êtres hétérogènes, telles que le quartz, la berylle unilobée, etc.

ACCIDENTS DE LUMIÈRE.

Coloration.

1. Chaux fluatée blanchâtre. Elle se rencontre surtout parmi les cristaux cabochons.

2. Chaux fluatée rouge. Faux rubis helvé.

3. Chaux fluatée violette. Faux améthyste.

4. Chaux fluatée verte. Faux émeraude; faux émeraude. Les octaèdres de la même couleur ont été appelés *émeraudes marillères*, *émeraudes de Carthagine*, *sigets-carles*.

5. Chaux fluatée bleue. Faux saphir.

6. Chaux fluatée jaune. Faux topaze.

7. Chaux fluatée violet-noirâtre. En octaèdres réguliers.

Transparence.

1. Chaux fluatée transparente.

2. Chaux fluatée translucide. La plupart des cristaux colorés.

3. Chaux fluatée opaque.

APPENDICE.

Chaux fluatée aluminifère. En cubes isolés, très-réguliers, d'un gris sale, ayant un aspect terne.

1. La chaux fluatée est commune dans une multitude d'endroits, particulièrement dans le Derbyshire, en Angleterre; dans les mines de Saxe, dans la ci-devant Auvergne, etc. Les cristaux cubiques sont les plus ordinaires. On en trouve d'octaédres, d'un rouge couleur de rose, à Chamonxi, en Savoie. La variété 3, en dodécaèdres rhomboïdaux, qui est très-rare, a été découverte, il y a environ 18 ans, par le Cit. Selrin, élève d'H. Haüy, entre le Breuil et Charcey, route du Petit Montcenis à Cluses.

2. Les cubes blâs, d'un gris sale, cités dans l'appendice, se trouvent en Angleterre, près de Bolton. On aperçoit, dans leurs fissures, des indices très-sensibles de joints naturels situés parallèlement aux faces de l'octaèdre primitif. M. Haüy, de la société royale de Londres, a reconnu qu'ils étoient allongés d'argile ferrugineuse. Cette terre y fut, à l'égard de la chaux fluatée, à peu près la même fonction que la matière quarreuse, par rapport à la chaux carbonatée, dans les cristaux connus sous le nom de *grès cristallin* de Fontainebleau.

3. La chaux fluatée fait souvent partie de la gangue des mines métalliques, et sert à favoriser la fusion des autres substances terreuses dont la mine est mêlée, et à produire ainsi la séparation de ces substances d'avec le métal au-dessus

chaque-elles s'élevaient à l'état de verre ou de scories. De là les noms de *spath fluor* et de *spath fusible*, que l'on a donnés à la chaux fluatée. Les métaux qu'elle accompagne sont ordinairement l'argent, le cuivre, l'étain et le plomb, rarement l'or et le mercure.

14. Cette substance acidescente a été d'abord réunie, par plusieurs chimistes, avec la chaux fluatée et la baryte sulfatée. On prenoit alors la baryte pour une modification de la chaux, et l'on confondoit l'acide de la chaux fluatée avec l'acide sulfurique; en sorte qu'on ne voyoit autre chose, dans les trois substances, que des combinaisons de ce dernier acide avec la chaux.

Les observations de Marcgraff valent les Chimistes sur la voie, pour découvrir le vice de ce rapprochement. Mais il étoit observé à Schéelle de faire le peu important, et de prouver que la base du *spath fluor* étoit combinée avec un acide particulier, que l'on a nommé *acide spatique*, et mieux encore, *acide fluorique*, et qui, entre autres propriétés, a celle de corroder le verre.

15. Werner est le premier qui ait remarqué que la chaux fluatée se divisoit en tétraèdres réguliers. Mais cette observation n'a été connue ici qu'en 1790, par la traduction qu'a publiée madame Picardet, du traité de ce célèbre minéralogiste, sur les caractères extérieurs des minéraux (1). Au

(1) Voyez cette traduction, p. 252.

reste, on obéissant exactement le tétraèdre avec ses quatre angles solides complets. Il faut aussi des précautions et de l'habitude pour obtenir le rhomboïde dans toute sa pureté. On arrive plus facilement à l'octaèdre, parce qu'on ne peut faire aucune coupe qui ne soit dans le sens de quelqu'une de ses faces, en sorte qu'il ne reste plus qu'à les rendre égales entre elles.

6. Pour bien observer la phosphorescence de la chaux fluatée, on peut jeter de sa poussière en saut sur un charbon allumé : il se forme, vers les bords du tas, un cercle de lumière, qui lui toujours en diminuant de diamètre, jusqu'à ce que tous les grains aient produit leur effet. Kirwan en faisoit voir des caractères lumineux dans l'obscurité, en mettant sur des charbons ardents une plaque de cuivre, sur laquelle il avoit écrit avec un mélange d'eau et de poudre de chaux fluatée.

7. On trouve, en Sibirie, une substance blanche qui a la plus grande analogie avec la chaux fluatée, mais dont la phosphorescence se développe avec des circonstances particulières. On lui a donné le nom de *chalcophane*, c'est-à-dire, corps qui répand une lumière verte. Si l'on en met un fragment sur un charbon ardent, il y reste une décapité, et bientôt il répand une lumière d'un vert d'émeraude, qui produit un très-bel effet. Cette luminescence va en s'affaiblissant, et finit par disparaître au bout d'un certain temps; la pierre se

trouve alors décolorée, et est devenue insipide. Lorsqu'on ménage l'action de la chaleur, en se contentant d'exposer la chlorophane sur de la cendre chaude, et qu'on a soin de la retirer peu après qu'elle est entrée en pleine phosphorescence, le phénomène peut être renouvelé un certain nombre de fois, mais toujours avec une diminution progressive de la propriété phosphorique.

4. Poyssotier a tiré un parti ingénieux de la propriété qu'a l'acide fluorique de corroder le verre, en dessinant des figures sur une glace éclaircie de verres forts, et en couvrant le tout d'acide, qui s'évapore dans les traits du dessin et en marque l'emplacement sur la glace. Un de ses plus beaux ouvrages en ce genre, est celui qui représente la chaire et le génie pleurant sur le tombeau de Schiølle, à qui l'on doit la découverte de l'acide fluorique. On a trouvé depuis, que le gaz solide fluorique pourrait être employé encore plus avantageusement que l'acide en nature. Ce moyen réunit l'économie, la facilité et la célérité. Il suffit de jeter de la poudre de chaux fluatée dans de l'acide sulfurique, et de placer le globe de manière qu'elle reçoive la vapeur qui se dégage. Le Cit. Gillet a réussi à graver, en très-peu de temps, par ce procédé, des dessins très-déliés.

5. On rencontre, dans le commerce, divers oxydres de chaux fluatée, la plupart d'une couleur violette, dont il paraît que l'on a répandé les in-

perfectiones naturelles, en les polissant sur certaines faces. Quelques-uns ont deux facettes courbes, qui interceptent deux de leurs angles solides opposés. Mais il est très-douteux que ces facettes, qui d'ailleurs paraissent aussi le poli de l'art, se trouvent sur les cristaux encore intacts. On conçoit le dessein de l'artiste, en les polissant, puisque les mêmes cristaux sont percés dans le sens de l'axe correspondant, ce qui prouve en même temps que ces cristaux ont été employés comme cristaux.

10. En Angleterre, et ailleurs, on travaille les espèces de chaux fluates d'un volume un peu considérable, et l'on en fait des plaques et des vases de différentes formes. Ces ouvrages, dont les couleurs vives et agréables semblent rivaliser avec celles des gemmes, sont encore diversifiés par des assortimens de portions cristallines et diaphanes, enchevêtrées dans des espèces de cloisons demi-transparentes ou opaques, quelquefois d'une autre matière, en sorte que le tout imite une pièce de marqueterie ou un dard alvéolaire.

IV. E S P È C E.

C H A U X S U L F A T É E.

Sulfate calcique des chimistes.

Gypsum, *Waller, t. I, p. 153.* Eachus l'espèce 74, n°. 4, p. 166. Gypse ou pierre à plâtre, dont les cristaux portent le nom de sulfate, de Liré,

t. I, p. 441. Chaux vitriolée, gypse, sulfate de chaux, de Bern, *t. I*, p. 542. Chaux vitriolée, (gypse, sulfatée) Sciogr., *t. I*, p. 109. Gips et Frauentz (mineir de Frauenz), *Konnerberg*, *t. I*, p. 527 et 542. Gypse, Danderton, *tabl.*, p. 20. Gips combined with the vitriolic acid, *Kirwan*, *t. I*, p. 118. Le gypse, *Brochant*, *t. I*, p. 601.

Caractère essentiel. Divisible par des coupes très-nettes en lames, qui se cassent sous des angles de 113° et 67° .

Caract. physiq. Pesant. spécif., 2,2642—2,3117.

Durcté. Rayée par la chaux carbonatée.

Réfraction, double.

Caractères géométr. Forme primitive. Prisme droit quadrangulaire (*fig. 94*) pl. XXXIII, dont les bases sont des parallélogrammes obliques, ayant leurs angles de $113^{\circ} 7' 48''$ et $66^{\circ} 52' 12''$. Les divisions parallèles aux bases sont très-nettes, et s'obtiennent avec la plus grande facilité, au moyen d'une lame de couteau que l'on fait passer entre les lames du cristal. Si l'on rompt ensuite une de ces lames avec précaution, ou qu'on frappe dessus avec un corps dur, on obtient les divisions latérales beaucoup moins nettes et moins éclatantes que les premières.

Molécule intégr., 24 (1).

(1) Selon *ALLARD* (*fig. 25*) la même base que *fig. 94*. Si l'on mène la perpendiculaire *AN'*, puis *AN* perpendicu-

Caractère chim. Exposé sur un charbon ardent, elle décrépite, blanchit en un instant, et devient très-friable.

Fusible au chalumeau, en émail blanc, pourvu que le jet de flamme soit dirigé vers le touchant des lames. Cet émail tombe en poudre au bout de quelques heures.

Soluble dans environ cinq cents fois son poids d'eau froide. Celle qui est chaude n'en dissout pas sensiblement davantage (1).

Analyse par Bergmann.

Chaux	72.
Acide sulfurique.....	46.
Eau	12.
	<hr/>
	130.

Caractères distinctifs. 1°. Entre la chaux sulfatée et la chaux carbonatée. Celle-ci se dissout avec

l'eau au AE, on trouve que l'angle $AA'E$ est de 60° , et que les côtés AE , $A'E$, AA' du triangle rectangle $AA'E$ sont entre eux comme les nombres 5, 4, 3. En adaptant ces nombres comme expressions des autres côtés, on a pour celle de la hauteur H (fig. 54), la fraction $\frac{12}{13}$. Il résulte de là que dans le parallélogramme de la base, les côtés B , C sont entre eux à peu près dans le rapport de 12 à 13, ou qu'en supposant $B = 12$, $C = 13$, on a la 4^e à peu près pour la valeur de la hauteur G ou H .

(1) Fourcroy, *Éléms. d'hist. natur. et de chimie*, éd. 1789, t. III, p. 220.

la même netteté, dans tous les sens, en lames, dont les angles sont de $101^{\circ} \frac{1}{2}$ et $76^{\circ} \frac{1}{2}$; la chaux sulfatée ne se divise nettement que dans un sens, en lames, dont les angles sont de 113° et 67° . La chaux carbonatée raje la chaux sulfatée ; elle fait effervescence avec l'acide nitrique, ce qui n'a pas lieu pour la chaux sulfatée. 2°. Entre la chaux sulfatée et la stibite. Les lames de celle-ci se subdivisent, par la rupture ou par la pression, en fragmens indéterminés, et celles de la chaux sulfatée en fragmens qui ont des angles de 113° et 67° . La stibite se comporte comme le borax, en chaudière, dans quelque sens qu'on la présente au jet de flamme ; la chaux sulfatée s'y fond en émail blanc, et seulement lorsqu'on dirige la flamme vers le tranchant de ses lames. 3°. Entre les lames minces de chaux sulfatée et celles de mica. Celles-ci ont de l'élasticité ; celles de la chaux sulfatée se cassent net. La chaux sulfatée, exposée un instant à la flamme, devient blanche et friable ; le mica, dans le même cas, n'éprouve aucune altération sensible. 4°. Entre la chaux sulfatée fibreuse et l'asbeste roide. Celui-ci sort d'un feu ordinaire comme il étoit y entré ; la chaux sulfatée y blanchit en un instant et devient friable ; sa poussière est sèche entre les doigts ; celle qu'on obtient par la trituration de l'asbeste est douce et pâteuse.

Déterminables.

Franciscus, *Erasmring*, t. I., p. 540.

1. *Chaux sulfatée trapézoïdale.* $\frac{C\dot{H}P}{fIP}(\mathcal{A}_P, 96)$. De *Edin.*, t. I., p. 445, esp. 1; et p. 446, var. 1, 2. Incidence de *l* sur le trapèze adjacent, derrière le cristal, $143^{\circ} 53' 22''$; de *l* sur *P*, $106^{\circ} 3' 15''$; de *f* sur le trapèze adjacent, derrière le cristal, $110^{\circ} 36' 34''$; de *f* sur *P*, $134^{\circ} 41' 43''$. Angles plans de la facette *P*, $116^{\circ} 52' 12''$, et $55^{\circ} 7' 48''$ (1).

(1) Le fig. 106, pl. XXXIV, représente le résultat de la division microscopique d'une lame mince parallèlement à *P* ($\mathcal{A}_P, 96$). Or, en admettant l'hypothèse la plus simple et la plus naturelle, qui est celle où la face *l* résulte d'un décroissement par une rangée sur l'angle *E* ($\mathcal{A}_P, 94$), on conçoit que chacun des triangles *ace*, *eye* ($\mathcal{A}_P, 106$) représente la moitié de la lame issue d'une molécule comprise dans une rangée. Si cette lame étoit un véritable rhombe, *ace* seroit un triangle isocèle, c'est-à-dire, que les angles *e*, *a* d'une part, et de l'autre les côtés *ac*, *ec* seroient égaux. Mais il n'en est pas ainsi, et en mesurant avec soin les angles de ce triangle, on trouve *e* = 62° , *a* = 63° à peu près, 125° . Concluons de là que les côtés *ac*, *ec* ne sont pas égaux dans la molécule, et que la lame issue n'est pas un rhombe parfait, mais un rhombe alongé, dans lequel les côtés *ac*, *ec* sont entre eux, ainsi que nous l'avons dit, à peu près dans le rapport de 15 à 12.

a. Chaux sulfatée trapézoïdale élargie (fig. 96). L'accroissement se fait parallèlement aux arêtes k , k' , qui répondent aux arêtes C , C (fig. 94) du noyau.

Cette sous-var. se trouve en Sibérie, et en France, près de Mézières, d'où elle m'a été envoyée par le Ch. Poulet-Bonaparte. Ses cristaux sont souvent isolés.

b. Chaux sulfatée trapézoïdale allongée (fig. 97). L'accroissement se fait parallèlement aux arêtes m , m' , ou dans le sens de la grande diagonale EE (fig. 94) du noyau. Se trouve en France, à Saint-Germain-en-Lain; en Espagne, à Freyberg, en Saxe, etc.

c. Chaux sulf. trapézoïdale bimétopre. Supposons qu'un plan coupant qui passerait par les milieux m , m' (fig. 97) des arêtes parallèlement auxquelles la sous-varété b s'allonge, et qui serait perpendiculaire au plan P , partage le cristal en deux moitiés, dont l'une se renverse ensuite, sans cesse de s'appliquer contre la première par la face de jonction. Les deux moitiés, dans ce cas, formeront, d'une part, un angle rentrant de $106^{\circ} 15'$ $36''$, et de l'autre, un angle saillant de la même valeur. Ordinairement, lorsqu'on regarde le jour à travers cette bimétopre, on aperçoit la face de jonction, qui fait paraître les deux moitiés comme soudées l'une à l'autre. Se trouve dans les mines de la haute Autriche.

2. *Chaux sulfatée équivalente*. $\frac{PCKK}{P f h l}$ (fig. 93).

La sous-var. δ ci-dessus, augmentée de quatre triangles $n, n',$ etc. ; de $Lale$, $l, l', p.$ (fig. 92) ; var. q . Incidence de n sur le triangle qui lui est adjacent, derrière le cristal, $153^{\circ} 54' 56''$; de n sur P , $110^{\circ} 32' 38''$. Cette variété se trouve quelquefois sur les mêmes groupes que la sous-var. δ , dont elle peut être considérée comme une modification.

3. *Chaux sulfatée primitive* (fig. 95) $pl XXXPT$. Sorte d'hémitrope qui se présente sous la forme d'un prisme octogone, terminé par un sommet tétraèdre, dans lequel les deux arêtes terminales situées l'une à la droite et l'autre à la gauche de a , font entre elles un angle à peine sensible, ou une très-légère saillie. Incidence de ces arêtes l'une sur l'autre, $176^{\circ} 2' 20''$, et sur les faces verticales M , $92^{\circ} 59' 45''$; incidence de n sur n' , ou de n'' sur n''' , $153^{\circ} 54' 48''$.

Pour concevoir plus facilement cette variété ; supposons que la forme primitive (fig. 94) se trouve de manière que la face P qui étoit horizontale, prenne une position verticale comme on le voit fig. 100, et que l'arête C soit de même située verticalement. Supposons de plus une forme secondaire (fig. 104) relative à cette nouvelle position, et qui ait pour signe $\frac{MC}{M} \frac{CP}{f} \left(\frac{K B C}{= } \right)$. La première partie de ce signe, ou celle qui précède,

la

la perorthèse, donnera véritablement le prisme octogone que représente la figure. Maintenant soit $ABAR$ (fig. 101) la même face que fig. 100. Le décroissement intermédiaire indiqué par la seconde partie du signe se faisant parallèlement aux lignes ab , cg , tant sur la face dont il s'agit que sur celle qui lui est opposée; il en résultera deux faces a , a' (fig. 102), qui masqueront la face T (fig. 100), et se réuniront sur une arête x (fig. 102) parallèle à x , ou, ce qui revient au même, parallèle à ab ou à cg (fig. 101). Or, le calcul démontre que chacune de ces lignes est inclinée sur EA d'environ 94° .

Imaginons enfin que le cristal étant coupé en deux moitiés à l'aide d'un plan qui passeroit par le milieu x (fig. 102) de l'arête terminale, et seroit perpendiculaire sur P , l'une de ces moitiés, par exemple, celle qui est située à droite se retournera, en restant toujours appliquée à l'autre : on aura l'écluse que représente fig. 99.

J'ai un cristal de cette variété qui m'a été donné par le Cit. Faujas, et qui venoit de Sicile. Sa longueur est d'environ 54 millimètres ou deux poires, sur une épaisseur de 9 millimètres ou environ quatre lignes. La partie intérieure ayant été détachée de la gangue, on ne peut voir l'angle rentrant que devoient former en cet endroit les deux moitiés du cristal, et qui de même approcheroit beaucoup de la somme de deux angles droits.

4. Chaux sulfatée prismatique. On peut concevoir cette variété comme une modification de la chaux sulfatée trapézoïdale hémisphérique, dont le sommet est obtusifié, et à peu près à angle droit sur les pans, de manière que cette hémisphérie se présente sous l'aspect d'un prisme droit hexaèdre, dont la base serait légèrement convexe. On peut aussi la ramener à la variété pyramidale, en supposant que les pans M soient aigus, et que le sommet, au lieu d'être quadrilatère, forme une petite convexité. Se trouve à Montmartre.

5. Chaux sulfatée micacée. C'est une altération de la chaux sulfatée trapézoïdale, sous-*var. a*, dont certaines parties se sont arrondies, tandis que les autres restent planes. Dans les cristaux les moins altérés, les deux angles aigus y, y' (fig. 96), sont remplacés chacun par des facettes curvilignes tournées vers les arêtes de jonction, entre les pans I, P et ceux qui leur sont adjacents derrière le cristal (De Lisle, *z. I*, p. 451; *var. 3*. C'est aussi la adénite basaltine de Demeste, *ibidem*, *z. I*, p. 357; *var. 3*). D'autres cristaux, où l'arrondissement devient encore plus sensible, se composent entre xy et xy' , de sorte que les rhombes P , qui seuls conservent une figure plane, se réduisant à des surfaces étroites terminées par deux arcs, dont les extrémités se rejoignent en angle aigu. Toutes ces

altérations présentent une série de nuances qui se trouvent à la variété suivante. Se trouve très-communément à Montmartre et dans les autres carrières de plâtre des environs de Paris.

6. *Chaux sulfatée lenticulaire*. De Lisle, t. I, p. 460 ; var. 3.

Les lentilles sont ou solitaires, comme dans une partie de la carrière de Montmartre, où l'on en trouve un grand nombre d'une couleur blanchâtre, qui n'ont que 6 millimètres ou environ à largeur de diamètre ; ou groupées confusément, de manière qu'elles se présentent par leur tranchant, (c'est le gypse en crêpe de coq) ; ou arrangées circulairement comme les pétales d'une fleur, (c'est ce qu'on a appelé gypse en rose) ; ou réunies deux ensemble par une portion située vers le bord de leur disque, en sorte qu'elles forment, d'une part, un angle rentrant, et de l'autre, un angle saillant ; ou enfin disposées par paires, qui s'élèvent les unes au-dessus des autres, de manière que chaque paire s'introduit par sa partie saillante dans l'angle rentrant de celle qui est immédiatement au-dessous. Ces assemblages de deux lentilles ou d'un plus grand nombre sont communs à Montmartre. Leur couleur est jaunâtre, et il y en a qui ont environ 3 décimètres ou un pied de longueur, et davantage.

La coupe d'un assemblage de deux lentilles présente deux triangles saillants réunis par leur moyen côté (fig. 16.). Chaque lentille pouvant être considé-

rie comme une altération d'un cristal semblable à la semi-variété α de la chaux sulfatée trapézoïcale (fig. 95), si l'on rétablit par la pensée les parallélogrammes semblables à celui de la fig. 106, qui représente une des lames composantes du cristal complet, on aura l'assortiment indiqué par la fig. 103, dont la portion $h'gr$ est la coupe des deux lamelles accolées. En frappant avec un corps dur sur la surface représentée par cette coupe, on voit poindre les lignes ap , ai , ai , etc., situées parallèlement aux côtés des molécules.

La ligne de jonction fg est nécessairement une ligne droite. Les lignes $h'f$, gf s'écartent ordinairement assez peu de la direction qu'elles ont sur la figure, au sorte que l'angle $h'fg$ est d'environ 120° . Les lignes qui répondent à hr , gr forment une courbure qui souvent n'est pas non plus très-sensible. L'angle $fgre$ ou $f'he$ est à peu près de 50° , ce qui donne 10° pour l'angle $h'eg$.

On voit par là que les portions triangulaires af , $a'f$ sont supprimées dans les lamelles; que la ligne fa coïncide exactement avec ae (fig. 106), et que la ligne fa (fig. 103) s'écarte peu de peu (fig. 106). Quant aux lignes qui répondent à hr , gr (fig. 103), elles sont dirigées d'après une loi irrégulière et variable de décroissement. En traçant la figure, j'ai saisi leur position à la limite la plus voisine des résultats de l'observation, qui est le cas d'un décroissement par quatre rangées dans le

sens de *hf*, et par trois dans le sens de *pd*. L'angle *fAc* seroit alors d'environ $47^{\circ} \frac{1}{2}$. Mais ce n'est ici qu'une hypothèse, car les lignes dont il s'agit éprouvent des déviations continuës, et ne sont soumises à aucune règle. A l'égard des lames empilées de part et d'autre sur les triangles *hfr*, *gfr*, elles décroissent de même irrégulièrement par les bords qui répondent à *fA* et *Ac*, de manière que ces bords forment, par leur ensemble, les bords curvilignes des lentilles.

Ce qu'on a appelé *gypse en fer de lance*, ou *gypse cannelonné*, et dont on a fait une variété séparée, n'est autre chose qu'un fragment détaché d'un assemblage de deux lentilles, par deux fractures parallèles faites dans le sens des grandes faces des lames composantes. Ces fractures sont souvent produites par l'instrument même qui sert à l'extraction du plâtre, dans lequel sont engagées les lentilles. La nature est assez riche en productions variées, pour se passer de celles qu'on lui a prêtées (1).

7. *Chaux sulfatée laminaire*. On en trouve à Legny, en lames blanchâtres, translucides, dont la surface est légèrement usée. C'est une des variétés dont la division mécanique donne les copeaux lenticulaires les plus nettes.

(1) Les lames produites par la section des mêmes corps ont été sans aucune pierre spéculaire et sans voir d'axe.

8. Chaux sulfatée acoustique. Cette variété abonde dans la grotte aluminieuse de l'île de Môle, d'où elle a été rapportée par le Cit. Olivier.

9. Chaux sulfatée fibreuse. Gypse fibreux ou strié, de Lisle, t. I, p. 467. Faseriger gips, *Emmerling*, t. I, p. 536. Fibrous or striated gypsum, *Kirwan*, t. I, p. 121.

a. En filons parallèles très-déliés, d'un blanc luisant et soyeux. Elles sont disposées si régulièrement, que la surface des morceaux fait, jusqu'à un certain point, la fonction de miroir, en sorte qu'on y voit distinctement l'image d'une bougie allumée.

â. En fibres contournées.

Il y a près de Saint-Georges de Laveran, département de l'Aveyron, des bancs considérables de chaux sulfatée, qui est laminaire dans un sens et fibreuse dans un autre, de manière que les fibres sont effilées perpendiculairement aux plans de division qui passent entre les lames.

10. Chaux sulfatée compacte. Albâtre gypseux, de Lisle, t. I, p. 469. Dichter gips, *Emmerling*, t. I, p. 529. Compact gypsum, *Kirwan*, t. I, p. 121. En masses translucides seulement aux bords, à grain fin et serré, scintillantes à quelques endroits, faciles à entamer par la pression de l'ongle. Cette variété abonde à Lagay.

11. Chaux sulfatée terreuse. Gypse de, *Emmerling*, t. I, p. 527. En masses composées de grains

agglutinés, à cassure subtile et ternie, excepté à quelques endroits où elle offre des points brillans ; tachant les doigts par le frottement ; leur poussière est sèche au toucher. Cette variété est à la chaux sulfatée compacte, ce qu'est la craie à la chaux carbonatée macarède.

12. Chaux sulfatée *subformée*. Composée de grains serrés, d'une couleur blanche un peu perlée ; ayant l'aspect de la neige qui a été pressée et réduite en pelote ; aisément réductible, entre les doigts, en une poussière douce au toucher. Cette variété se trouve à Montmartre, tantôt sur la chaux fluide lenticulaire, tantôt sur la pierre à plâtre.

Quant à cette dernière substance, nous la renvoyons à l'appendice général, comme n'étant autre chose qu'un mélange de chaux sulfatée et de chaux carbonatée, dans des proportions variables à l'infini.

ACCIDENTS DE COULEUR.

Couleur et Changement.

1. Chaux sulfatée *bleuâtre*.
2. Chaux sulf. *grisée*.
3. Chaux sulf. *jaunâtre*. Les cristaux lenticulaires de Montmartre.
4. Chaux sulf. *jaune*. Quelques parties de la chaux sulfatée compacte de Lagry.

5. *Chaux sulf. rougeâtre.* La variété fibreuse présente quelquefois cette couleur.

Il y a, en Espagne, des cristaux où la couleur rouge, due à un oxyde de fer, est appliquée sur la surface de quelques-unes des lames intérieures, de manière qu'elle passe à travers le reste du cristal, qui est limpide.

6. *Chaux sulf. blanche.* Les variétés lamineuses, compactes et cristallines.

7. *Chaux sulf. nacrée.* Composée de lames dont la surface forme des capes d'ondulations, et répond des reflets d'un vil éclat de nacre.

Transparence.

1. *Chaux sulf. transparente.*

2. *Chaux sulf. translucide.*

A N N O T A T I O N S.

1. La chaux sulfatée en masses se trouve ordinairement sous la forme de monticules, et quelquefois par couches, dans des terrains calcaires de seconde et de troisième formation. Le sol primitif renferme aussi des amas plus ou moins considérables de cette substance. Saussure en a observé plusieurs dans le voisinage du Mont Génis (1), et jusque sur le schiste micacé calcaire,

(1) Voyage dans les Alpes, 8^{vo}. 1788, 1789 et 1790.

qui forme le corps de cette montagne. Il a vu, dans le même lieu, un tel feuilleté qui sortoit de dessous la chaux sulfatée. Mais il pense que celle-ci est d'une formation postérieure de beaucoup à celle des montagnes qu'elle avoisine ou qui lui servent de support. Le même auteur cite de la chaux sulfatée pure, en masses granuleuses, située au Saint-Gothard, près d'Ayrôlo, dans la vallée Lavantina, et même de la chaux sulfatée schisteuse micacée, mais qu'il croit être aussi d'une formation récente (1). Cependant M. Fresken, minéralogiste très-déclaré, qui a observé le gypse d'Ayrôlo, où il est entre des couches de grès, le met au rang des substances de première formation (2).

Les eaux pluviales qui tombent sur la surface des massifs de chaux sulfatée que l'on rencontre dans les lieux dont nous venons de parler, dissolvent peu à peu cette substance, et y produisent des excavations en forme d'entonnoirs, qui ont jusqu'à cinq ou six mètres et davantage de profondeur, sur une ouverture à peu près égale (3). Le Cit. Patrin a observé le même phénomène dans les masses de chaux sulfatée des Monts-Ours (4).

(1) Voyage dans les Alpes, N°. 275a.

(2) *Journ. de phys. France*, an 9, p. 472.

(3) *Sommaire*, voyage dans les Alpes, N°. 2178.

(4) *Hist. natur. des montagnes*, Paris, an 9, t. III, p. 201.

Les cristaux de chaux sulfatée abondent à Montmartre, près de Paris, dans une carrière de pierre à plâtre, dont les couches alternent avec celles d'une matière marneuse (1) : c'est surtout dans les couches de marne qui séparent les deux assises les plus élevées, que sont renfermés ces cristaux lenticulaires accolés deux à deux, ou en plus grand nombre, dont je ne sache pas qu'aucune autre localité ait offert les analogues. La marne, fortement argileuse, qui forme comme le couronnement de la carrière, renferme des cristaux solitaires ou groupés, qui présentent les divers passages entre la variété tropéienne et la lenticulaire.

On trouve beaucoup de cristaux de chaux sulfatée dans les salines et aux environs. Celles de la haute Autriche en fournissent des groupes de la plus belle transparence. A mesure que l'on fait entrer de l'eau dans les excavations pour dissoudre le sel, et l'obtenir ensuite par l'évaporation, une partie de cette eau pénètre le toit qui s'en évapore, et c'est par l'intermède de ce même liquide que se forment les cristallisations gypseuses qui adhèrent au toit de la cavité (2).

La chaux sulfatée existe en masses, ou sous des

(1) Voyez les descriptions de cette carrière données par les *Cat. Desmarest*, *Lamoureaux* et *Pellissier*, *Mémoires de l'Acad. des Sc.*, an 1778; *Bourn. de plâtre*, *mem.*, 1780, et octobre, 1780.

(2) De Born, *catol.*, t. I, p. 544 et 545.

formes régulières, dans diverses autres contrées, telles que l'Espagne, la Pologne, l'Italie, la Sicile, où elle accompagnait le soufre et la strontiane sulfatée, etc. Mais quoiqu'il soit, en général, assez commune, il y a des pays considérables qui sont, à cet égard, dans une sorte de disette. Cronstedt dit que c'est le Suède qui manque le plus en Suède (1).

2. Parmi les variétés de la chaux sulfatée, on a donné à celles qui étoient cristallines le nom particulier de *efflores*, c'est-à-dire, *lenses*, à cause de la facilité avec laquelle leurs lames brillantes réfléchissent l'image de la lune (2); et l'on nommoit simplement *gypse* (3) les variétés en masses informes. D'une autre part, on a souvent confondu ces mêmes lames avec celles du mica folié, du *talé de Moscovie*, parce qu'elles se soufloient de même en lames beaucoup plus minces, et c'est une méprise dont on a encore peine à faire revenir

(1) Pape, sur le gypse, dans un recueil de minérales sur la chimie, traduit de l'allemand, Paris, 1764, t. II, p. 257.

(2) Boece de Boot, de lapid. ac gemis, lib. II, cap. 215. La sulfure des anciens étoit une sorte de gypse, sur laquelle étoit peinte, disoit-on, une petite image de la lune, qui croissant et décroissant, en suivant les phases de cet astre. Plin., lib. xxxvii, chap. 16.

(3) Les anciens appeloient spécialement *gypse* la chaux sulfatée calcinée. Boece avoit cette acception en vue, lorsqu'il dit que la pierre spéculaire se réduit en gypse par l'action du feu. *Ibid.*

les personnes peu instruites , dont l'attention ne va pas au-delà de ce qui frappe les yeux.

3. La chaux sulfatée compacte est la substance qui , sous le nom d'albâtre , a servi tout de suite de terme de comparaison pour désigner une belle couleur blanche. Les anciens confondoient cet albâtre , que l'on a nommé depuis albâtre gypseux , avec l'albâtre calcare. Placé emploie le nom d'alabastrine , pour indiquer l'un et l'autre , quoiqu'il se soit servi aussi quelquefois du mot alabastrum (albâtre) (1). Parmi les modernes , quelques-uns ont appelé particulièrement albâtre celui qui est calcare , et alabastrite , celui qui est gypseux. Boiss applique ces deux mots en sens inverse. Du reste , cet auteur avoit soigné la distinction entre les deux substances , aussi-bien que le permettoient les connaissances acquises de son temps (2). On étoit loin de se douter alors que quelques gouttes d'acide , versées sur ces substances , fussent capables de les faire ressembler si nettement l'une à côté de l'autre.

La chaux sulfatée est très-peu soluble dans l'eau , et ne fait aucune impression sensible sur la langue ; mais l'eau dans laquelle elle a été dissoute a une crudité qui la rend pesante sur l'estomac , et cette sensation a été regardée comme une espèce de sa-veur qui , trop faible pour agir sur les nerfs de

(1) Hist. nat. l. XXXVI, ch. 8, et l. III, ch. 2.

(2) De lapid. ac. generis, 35, 36, c. 269.

l'organe du goût, n'avoit de prise que sur ceux de l'estomac, qui sont plus délicats. Quelque l'un connût, depuis long-temps, la solubilité de la chaux sulfatée, et que Wulken ait même avoué qu'on auroit pu mettre cette substance au rang des sels (1), sa position dans le sein de la terre, parmi les pierres proprement dites, et le volume des masses qu'elle couvrit, ont fait penser à ce savant qu'elle devoit rester dans la classe des substances pierreuses; comme si c'étoient les localités et les dimensions, plutôt que les principes composés et les qualités intrinsèques qui devoient décider de l'arrangement méthodique des minéraux.

4. La cristallisation de la chaux sulfatée est une des moins fécondes en polyèdres réellement distincts, et au même temps une de celles où les formes soient le plus sujettes à des altérations qui oblièrent leurs angles et leurs arêtes. C'est en observant les fractures faites à l'un de ces corps nommés *gypse en fer de lance*, que La Hire, en 1710, c'est-à-dire, dans un temps où l'étude de la cristallographie étoit à peine naissante, entreprit de déterminer la structure de la chaux sulfatée.

Ce savant regardoit les deux triangles Afc , gfc (Fig. 104) comme rectilignes. Ce n'est pas qu'il ne se fût aperçu de quelques déviations dans les positions de leurs côtés extérieurs; mais il ne voyoit là que

(1) T. II, p. 175, obs. 4.

des situations accidentelles des figures primitives données par ces triangles. Il avoit remarqué sur la surface de ces mêmes triangles des lignes qui les subdivisoient en d'autres triangles, mais *gr*, *fr*, *ax*, etc. ; et suivant les mesures qu'il avoit prises , les valeurs des angles lui parurent être les mêmes que celles qu'indiquoit la figure. D'après ces données , il imagina que les éléments du gypse étoient de petits triangles semblables aux précédens , et disposés les uns à l'égard des autres dans des situations renversées. Par exemple , le triangle A étoit un assemblage de petits triangles qui avoient leurs côtés parallèles aux siens ; il en étoit de même du triangle B, etc. ; et ainsi ce que nous dirons de ces triangles s'applique à leurs éléments. Or, le triangle A, au lieu d'avoir son angle de 60° diagonalement opposé à l'angle de même valeur dans le triangle B, comme on le voit fig. 103, ce qui eût rendu parallèles les deux côtés *fr*, *gr* (fig. 104), avoit cet angle adjacent à l'angle de 70° ; ce qui faisoit converger les mêmes côtés. On concevra cette disposition, en imaginant que le triangle B (fig. 103) restant fixe, le triangle A tourne autour du point *f*, de manière que sa surface de dessous vienne se présenter en dessus. Le même renversement avoit lieu pour tous les triangles situés à droite le long de *gr*, à l'égard des triangles situés à gauche le long de *fr*, en sorte que la ligne *gr* formoit, à l'endroit de sa réunion avec *fr*, un angle de 10° .

Dans la réalité, ce n'est que par accident que les angles des triangles A et B, et ainsi des autres situés des deux côtés opposés, se rapprochent de l'égalité; et il y a entre ces deux séries de triangles une grande différence, qui consiste en ce que la ligne *fe*, sur laquelle reposent les uns, est dirigée d'après un décroissement par une rangée sur l'angle E (fig. 94), tandis que la ligne *ge*, (fig. 104) sur laquelle reposent les autres, n'est soumise à aucune loi régulière; et tous ces triangles ne sont autre chose que des assemblages de molécules semblables au parallélogramme représenté fig. 94, et qui ne subissent aucun renversement. La Hire, qui ne connaissait que des fragmens de cristaux lamellaires, ne pouvoit deviner qu'ils n'étoient que des altérations des cristaux réguliers que produit la même substance. Réduit à des observations isolées, il devoit nécessairement se tromper, et il est difficile de le faire avec une plus grande apparence de vérité.

5. Pour obtenir la double réfraction de la chaux sulfatée, je m'y suis pris de la manière suivante : j'ai taillé une lame transparente de cette substance, de manière que la facette artificielle, en partant de la grande diagonale *EE'* (fig. 95) du parallélogramme primitif, remplissoit un des triangles *E'AE*, *EA'E'*, le premier, par exemple, et fit avec le second un angle obtus qui se trouva être de 164° . Regardant alors une épingle à travers la facette artificielle et la base opposée à *EA'E'*, je voyois deux images ir-

elles, mais très-distinctes, de cette épiangle, toutes les fois que sa direction étoit parallèle à la diagonale ER; et ces images se rapprochoient à mesure que je faisois angulairement l'épingle, jusqu'à ce qu'enfin elles se confondoient sur une direction qui m'a paru être perpendiculaire à la diagonale ER.

6. Macquer avoit remarqué que quand on exposoit la chaux sulfatée, par le plat de ses lames, au foyer d'un miroir ardent, elle ne faisoit que se calciner sans se fondre, au lieu que quand on tournoit le bord des lames vers le foyer, il y avoit fusion avec un bouillonnement sensible (1), c'est-à-dire, qu'alors le calorique luttoit avec beaucoup plus d'avantage contre l'affinité des molécules gypseuses, pour opérer leur déunion. Cette différence d'effet est conforme à la théorie qui, en partant des lois les plus simples de décroissement, donne à peu près le rapport de 15 à 3a pour celui du grand côté de la base de la molécule à sa hauteur. Il en résulte un beaucoup plus grand nombre de points de contact entre les faces latérales qu'entre les bases des molécules, et, par une suite nécessaire, une force de cohésion beaucoup plus considérable; et ce résultat peut servir encore à expliquer pourquoi les coupes qui ont lieu dans le sens des bases, sont incomparablement plus nettes et plus faciles à obtenir que celles qui se font latéralement.

(1) Diction. de chimie, au mot gypse.

La différence d'étendue entre les côtés C et B (fig. 94), et par suite entre les faces latérales M et T, en déterminant aussi une entre les coupes correspondantes. En essayant de rompre certaines lames minces de chaux sulfatée, on s'aperçoit que, dans un sens, elles ont plus de roideur et se cassent plus net, en faisant entendre un petit craquement, tandis que dans l'autre sens elles commencent par fléchir et se cassent, en quelque sorte, mollement. De ces deux sens, le premier est relatif à la plus grande face latérale M, et le second à la plus petite T.

7. La chaux sulfatée compacte, d'une belle couleur blanche, est employée pour faire des statues et des vases d'ornemens; mais les ouvrages dont elle fournit la matière, sont sensiblement plus tendres et plus susceptibles d'être altérés par les impressions de l'air, que ceux qui sont faits de marbre ou d'albâtre calcinés. Ainsi ont-ils beaucoup moins de valeur dans le commerce.

8. Plusieurs statuaires font calciner des coquilles ou des lames de chaux sulfatée, qu'ils réduisent en une poudre à laquelle ils donnent le nom de *poudre fine*. Ils mêlent ensuite cette poudre avec de l'eau gommée, et en forment une pâte qu'ils jettent en moule, et dont ils font des statues très-blanches et d'un aspect agréable (1). Mais ces ouvrages sont

(1) Fourcroy, *Élém. d'hist. natur. et de chimie*, éd. 1789, t. II, p. 221.

très-fragiles , parce que la pâte dont ils sont composés n'ayant point sans de liant , ne peut prendre qu'une faible consistance.

9. La chaux sulfatée , mélangée de chaux carbonatée dans une certaine proportion , prend le nom de pierre à plâtre. Ce mélange , nécessaire pour que le plâtre soit d'un bon service , existe quelquefois naturellement , comme aux environs de Paris , et on le compose artificiellement dans les pays qui ne fournissent que la chaux sulfatée pure ou trop voisine de l'état de pureté. Nous ferons connaître plus particulièrement les avantages de ce mélange , en traitant de la pierre à plâtre dans l'appendice.

10. Il paraît que les anciens , qui connoissoient l'art de la verrerie , n'avoient pas conçu l'idée de réduire le verre en lames pour en garnir leurs fenêtres. Ce qu'il y a de certain , c'est qu'ils employoient fréquemment à cet usage la pierre spéculaire , c'est-à-dire , les lames de chaux sulfatée transparente. Ils en construisoient aussi quelquefois des caches , pour être à portée d'observer le travail des abeilles (1). Ce qu'ils appeloient *phengite* , c'est-à-dire , corps brillant , étoit une variété de la même substance , transparente et d'une couleur blanche. Le temple de la fortune-Séla , qui étoit bâti de cette pierre , n'avoit point de fenêtres , et n'étoit éclairé que par la lumière douce qui passe à travers les murailles , mais de manière , dit Pline ,

(1) Pline , Hist. nat. , l. XXII , c. 14.

qu'elle sembleroit plutôt se répandre de l'intérieur que venir du dehors (1).

V. ESPÈCE.

CHAUX NITRATÉE.

Nitrate calcaire des chimistes.

Nitrum calcareum, *Waller*, t. II, p. 46 et 74. Nitre à base calcaire, de *Lavo*, t. I, p. 380. Chaux nitée; nitrate calcaire; nitre calcaire; de *Bern*, t. II, p. 61. Chaux nitée, *Solagr.*, t. I, p. 113. Nitre calcaire, *Dauvenant*, *ibid.*, p. 27. Nitrated calx, or nitrous calcite, *Kirwan*, t. II, p. 29.

Caractère essentiel. Deliquescent, se liquéfie au feu, et détonant lentement à mesure qu'elle se dessèche.

Caractère physique. Serreux; amère et désagréable.

Phosphorescence. Calcinée et portée ensuite dans un lieu obscur, elle devient phosphorescente (2).

Caractère chimique. Soluble dans deux fois son poids d'eau froide, et dans moins que son poids d'eau bouillante.

Tombant facilement en deliquescence.

(1) *Pline*, *Hist. nat.*, l. XXXVI, c. 22.

(2) La chaux nitée, dans cet état, sème ce qu'on a appelé le phosphore de Bontoux.

Décomant lentement à mesure qu'elle se dessèche, après s'être liquéfiée sur un charbon allumé.

Caractère distinctif, entre la chaux et la potasse nitratée. Celle-ci n'est point déliquescense comme l'autre.

V A R I É T É S.

1. Chaux nitratée cristallisable. Prendre à six pans terminés par des pyramides à six faces, de *Lisle*, t. I, p. 360, note 241. Selon ce savant, l'angle que forment entre elles deux faces d'une même pyramide, qui correspondent à deux côtés opposés de la base, est de 120° . Il paroît, d'après sa description, que la pyramide est souvent oncoïforme, c'est-à-dire, que deux de ses faces sont des trapèzes, tandis que les quatre autres concourent à la figure triangulaire. Cette variété est toujours le résultat d'une cristallisation aidée par l'art.

2. Chaux nitratée aciculaire. En aiguilles plus ou moins défilées, souvent disposées sous la forme de petites bouppes.

A N N O T A T I O N S.

1. La chaux nitratée se forme journellement, en même temps que la potasse nitratée, sur les parois des murs, et dans les caves, les étables, etc. La lessive des vieux plâtres en fournit une grande quantité. On l'a trouvée aussi dans quelques eaux minérales.

2. La chaux nitrée n'est guère employée d'une manière directe. Son principal usage est de concourir à la formation du salpêtre, en échangeant sa base contre la potasse contenue dans les cendres employées par les salpêtriers. Voyez l'article de la potasse nitrée.

VF. ESPECES.

CHAUX ARSENIATÉE.

Arsenate de chaux des chimistes.

Pharmacolith, Karsten, minéralogische tabellen, p. 38.

Caractère ascensif. Soluble sans effervescence dans l'acide nitrique; odeur d'ail par le chaulage.

Caractères physiques. Dureté; facile à briser. Couleur, le blanc de lait.

Caractère chimique. Soluble sans effervescence dans l'acide nitrique.

Non soluble dans l'eau.

Odeur d'ail par le chaulage.

Caractère distinctif. 1°. Entre la chaux arseniatée et la chaux carbonatée. La dissolution de la première, dans l'acide nitrique, n'est point accompagnée d'effervescence, comme celle de la seconde. L'action du chaulage dégage de la chaux arseniatée une odeur d'ail, qui n'a point lieu avec la chaux carbonatée. 2°. Entre la même et l'arsenic

oxydé blanc; celui-ci est soluble dans l'eau, et non l'autre; il se volatilise en sortant par le chapeau, au lieu que la chaux arseniatée y laisse seulement échapper son acide.

V A R I É T É S.

1. Chaux arseniatée mamelonnée. En mamelons, dont l'intérieur est légèrement usé et strié du centre à la circonférence.

2. Chaux arseniatée capillaire.

A N N O T A T I O N S.

1. La chaux arseniatée se trouve à Wittichen, dans le Furstenberg, en Allemagne. Sa gangue est un granite à gros grains, qui est accompagné de chaux sulfatée et de baryte sulfatée. La surface de ses mamelons est colorée par du cobalt arseniaté d'un rouge de lilas. Mais si l'on cultive cet endroit superficiel, on voit paraître le blanc de lait, qui est la couleur naturelle.

2. M. Selb, après avoir reconnu que cette substance étoit de la chaux arseniatée, en rendit à Klaproth, qui trouva que la chaux y étoit combinée avec une quantité considérable d'acide arsenique. M. Karsten a donné à ce composé le nom de pharmacolithe, qui signifie pierre empoisonnée. Ce célèbre naturaliste a bien voulu m'envoyer un très-bel échantillon de cette substance alors inconnue en France, avec un second présent d'envoi

plus précieux; c'étoit un exemplaire du tableau de la méthode qu'il avoit dans ses cours de minéralogie, et auquel il a joint des annotations qui le rendent doublement intéressant.

II. GENRE.

BARYTE.

PREMIÈRE ESPÈCE.

BARYTE SULFATÉE.

Sulfate de baryte des chimistes.

Gypsum spathosum, *Waller*, *t. I*, p. 168. Marmor metallicum, *Cronstedt*, 20, 14. Spath pesant ou stéatite, de *L'Isle*, *t. I*, p. 577. Baryte vitriolée, sulfate de baryte, de *Born*, *t. I*, p. 258. Terre pesante vitriolée, spath pesant ordinaire, *Seiiger*, *t. I*, p. 161. Schwer spath, *Kammerling*, *t. I*, p. 550. Spath pesant, *Dauvenot*, *ibid.*, p. 19. Barytes combined with the vitriolic acid, baroselenite, *Kirwan*, *t. I*, p. 126. Le spath pesant, *Brochant*, *t. I*, p. 627.

Caractère essentiel. Divisible en prismes droit rhomboïdal de $101^{\circ} \frac{1}{2}$, et $76^{\circ} \frac{1}{2}$.

Caract. phys. Pesant spécl., 4,2984—4,4712.

Durété. Rayant la chaux carbonatée, rayée par la chaux fluatée.

Réfraction, double.

Caractères géométr. Forme primitive (fig. 107).

Prisme droit à bases rhombes (fig. 107) pl. XXXV, dont les angles sont de $102^{\circ} 30' 13''$, et $78^{\circ} 27' 47''$. Les divisions parallèles aux bases sont très-nettes; celles qui regardent les pans le sont un peu moins, et ne s'obtiennent pas aussi facilement. En faisant passer les fragments à une vive lumière, on aperçoit des joints étroits parallèlement aux plans qui passent par les deux diagonales des bases.

Molécule intégrante; prisme droit triangulaire, à bases rectangles (1).

Caractères chimiques. Fusible au chalumeau, en émail blanc, solide, mais qui tombe en poudre au bout de quelques heures.

Un fragment exposé au feu du chalumeau, pendant un instant, et mis sur la langue, après le refroidissement, y produit un goût semblable à celui des cristaux glacés.

Réductible, par la calcination, en une poussière qui, présentée à la lumière, et portée ensuite dans les soufflets, répand une vapeur rougeâtre.

Analyse par Withering.

Baryte.	67,2
Acide sulfurique.	32,8.

100,0.

(1) Dans la molécule constitutive, qui est semblable à la forme polédrique représentée fig. 1, la grande diagonale de la base est à la petite comme $\sqrt{3}$ à $\sqrt{2}$, et sa moitié est à la hauteur H , comme 2 à $\sqrt{3}$, d'où il résulte que les pans sont presque des carrés.

Caractères distinctifs. 1^o. Entre la baryte sulfatée et la strontiane sulfatée. La division mécanique de celle-ci donne des coupes latérales moins nettes, et la base de sa forme primitive a ses angles d'environ 105° et 75° , au lieu de $101^{\circ} \frac{1}{2}$ et $76^{\circ} \frac{1}{2}$. Sa pesanteur spécifique est moindre dans le rapport d'environ 8 à 9. Ses fragmens colorent légèrement en rouge la flamme bleue de la lumière obtenue à l'aide du chalumeau; calcinée et refroidie, ils se produisent sur la langue qu'une sensation un peu aigre, au lieu d'une impression vive et très-désagréable. 2^o. Entre la baryte sulfatée et la baryte carbonatée. La première n'est sollement attaquée par les acides, et en particulier par le nitrique; la baryte carbonatée s'y résout, au bout de quelques heures, en une espèce de bouillie. 3^o. Entre la baryte sulfatée et la chaux fluatée; la première a une pesanteur spécifique plus considérable dans le rapport d'environ 4 à 3. Sa division mécanique donne des lames dont les angles sont de $101^{\circ} \frac{1}{2}$ et $76^{\circ} \frac{1}{2}$, au lieu de 100° et 60° . Sa poussière, jetée sur un charbon ardent, n'est point phosphorescente comme celle de la chaux fluatée. 4^o. Entre la baryte sulfatée bacillaire, et le plomb carbonaté de la même forme. La vapeur du sulfure ammoniacal noircit le plomb, et n'altère point la blancheur de la baryte sulfatée. Parmi les joints naturels de celle-ci, il n'y en a qu'un qui soit parallèle à l'axe; dans le plomb, il

Y en a trois qui sont inclinés entre eux sous différents angles.

V A R I É T É S.

F O R M E S.

Déterminations.

Geradschaliger schwer spath, *Braun*, *description*, p. 18. Gemeiner schwer spath, *Eschschling*, t. I, p. 557.

1. Baryte sulfatée prismatique. \overline{MP} (fig. 107). Prisme droit à bases rhombes, ordinairement très-court. De *Lisle*, t. I, p. 462; var. 11: incidences de \overline{M} sur \overline{M} , $101^{\circ} 52' 15''$; de \overline{M} sur \overline{P} , 90° . Se trouve à Schumanitz, en Hongrie; à Offenbourg et à Kapnick, en Transylvanie, etc.

2. Baryte sulfatée tétraèdre. $\overline{M\hat{A}d}$ (fig. 108). En octaèdre ordinairement cruciforme. De *Lisle*, t. I, p. 568; pl. III, fig. 62. Incidences de \hat{d} sur \hat{d} , $101^{\circ} 55' 42''$; de \hat{d} sur la face de retour, $76^{\circ} 1' 18''$.

Je n'ai encore observé qu'un seul groupe de cristaux dans lequel toutes les faces des octaèdres fussent des triangles isocèles.

3. Baryte sulfatée opalescente. $\overline{M\hat{A}P}$
 $\overline{M\hat{A}P}$ (fig. 109).
La forme primitive équilatérale aux angles solides

obtus. L'incidence de d sur d' étant à peu près égale à celle de M sur la face de retour, la position de la face P , qui est perpendiculaire sur M , M' , fait connaître que ces dernières faces appartiennent au noyau. *De Lisle*, t. I, p. 607; var. 15. Incidence de d sur P , $140^{\circ} 59' 21''$. A Kapnick, en Transylvanie.

4. Baryte sulfatée rétroite. $\frac{M'HP}{M \text{ et } P}$ (fig. 110).

La forme primitive augmentée de deux faces verticales qui remplacent les deux arêtes longitudinales H les plus voisines. *De Lisle*, t. I, p. 608, pl. III, fig. 74. Incidence de M sur s , $142^{\circ} 46' 6''$. A Kapnick, en Transylvanie; et à Felschanya, en Hongrie.

5. Baryte sulfatée raccourcie. $\frac{M'G'R}{M \text{ et } P}$ (fig. 111).

La forme primitive augmentée de deux faces verticales qui remplacent les arêtes longitudinales G les plus éloignées. *De Lisle*, t. I, p. 608, pl. III, fig. 75. Incidence de k sur M , $129^{\circ} 15' 54''$. A Schennau, en Hongrie.

6. Baryte sulfatée trapéziennne. $\frac{\overset{\cdot}{A} \overset{\cdot}{K} P}{d \text{ et } P}$ (fig. 112),

vulgairement appelé *petrunt* en sabbé. *De Lisle*, t. I, p. 589, pl. III, fig. 64, et p. 589; var. 2, pl. III, fig. 57 et 65. Incidence de o sur P , $127^{\circ} 5' 15''$; de o sur la face de retour, $160^{\circ} 49' 34''$. Dans les mines de Hartz et de Saax.

a. Allongée. C'est celle que représente la figure.

4. *Elargie*. Le rectangle P a ses plus grandes dimensions adjacentes aux faces e, e' .

Les cristaux de cette variété, ainsi que ceux des suivantes, sont, en général, susceptibles d'une grande diversité dans le rapport de leurs dimensions. Tantôt les faces P se rapprochent en prenant une étendue considérable à proportion des autres faces, ce qui donne au cristal l'aspect d'une table à biseaux; tantôt ces mêmes faces P, plus écartées l'une de l'autre, se rétrécissent, de manière que le cristal se rapproche davantage de la forme prismatique.

7. *Baryte sulfatée épointée*. $\begin{array}{c} \overset{\overset{M}{\mid}}{\overset{\overset{A}{\mid}}{\overset{\overset{E}{\mid}}{P}}} \\ \underset{\underset{M}{\mid}}{\underset{\underset{d}{\mid}}{\underset{\underset{P}{\mid}}{P}}} \end{array}$ (Fig. 113).

De Lisle, *t. I*, p. 534 et suiv.; var. 5, 6, 7. Dans les mines de cinabre d'Espagne, du Palatin et du duché des Deux-Ponts; et à Rova, dans la ci-devant Autriche.

8. *Baryte sulfatée quadrifacée*. $\begin{array}{c} \overset{\overset{A}{\mid}}{\overset{\overset{A}{\mid}}{M\ P}} \\ \underset{\underset{d}{\mid}}{\underset{\underset{r}{\mid}}{M\ P}} \end{array}$ (Fig. 114). Quatre faces M dans le sens vertical, et dix en tournant dans le sens indiqué par les lettres d, r, P , etc. De Lisle, *t. I*, p. 538; var. 8, en prisme décimèbre. Incidence de r sur P, $162^{\circ} 2' 44''$. Dans les mines du Harz.

9. *Baryte sulfatée décapaèdre*. $\begin{array}{c} \overset{\overset{A}{\mid}}{\overset{\overset{A}{\mid}}{M\ G\ P}} \\ \underset{\underset{d}{\mid}}{\underset{\underset{r}{\mid}}{M\ k\ P}} \end{array}$ (Fig. 115).

La variété précédente augmentée de deux faces verticales k . Incidence de k sur P, 90° .

10. Baryte sillonnée équivalente. $\begin{array}{c} M'H \cdot \overset{\cdot}{A} \cdot \overset{\cdot}{E}P \\ M \cdot x \cdot d \cdot o \cdot P \end{array}$
(Fig. 116). La variété épointée augmentée de deux faces verticales x . Incidence de x sur P , 90° .

11. Baryte sillonnée additionnée. $\begin{array}{c} M'H \cdot H \cdot \overset{\cdot}{A} \cdot \overset{\cdot}{E}P \\ M \cdot x \cdot x \cdot d \cdot o \cdot P \end{array}$
(Fig. 117). La variété équivalente augmentée de quatre faces verticales x . Incidence de x sur x , $154^\circ 28' 21''$; de x sur M , $169^\circ 19' 41'' 50'''$.

12. Baryte sillonnée pentaédrique. $\begin{array}{c} G \cdot M'H \cdot \overset{\cdot}{A} \cdot \overset{\cdot}{E} \cdot \overset{\cdot}{B}P \\ \cdot \cdot \cdot M \cdot x \cdot d \cdot o \cdot x \cdot P \end{array}$
(Fig. 118). Huit faces verticales $\overset{\cdot}{A}$, M , x , etc. Huit obliques de part et d'autre, \cdot , x , d , etc., autour d'une face horizontale P . Incidence de x sur M , $154^\circ 28' 52''$, et sur P , $115^\circ 33' 8''$.

13. Baryte sillonnée octaédrique.....

$\begin{array}{c} G \cdot M'H \cdot H \cdot \overset{\cdot}{E} \cdot (\overset{\cdot}{E}B \cdot B) \cdot \overset{\cdot}{B} \cdot \overset{\cdot}{A} \cdot \overset{\cdot}{E}P \\ \cdot \cdot \cdot M \cdot x \cdot x \cdot o \cdot \gamma \cdot \cdot \cdot x \cdot d \cdot P \end{array}$ (Fig. 119). Huit faces en tournant dans le sens des lettres $\overset{\cdot}{A}$, \cdot , P , etc., et quinze dans chacune des parties adjacentes. Cette variété a été trouvée à Roza, par le citoyen Lacroix, professeur d'histoire naturelle à l'école centrale de Clermont-Ferrand, qui nous a envoyé un cristal d'une forme très-prononcée. Incidence de γ sur x , $161^\circ 40' 7''$; de γ sur \cdot , $155^\circ 57' 54''$.

Indéterminables.

14. Baryte sillonnée *exotée*, vulg. spath pointu

lentéculaire ou en cretes de coq. *De Lisle, t. I, p. 608*; var. 15. *Krauss-schabiger schwarer spath, Reuss, Diction., p. 18. Blätteriger schwarer spath, Emmerling, t. I, p. 569.* C'est une modification de la baryte sillonnée trapézoïdale, dont les bords sont obliqués et arrondis.

15. Baryte sillonnée bacillaire, c'est-à-dire, en *Augusta Stanger spath, Emmerling, t. I, p. 569.* Le spath pesant en lattes, *Brochant, t. I, p. 634.* Elle forme des prismes chargés de cannelures longitudinales, et dont la surface est comme nacrée. On la trouve à Freyberg.

16. Baryte sillonnée radiale. Bologneser stein, *Emmerling, t. I, p. 572.* Le spath de Bologne, ou la pierre de Bologne, *Brochant, t. I, p. 633.* En boules d'un diamètre plus ou moins considérable, dont l'intérieur est strié du centre à la circonférence, et dont la surface est toute hérissée de cristaux lenticulaires saillans par une portion de leurs bords. Le nom de pierre de Bologne a été donné à la variété dont il s'agit ici, parce qu'on la trouve au Mont Petrone, situé près de la ville de ce nom, en Italie. Une partie de ces masses sphéroïdales sont engagées dans une terre marneuse; mais beaucoup d'autres ont été entraînées par les eaux, et usées par le frottement, qui a fait disparaître les sillons, dont leur surface étoit chargée originairement. Plusieurs sont laminaires à

l'intérieur, mais de manière à présenter toujours des indices de structure rayonnée.

17. Baryte sulfatée concrétionnée. En dépôts mammelonnés ou arborescens, dont les axes alternent quelquefois avec celles de la chaux sulfatée.

On a nommé pierre de drappes une concrétion de baryte sulfatée, dont la forme contournée seite à peu près celle des intestins, et qui se trouve dans les salines de Wieliczka, entre des couches argileuses. *De Bern, catal., t. I, p. 169.*

18. Baryte sulfatée compacte. *Dichter schwer spath, Esseneritzg, t. I, p. 168.*

ACCIDENTS DE LUMIÈRE.

Couleur.

1. Baryte sulfatée blanche. Les cristaux de baryte sulfatée portent le nom de Derbyshire.

2. Baryte sulfatée jaunâtre. *À Baya.*

3. Baryte sulfatée rouge.

4. Baryte sulfatée olivâtre.

5. Baryte sulfatée bleueâtre.

6. Baryte sulfatée bruneâtre.

7. Baryte sulfatée bleue : rare. Quelques cristaux de baryte sulfatée peulvère.

8. Baryte sulfatée blanche.

Transparence.

1. Baryte sulfatée transparente.

2. Baryte sulfatée transiluide.

3. Baryte sulfatée opaque.

A P P E N D I C E.

Baryte sulfatée *feride*. Lapis hepaticus, *Waller*,
c. I, p. 172. Leberstein des allemands.

En masses lamineuses, blanches, jaunâtres, brunes
ou noires, qui rendent une odeur Rhodo, par
le frottement ou par l'action du feu. M. Manthey
m'en a donné un morceau, qui vient de Kongberg
en Norwège, et qui sert de gangue à de l'argent
natif.

A N N O T A T I O N S.

1. La baryte sulfatée accompagne souvent les
mines métalliques, en particulier celles d'antimoine,
de zinc, de mercure et de fer sulfatés. Dans les
mines de Hongrie, ses cristaux sont pénétrés par
des aiguilles d'antimoine, et l'on en trouve, au
dûché des Deux - Ponts, de la variété épointée,
à bords lisses, dont la surface est inégale et
agréablement ornée de cristaux cristallins d'un
rouge de rubis. La mine de Saint-Étienne, près
d'Offinbanya, en Transylvanie, fournit des cris-
taux de forme primitive, d'une transparence très-
nette et d'une couleur bleutée, entourés de
dodécédres de chaux carbonatée métastatique.
Ils sont cités dans le voyage minéralogique de
célèbre

célebre Esmark (1), qui a bien voulu m'en envoyer un groupe du plus beau choix.

Les cristaux de baryte sulfatée sont avec généralement d'un volume très-sensibles. Les plus gros que j'ai vus venoient de Royat, département du Puy-de-Dôme, et avoient cinq centimètres d'épaisseur.

2. On a confondu, pendant long-temps, la baryte sulfatée avec la chaux sulfatée, parce qu'on regardoit la terre qui servoit de base à la première, comme une simple modification de la chaux. On distinguoit la baryte sulfatée de l'autre substance, par le nom de *gypse pesant*, *gypsum ponderosum*. Macgregor aperçut, le premier, des différences entre ce prétendu gypse et le véritable. Mais c'est aux travaux de Gash, de Schéde et de Bergmann que l'on est redevable d'avoir reconnu enfin la baryte pour une terre toute particulière. Lavoisier soupçonna, depuis, d'après quelques expériences, que cette substance pourroit bien être d'une nature métallique; et Pelletier, pendant sa dernière maladie, confia à l'un de ses amis, le citoyen Delomieu, que ce soupçon étoit devenu pour lui une certitude. Le temps lui a manqué pour faire connaître les résultats de ses recherches, qui ne pouvoient être que très-intéressantes, quand même elles n'auroient pas été décisives, et c'est un regret

(1) Freyberg, 1798, p. 99.

de plus ajouté à tant d'autres que sa pente à l'isois.

3. La forme primitive de la baryte sulfatée se rapproche sensiblement de celle de la chaux carbonatée par les angles de ses rhombes, qui sont d'environ $101^{\circ} \frac{1}{2}$ et $78^{\circ} \frac{1}{2}$. Mais elle en est très-distinguée par la position de ses faces latérales, qui sont perpendiculaires sur les bases, en sorte qu'on pourroit la considérer comme un rhomboïde cubaire redressé. En partant des lois de décroissement les plus simples, on trouve, par la théorie, que les pans de la molécule constructrice sont presque des carrés. Or, la surface du carré est plus grande que celle du rhombe de même contour. Le rapport entre l'un et l'autre, dans le cas présent, est à peu près celui de 23 à 22, ce qui peut servir à expliquer pourquoi les coupes parallèles, aux bases des molécules, sont plus nettes et plus faciles à saisir que celles qui ont lieu dans le sens latéral, où le nombre des points de contact est plus considérable, à raison d'une plus grande étendue.

4. Pour observer la double réfraction de la baryte sulfatée, j'ai taillé un noyau transparent de cette substance, de manière à faire naître une facette artificielle qui, en partant de la grande diagonale E, E (fig. 107), faisoit, avec le résidu de la base, un angle d'environ 157° . En regardant alors une épingle à travers cette même facette et la

bases opposées , et en tenant cette épingle dans une direction parallèle à la grande diagonale , je voyois deux images irisées. J'ai cherché aussi le sens où la réflexion devenoit simple , et j'ai trouvé que ce cas avoit lieu , quand je regardois l'épingle à travers un des pans M , M , et une face artificielle qui coïncidoit avec un plan mené par les deux petites diagonales des bases. Je ne voyois plus alors qu'une seule image , quelle que direction que je donnasse à l'épingle.

5. La variété de baryte salitée , connue sous le nom de pierre de Bologne , paroit avoir fourni le plus ancien exemple d'un phosphore produit par la calcination. Vers le commencement de ce siècle , un nommé Garastiole , qui soupçonnoit , d'après la grande pesanteur et l'éclat de cette pierre , qu'elle contenoit de l'argent , la soumit à l'épreuve du feu. Mais au lieu du brillant métallique qu'il cherchoit , il n'obtint qu'une lueur rougeâtre , que la pierre calcinée répandoit dans les ténèbres. Il en fut moins réservé à publier le résultat de son expérience , que les physiciens s'empressèrent de répéter. Le procédé qu'ils ont employé pour obtenir ce que l'on a nommé phosphore de Bologne , consistoit à calciner fortement la pierre , puis à agglutiner sa poussière , au moyen d'un mélange de gomme , et à en former des espèces de petits gâteaux. On présentoit , pendant quelques secondes , un de ces gâteaux à la lumière ,

dont il s'imbiboit ; on le portoit ensuite dans l'obscurité , et on le voyoit luire comme un charbon allumé. Un phosphore étoit alors une espèce de merveille. Mais on a trouvé , depuis , un si grand nombre de substances qui , par différens procédés , produisoient des effets analogues , que suivant la remarque de Dufay , qui s'est beaucoup occupé de ce sujet , ce seroit plutôt aujourd'hui un phénomène singulier , qu'une matière qu'on ne pourroit rendre lumineuse , ni par calcination , ni par dissolution (1).

6. La baryte sulfatée n'est , parmi nous , d'aucun usage dans les arts. On prétend que les Chinois la font entrer dans la composition de leur porcelaine , et que la variété qu'ils emploient à cet usage , sous le nom de chikao , est semblable à la pierre de Bologne.

IV. E S P E C E.

B A R Y T E C A R B O N A T E E.

Carbonate de baryte des chimistes.

Baryte adète , carbonate de baryte naturel , de Bern , *t. I* , p. 267. Spath pesant adèt , ou terre pesante adète fluide ; Seloge. , *t. I* , p. 160. Carbonate barytique , Daubenton , *natl.* , p. 20. Witherit , Em-

(1) Mém. de l'Acad. des Sc. , 1780 , p. 522.

verding, *t. I*, p. 346. Barolite ou alabastré barytes ,
Kirwan, *t. I*, p. 139. La withérite, *Brachant*,
t. I, p. 565.

Caractères caractéristiques. Formant un dépôt blanc dans
 l'acide nitrique affaibli, avant de s'y dissoudre com-
 plètement.

Caract. physiq. Pesant spécif. 4,379.

Durcié. Broyant la chaux carbonatée, rayée par
 la chaux fluatée.

Phosphorescence. Sa poussière, jetée sur un char-
 bon ardent, devient lumineuse dans l'obscurité.

Caract. géom. Les masses informes offrent des
 joints étendus d'un seul longitudinal, et l'on peut
 présumer, d'après la forme des cristaux, que ces
 joints sont parallèles aux pans d'un prisme hexaèdre
 régulier; mais jamais, à cet égard, aucune obser-
 vation décisive.

Consistance, transparence, couleur, un peu ca-
 lide, ayant un aspect un peu gras.

Caract. chim. infusible.

Dans l'acide nitrique affaibli, elle se dissout avec
 une légère effervescence, en formant d'abord un
 dépôt d'une belle couleur blanche.

Analyse par Vauquelin.

Baryte.....	74,3.
Acide carbonique.....	25,7
	<hr/>
	100,0 (1).

(1) Cette analyse ne s'accorde pas avec celle qui donne

Caractères différenciels. 1°. Entre la baryte carbonatée et la baryte sulfatée. Celle-ci n'est point attaquée par les acides, et en particulier par l'acétique, qui dissout la baryte carbonatée. 2°. Entre la même et la strontiane sulfatée. Lorsque celle-ci fait effervescence avec l'acide nitrique, ce n'est qu'un accident, en sorte que la partie qui est de la strontiane sulfatée pure, reste intacte dans la liqueur, au lieu que la baryte carbonatée s'y dissout en entier; d'ailleurs, la pesanteur spécifique de la strontiane sulfatée est moindre, dans le rapport, d'environ 6 à 7. 3°. Entre la même et la strontiane carbonatée. Celle-ci a une pesanteur spécifique plus faible, à peu près dans le rapport de 6 à 7. Elle se dissout dans l'acide nitrique avec une effervescence beaucoup plus vive, et sans former d'abord un dépôt blanc. Sa fusion au chalumeau, ou la coloration du papier trempé dans sa dissolution, donne une belle teinte pourpre, ce qui n'a pas lieu pour la baryte carbonatée.

On a vu, dans le tableau ci-dessus, que

la baryte carbonatée est plus pesante que la strontiane sulfatée.

On a vu, dans le tableau ci-dessus, que la baryte carbonatée est plus pesante que la strontiane carbonatée.

Pelletier (*Ann. des Mines*, N°. 22, page 5), et d'après laquelle la baryte carbonatée contenait 62 de baryte, ou d'acide carbonique et 38 d'eau. Mais Yauguelin, après répéter plusieurs fois son opération, a trouvé constamment les quantités de baryte et d'acide carbonique, indiquées ci-dessus, sans aucune cristallisation, et Tenard en parvint au même résultat.

DE MINÉRALOGIE. 311
VARIÉTÉS
FORMES.

Déterminables.

1. Baryte carbonatée acutulaire. Prisme hexaèdre régulier, terminé par des pyramides hexaèdres incomplètes. Cette forme est du genre de celle que représente la fig. 47, pl. XLV. Incidence des faces qui répondent à x , sur les pans du prisme, $146^{\circ} 18'$ (1).

Indéterminables.

2. Baryte carbonatée striée.

ACCIDENS DE LUMIÈRE.

Couleurs.

Bar. carb. blanchâtre.

Transparence.

Bar. carb. transparente.

ANALYSE.

1. La baryte carbonatée a été découverte par le docteur Withering, ce qui lui a fait donner le nom de *withérite* par le célèbre Werner. On la trouve

(1) J'ai supposé que dans la pyramide existe complète, la perpendiculaire menée du centre de la base, sur un des côtés de cette base, éval à la hauteur de la pyramide comme 2 à 3, ce qui ne doit pas surprendre, car pour un à peu près.

en Angleterre, non pas à Aston-More, comme on l'avoit cru, mais à Anglesark, comté de Lancashire, dans une mine de plomb. Elle y est accompagnée de baryte sulfatée.

Les cristaux de cette substance sont, jusqu'ici, très-rare. Le conseil des mines en a acquies récemment un grès qui provenoit d'un creux fait par le Cdt. Lenoir, et dont l'observation m'a procuré, sur la cristallisation de cette substance, des connaissances plus précises que celles qui résultent des descriptions que j'avois lues dans quelques auteurs. On a cité plusieurs autres formes de la même substance, entre autres celle du prisme hexaèdre terminé par des pyramides, doubles, pareillement hexaèdres.

2. Diverses expériences prouvent que la baryte carbonatée est un poison pour les animaux. Ainsi est-elle connue, dans le pays, sous le nom de pierre contre les rats. Deux chiens de petite taille auxquels Pelletier avoit fait avaler de celle qui se trouve à Anglesark, à la dose de 15 grains, moururent en bout de quelques heures, après avoir éprouvé des vomissemens. Mais une égale quantité de baryte carbonatée artificielle, préparée avec de la baryte sulfatée de la ci-devant Auvergne, prise deux jours de suite par un autre chien, a seulement agi comme vomitif, et n'a point été mortelle (1).

(1) Journ. des mines, N°. 20, p. 35.

III. GENRE.

STRONTIANE.

PREMIÈRE ESPÈCE.

STRONTIANE SULFATÉE.

Sulfate de strontiane des chimistes.

Strontiane sulfatée, Journ. de phys., 1798, mars, p. 208 ; *idem*, Mém. de la Société d'Hist. Nat. de Paris, prairial, an 7, p. 129. Schewschel sur le strontianite, Ermanring, t. III, p. 312. Cotelin, Reue, Dict., p. 19. Strontiane, Daub., tabl., p. 19. Une partie des spaths sulfatés de de Lisle, t. I, p. 586 et suiv. La calcésine, Brochant, t. I, p. 640.

Caract. caractérist. Divisible en prismes rhomboïdaux, d'environ 165° et 75° ; colorant légèrement en rouge la partie bleue du dard de flamme produit par le chalumeau.

Caract. phys. Pesant. spécif. 3,5827—3,5841.

Durété: Rayant le chaux carbonaté, rayés par le chaux fluaté.

Réfraction, double.

Caract. géom. Forme primitive. Prisme droit à bases rhombes (fig. 120) pl. XXXV, dont les angles sont de $104^{\circ} 48'$ et $75^{\circ} 12'$. Les divisions parallèles aux bases sont très-nettes. Celles qui regardent les pans le sont beaucoup moins. Le prisme se subdivise dans le sens de deux plans qui passent par

les diagonales des bases. Ces dernières coupes ne sont bien sensibles qu'à une vive lumière.

Molécule intégrante. Prisme droit triangulaire à bases rectangles (1).

Cassé. chm. Mise sur la langue, après la calcination, elle y excite une saveur un peu aigre.

Colorant légèrement en rouge la partie bleue du dard de flamme produit par le chalumeau.

Analyse par Klaproth, de la strouviane sulfatée fibreuse de Pensylvanie.

Strouviane.	58.
Acide sulfurique.	42.
avec des traces de fer.	

100

Analyse par Vauquelin, de la strouviane sulfatée de Sicile.

Strouviane.	54.
Acide sulfurique.	46.

100.

La variété écaillée trouvée près de Montmartre, est mélangée d'environ un $\frac{1}{10}$ de chaux carbonatée.

Caractères distinctifs. 1°. Entre la strouviane sulfatée et la baryte sulfatée. Les divisions latérales de la pyramide sont sensiblement moins nettes, et les

(1) Dans la molécule séparatrice, la moitié de la grande diagonale, celle de la largeur et la hauteur, sont égales elles comme les trois nombres 3, 4 et 5.

angles des bases de sa forme primitive sont d'environ 102° et 75° , au lieu de $101^{\circ} \frac{1}{2}$ et $76^{\circ} \frac{1}{2}$. Elle a une pesanteur spécifique plus petite, dans le rapport, d'environ 9 à 10. Elle colore légèrement en rouge la flamme bleue produite par le chalumeau, ce que ne fait pas la baryte sulfatée. Mise sur la langue, après la calcination, elle n'y excite qu'une saveur légèrement acide, au lieu d'un goût très-désagréable. 2°. Entre la strontiane sulfatée fibreuse et la baryte carbonatée. La pesanteur spécifique de celle-ci est plus forte, dans le rapport, d'environ 7 à 6. Elle forme un dépôt blanc dans l'acide nitrique, et fait par s'y dissoudre en entier, au lieu que la strontiane sulfatée y reste sans éprouver d'altération, à moins qu'elle ne soit maltriquée de chaux carbonatée, auquel cas il se fait d'abord une effervescence qui s'arrête au bout d'un instant. 3°. Entre la même et la strontiane carbonatée. Celle-ci se dissout dans l'acide nitrique, et non l'autre.

V A R I É T É S

F O R M E S

Déterminables.

1. Strontiane sulfatée cristalline. $\frac{SrO}{SO_3}$ (fig. 124). En octaèdre le plus souvent cubiforme. De Lisle, t. I, p. 307. Spath strontien à sommets cubiformes, pl. III, fig. 33. Incidence de M sur M, 104°

48° ; de σ sur σ , $77^\circ 2'$; de σ sur la face de rotation, $102^\circ 58'$.

2. *Strontiane salifiée équerée*. $\overset{1}{M}\overset{1}{E}\overset{1}{K}\overset{1}{P}$ (fig. 122).

La forme primitive, dont les quatre angles solides aigus sont interceptés par des trapèzes σ , σ . Incidence de σ sur P , $128^\circ 35'$.

3. *Strontiane salifiée dissimulée*. $\overset{1}{H}\overset{1}{E}\overset{1}{K}\overset{1}{P}$ (fig. 123).

Prisme hexaèdre ordinairement court, dont les bases σ répondent aux arêtes latérales du noyau.

4. *Strontiane salifiée dodécaèdre*. $\overset{1}{M}\overset{1}{K}\overset{1}{A}$
 $\overset{1}{M}\overset{1}{\sigma}\overset{1}{d}$ (fig. 124).

De Lisle, t. I, p. 563. Spets. schindera, vol. 4. Incidence de d sur d , $78^\circ 28'$.

5. *Strontiane salifiée épointée*. $\overset{1}{M}\overset{1}{E}\overset{1}{A}\overset{1}{P}$
 $\overset{1}{M}\overset{1}{\sigma}\overset{1}{d}\overset{1}{P}$ (fig. 125).

La variété précédente, dérangée sur les arêtes con-
figées aux faces d , d . Incidence de d sur P , 140°
 $46'$.

6. *Strontiane salifiée entaillée*. $\overset{1}{M}\overset{1}{B}\overset{1}{E}\overset{1}{A}\overset{1}{P}$
 $\overset{1}{M}\overset{1}{\sigma}\overset{1}{\sigma}\overset{1}{d}\overset{1}{P}$ (fig. 126).

La variété précédente, dans laquelle chaque face M
est entaillée entre deux nouvelles faces σ , σ' . In-
cidence de σ sur M , $154^\circ 6'$; de σ sur σ' , $120^\circ 12'$.

7. *Strontiane salifiée anamorphe*. $\overset{1}{H}\overset{1}{A}\overset{1}{E}\overset{1}{K}\overset{1}{P}$
 $\overset{1}{\sigma}\overset{1}{\sigma}\overset{1}{d}\overset{1}{\sigma}\overset{1}{P}$

(fig. 127) pl. XXXII. La variété précédente, dans laquelle les arêtes comprises entre les faces M sont interceptées par des facettes *r* qui masquent entièrement ces mêmes faces.

L'idée que fait naître la première vue des cristaux de cette variété, est celle d'un prisme hexaèdre ayant pour bases les faces *r*, avec des facettes *d*, *e* sur le contour de ces bases. Mais dans cette position, qui est représentée fig. 128, le noyau est situé à contre-sens, et engagé dans le cristal, de manière que ses bases P ont une position verticale.

J'ai vu au Muséum d'histoire naturelle un très-beau groupe de cristaux blanchâtres de cette variété, dont les plus considérables ont environ 16 millimètres ou 7 lignes d'épaisseur. Ce sont ceux que j'ai décrits dans les annales de chimie, janvier, 1792, p. 3 et suiv., sous le nom de *spath pesant sphéroïdité*.

Indéterminables.

8. *Strontiane sulfatée fibreuse*. En masses composées d'aiguilles situées parallèlement entre elles. Fausser schreiet spath, *Beaus, Dict.*, p. 18 et 137.

9. *Strontiane sulfatée amorphe*. En masses grises et terreuses.

PSEUDOMORPHOSES.

10. *Strontiane sulfatée pseudomorphique lenticulaire*. Elle paroit avoir remplacé des cristaux lenticulaires de chaux sulfatée. Nous entrerons dans de

plus grande détails sur ces sortes de remplissemens , en parlant du quartz lenticulaire.

A C C I D E N S D E L U M I È R E .

Couleurs.

1. Strontiane *callotée* *bleue*.
2. Strontiane *call.* *bleue*âtre. La plupart des cristaux sont de cette couleur, qui a une apparence intense.
3. Strontiane *call.* *bleue*âtre. Quelques cristaux d'Espagne de la variété *dodécédèdre*, et plusieurs de ceux de la variété *filreuse*.

Transparence.

1. Strontiane *call.* *semi-transparente*.
2. Strontiane *call.* *translucide*.
3. Strontiane *call.* *opaque*.

A P P L I C A T I O N S .

1. La strontiane *callotée* abonde en Sicile, où ses cristaux, qui ont quelquefois jusqu'à 27 millimètres ou un pouce de longueur, sur un centimètre de largeur, garnissent les cavités des couches de soufre des vals de Neto et de Minara (1). Le citoyen Dolomieu en a fait détacher de superbes

(1) Voyez le *Journal de physique*, *nov.*, 1798, p. 225 et suiv.

groupes, dont quelques-uns pèsent 25 kilogrammes ou plus de 50 livres. Ils présentent ordinairement la forme de la variété épointée, et quelquefois celle de la dodécaèdre ou de l'octaèdre. Le citoyen Gillet a trouvé des cristaux de la même substance, mais plus petits, et semblables à la variété épointée, dans une carrière de chaux sulfatée, près de la commune de Saint-Médard, département de la Meurthe. La variété usuaire et l'épointée ont été rapportées d'Espagne par le Cit. Lussac, en cristaux d'une couleur blanchâtre. La même substance se trouve en Pennsylvanie, près de Frankstown (1), sous la forme de masses fibreuses, d'un bleu céleste pâle. Le Cit. Mathieu, de Nancy, a creusé au conseil des mines des morceaux qui avoient aussi le tissu fibreux, avec une nuance de blanchâtre, et qui avoient été retirés de la glauque de la commune de Beuvray, près de Toul, département de la Meurthe. Enfin, il existe, près de Montmarcy, une autre variété en masses informes, ayant un aspect terreux; et tout récemment les citoyens Ménaud et Lévain ont trouvé de ces masses, dont la surface étoit couverte de petits cristaux de la même substance, qui appartenaient à la variété épointée. Ils ont aussi observé, dans le même endroit, la structure sulfatée laminaire et lenticulaire.

(1) Voyez le journal de physique, mai, 1798, p. 214.

Toutes ces différentes modifications parurent d'abord, dans les collections de minéralogie, sous des noms empruntés. La strontiane sulfatée de Poudroule avait été prise, tantôt pour un gypse fibreux, et tantôt pour un spath pesant, avant que Klaproth déterminât sa véritable nature, à l'aide de l'analyse.

Les variétés cristallines ou informes provenant des autres localités, ont été de même confondues d'abord avec la baryte sulfatée ou le spath pesant. Les beaux cristaux de Sicile, surtout, se faisoient remarquer dans les cabinets d'histoire naturelle parmi ceux de l'autre substance. Romé de Lisle et plusieurs minéralogistes, avoient indiqué ce rapprochement dans leurs ouvrages, et je m'étois conformé moi-même à leur opinion, dans un temps où je n'avois entre les mains que des cristaux trop petits pour se prêter à une détermination rigoureuse.

Mais depuis, ayant été à portée d'en observer d'autres d'un volume beaucoup plus sensible et d'une forme très-nette, je m'aperçus que l'angle obtus de leur forme primitive étoit plus ouvert d'environ 34° , que dans les cristaux de baryte sulfatée qui se trouvoient à Roys, dans la ci-devant Auvergne; en Hongrie, et au Derbyshire, en Angleterre. Je ne pouvois supposer que cette différence fût l'effet de quelque loi de décroissement; car il auroit fallu en admettre une si rapide

et si compliquée, qu'une pareille hypothèse ait pu être regardée, avec raison, comme un abus de la théorie. D'une autre part, j'étois loin de soupçonner que les cristaux qui faisoient l'objet de la difficulté, fussent autre chose que de la baryte sulfatée, et cela d'autant plus, que je connoissois à peine de nom la *strontiane sulfatée*, et que je ne voyois d'ailleurs aucune substance, parmi celles que j'avois observées, à laquelle les cristaux dont il s'agit pussent être comparés; et plusieurs fois on m'avoit entendu, à l'école des mines, témoigner l'embarras où me jetoit une différence d'angles que je ne savois à quoi attribuer (1).

2. Les premières expériences qui aient attaqué la difficulté dans son véritable principe, ont été faites sur la variété en masses striées, qui se trouve près de Toul. L'examen d'un échantillon de cette substance fit reconnaître, au Cit. Lefèvre, que la terre qui en formoit la base étoit la *strontiane*.

Bientôt après, le Cit. Dolomieu, auquel Pelletier avoit dit que plusieurs espèces pouvoient contenir de la *strontiane* mélangée avec la baryte, et qui avoit soupçonné que si ce mélange avoit lieu, ce devoit être surtout dans les cristaux de Sicile, en remit au Cit. Vauquelin, pour être ana-

(1) Voyez le bulletin des sciences de la société philomathique, venise, an 6, p. 98, et le journal de physique, mars, 1798, p. 226.

lyade ; et ce célèbre chimiste trouva que la strontiane, qu'on avoit cru n'y exister que secondairement, y étoit seule combinée avec l'acide sulfurique , dans les proportions indiquées ci-dessus.

3. Dès ce moment toutes les incertitudes se dissipèrent ; et comme jusqu'alors aucun auteur , du moins que je sache , n'avoit décrit de formes cristallines comme appartenant à la strontiane sulfatée, je me servis de cette même différence dans les angles primitifs, qui avoit fait naître la difficulté, pour séparer les cristaux qu'on avoit associés, sans fondement, à la baryte sulfatée, de ceux qui devoient lui rester en partage.

4. On sait, au reste, que la strontiane est si voisine de la baryte par ses propriétés, que d'habiles chimistes ont douté, pendant quelque temps, si c'étoient deux terres réellement différentes ; et il semble que la cristallisation, en travaillant sur les substances composées de ces terres, avec un acide commun, ait voulu représenter, par l'analogie des formes, celle des principes constitutifs. C'est presque le même-moyeu de part et d'autre, et les cristaux secondaires offrent à l'œil des rapports d'aspect, que l'on peut comparer à ce que les botanistes ont appelé l'air de famille. La strontiane sulfatée unitaire paroit n'être qu'une simple modification de la baryte sulfatée binaire, dans laquelle l'angle formé par les faces M, M (fig. 1 a) est obtus, au lieu d'être aigu. On croit retrouver dans la stront-

tière cristalline hexaédrique, la variété de baryte cristalline que nous venons de rencontrer. Les autres variétés se prêtent à de pareils rapprochemens; ainsi, dans la variété encroûtée (fig. 126), il ne faut que supposer des facettes verticales à la place des arêtes x , pour avoir une forme analogue à celle de la baryte cristalline pentagone, et qui aura le même signe représentatif.

Il est vrai que dans toutes ces comparaisons, il y aura quelques angles semblablement situés, surtout celui que forment entre elles les faces primitives M , M , qui diffèrent d'une quantité sensible: c'est comme la boussole, qu'il ne faut jamais perdre de vue, pour éviter de s'égarer. Mais on peut voir, dans la cristallographie de Bond de Lisle, de quelle manière cet habile naturaliste, en se guidant par la mesure même des angles, et en supposant que l'octaèdre, qu'il regardoit comme la forme primitive, s'allongoit tantôt dans un sens, et tantôt dans l'autre, étoit parvenu à établir, entre les formes cristallines des deux substances, une relation qui faisoit disparaître, en partie, les différences extérieures qu'elles présentent, lorsqu'on a égard à la structure.

Ce n'est pas tout, et l'on pourroit avoir un rapprochement plus précis encore que celui de ce savant philosophe, en faisant toujours abstraction de la division subsculptée, et en supposant que, dans la strontiane cristalline, les faces latérales primitives

finient les faces d, d' (fig. 124, 125 et 126), qui font entre elles un angle de 70° $\frac{1}{2}$, sensiblement égal à l'incidence naturelle des faces correspondantes sur le noyau de la baryte sulfatée.

Pour mieux concevoir ce rapprochement, substituons ce dernier noyau à celui de la strontiane sulfatée, et donnons-lui la position indiquée par la fig. 130, où l'on voit que l'angle aigu E se présente en avant (1). Choisissons maintenant la variété entomée qui renferme toutes les autres, et disposons-la comme on le voit fig. 129, de manière que les faces M, M', les mêmes qui sont marquées d, d' (fig. 126), soient parallèles à M, M' (fig. 130). Dans ce cas, r (fig. 129) représentera M' (fig. 126), et l (fig. 129) représentera P (fig. 126). Quant aux faces σ, σ' (fig. 129), nous leur conservons leurs lettres indicatives, parce qu'elles ne sont parallèles à aucune faces primitives. Cela posé, le signe du cristal supporté au noyau (fig.

130), deviendra $\frac{M}{M} (\frac{\overset{1}{EB'B'}}{\sigma}) \frac{\overset{1}{E'H'A'}}{l \ l' \ \sigma}$.

Le tableau suivant fera connaître les mesures d'angles relatives aux deux hypothèses.

(1) Cet angle peut ici être obtus, par suite même de la position sous laquelle le prisme a été proposé, et qui a été choisie de préférence, parce qu'il en résulte un aspect plus favorable, relativement à la figure 129 qu'il en dépend.

Dans l'hypothèse de la structure cubique. Dans l'hypothèse de la baryte cubique.

Incidence de M sur M ... $78^{\circ} 28'$... $78^{\circ} 28'$.

de t sur t ... $104^{\circ} 48'$... $105^{\circ} 45'$.

de x sur t ... $154^{\circ} 8'$... $155^{\circ} 37'$.

de o sur o ... $102^{\circ} 58'$... $102^{\circ} 58'$.

On voit que les différences entre les angles donnés par les deux hypothèses ne vont pas au-delà d'un degré, et que celle qui appartient à la troisième n'est que de $9'$. Or, quelque en différence résultant de mesures prises avec beaucoup de soin sur des cristaux d'une forme très-nette, il est possible, après tout, qu'une erreur due à l'observation en produise de semblables. Mais la division mécanique s'oppose au rapprochement que nous venons d'indiquer; car je n'ai pu apercevoir de joints latéraux situés parallèlement aux faces d , d (fig. 126), mais il y en a de sensibles qui sont parallèles aux faces M , M , dont l'inclinaison, ainsi que je l'ai dit, est plus forte que celle des faces analogues dans la baryte cubique, d'environ $3^{\circ} \frac{1}{2}$, c'est-à-dire, d'une quantité facile à apprécier. De plus, les coupes parallèles à P sont beaucoup plus nettes que celles qui scindent la forme primitive en quatre prismes triangulaires. Or, elles devraient avoir, au contraire, peu de netteté dans l'hypothèse représentée (fig. 129), où les faces d qui leur correspondent seraient parallèles au plan qui passe par les grandes diagonales des bases du noyau.

Nous sommes donc fondés, aujourd'hui, à tracer une limite entre les substances qui présentent ces différences. Mais il faut convenir que c'étoit une erreur excusable, que celle qui faisoit confondre deux espèces sur lesquelles la nature a répandu des traits de ressemblance si nombreux et si marqués, qu'il falloit y regarder de bien près pour trouver l'endroit où elle a attaché la marque distinctive qui peut empêcher de prendre l'une pour l'autre.

5. Le caractère qui se tire de la double réflexion, établi entre ces espèces, une nouvelle analogie j'ai observé est elle, avec la stroutiame solitée, en regardant une épingle à travers une des faces a , a' (fig. 125), et la face opposée à P . Mais les images étoient simples, lorsque je regardois l'épingle à travers une des faces M , M' , et une face artificielle perpendiculaire sur la face P et parallèle aux arêtes x , c'est-à-dire, dans le sens d'un plan qui passeroit par les petites diagonales des bases de la forme primitive, ce qui est conforme au résultat que présente la baryte solitée. J'ai remarqué, en taillant le cristal qui m'a servi pour cette dernière observation, que la stroutiame solitée étoit plus difficile à polir que la baryte solitée, et que son poli étoit moins vif.

6. Lorsque l'on divise mécaniquement un cristal de stroutiame solitée, pour en extraire la forme primitive, les coupes parallèles aux pans sont moins nettes que celles qui se font dans le sens

des bases, et la différence même est sensiblement plus grande que dans la lauryte sulfatée. Ainsi le rapport donné par le calcul entre la surface des bases de la molécule constructive et celle des pans, qui est celui de 18 à 19, dans la première de ces substances, surpasse-t-il le rapport 22 à 23, qui a lieu dans la seconde.

1^{re} ESPÈCE.

STRONTIANE CARBONATÉE.

Carbonate de strontiane des chimistes.

Strontian earth united to carbonic acid; strontionit, *Scheele*, *system of mineralogy*, t. I, p. 463. Strontite de Hope; strontianite de Klaproth; carbonate de strontiane, *Pellletier*, *jeurn. des Mines*, n°. 21, p. 33 et 349. Kalken sauer strontianit, *Emmerling*, t. III, p. 310. Strontianit, *Kraus*, *dest.*, p. 19. Strontian earth combined with fixed air; strontianite, *Kraus*, t. I, p. 33a. La strontianite, *Brachant*, t. I, p. 437.

Caractère essentiel. Soluble avec effervescence dans l'acide nitrique. Le papier imbibé de sa dissolution et séché, brûle en répandant une flamme pourpre.

Caract. phys. Pous. spécif. 3,663 3,671.

Durété. Rayant la chaux carbonatée, tryée par la chaux fluatée.

Phosphorestrace. Sa poussière, jetée sur un charbon ardent, brûle dans l'obscurité.

Caract. géom. La division minérale se fait parallèlement aux pans d'un prisme hexaèdre régulier, et lorsqu'on fait mouvoir un fragment de la substance à une vive lumière, on aperçoit une espèce de lissant qui pourroit faire soupçonner d'autres joints naturels obliques à l'axe.

Caract. chim. Soluble avec effervescence dans l'acide nitrique.

Facile au chalumeau, en répandant une belle lueur pourpre.

Si l'on plonge un papier dans la dissolution par l'acide nitrique, et qu'après l'avoir fait sécher on l'allume, il brûle avec une flamme d'une couleur pourpre.

Analyse par Pelletier (1).

Strophia.....	62.
Acide carbonique.....	35.
Eau.....	3.
	<hr/>
	100.

Caract. distinct. 1°. Entre la strophia carbonatée et la beryte carbonatée. Celle-ci a une pesanteur spécifique plus grande, dans le rapport, d'environ 7 à 6; elle se dissout lentement, et avec peu d'effervescence, dans l'acide nitrique, en y formant

(1) Journ. des min., 2^e 10, p. 46.

d'abord un dépôt blanc ; la solution de la strontiane carbonatée est plus pesante et accompagnée d'une vive effervescence, sans aucun dépôt. La dissolution de celle-ci, par le chauxon, ou la combustion du papier qui a été imbibé de sa dissolution, donne une lueur purpurine ². Entre la même et la chaux carbonatée. Celle-ci a une pesanteur spécifique moindre, dans le rapport, d'environ 4 à 5; elle est rayée par la strontiane carbonatée; sa division mécanique donne deux bords obtus, au lieu de se faire parallèlement aux pans d'un prisme hexaèdre régulier.

VARIÉTÉS

FORMES.

1. Strontiane carbonatée prismatique. M. Schmeissner a eu la complaisance de m'envoyer un groupe, dont quelques cristaux présentent, avec sensiblement, la forme du prisme hexaèdre régulier.

2. Strontiane carbonatée aciculaire. En aiguilles fasciculées et parallèles entre elles.

3. Strontiane carbonatée striée.

ACCIDENS DE LUMIÈRE.

Couleurs.

1. Stront. carbonatée blanche.

2. Stront. carbonatée verdâtre.

*Transparence.**Stront. carb. translucide.**A N N O T A T I O N S.*

1. On trouve la strontiane carbonatée en Écosse, près de Strathin, dont le nom a donné naissance à celui de la terre qui sert de base à cette substance. Selon M. Schumacher, elle est accompagnée de plomb sulfuré et de baryte carbonatée.

2. Nous avons vu la baryte sulfurée et la strontiane sulfurée se rapprocher de très-près par leurs caractères géométriques; et d'après ce que nous connaissons des autres caractères, relativement à la baryte carbonatée et à la strontiane carbonatée, les formes primitives de ces deux substances ont aussi de l'analogie, du moins par la disposition de leurs faces latérales, qui paraissent tendre vers le prisme hexaèdre régulier, ce qui est déjà remarquable; mais les observations nous manquent jusqu'ici pour déterminer exactement les dimensions des deux molécules, et en saisir les différences. Il serait curieux de savoir jusqu'à quel degré la comparaison se soutient, sous ce point de vue, entre les combinaisons de la baryte et de la strontiane avec les acides sulfurique et carbonique.

3. Au reste, la strontiane carbonatée a des caractères qui la font ressortir plus nettement à côté de la baryte carbonatée, que ceux qui distinguent

la strontiane sulfatée de la baryte sulfatée; et nous devons ajouter ici que les deux premières substances diffèrent encore l'une de l'autre, en ce que la baryte carbonatée, prise intérieurement, a une qualité vésiculaire, au lieu que dans des expériences faites par Ehrenbach et par Pelletier, la strontiane carbonatée n'a paru avoir aucune influence nuisible sur l'économie animale (1).

IV. G E N R E.

MAGNÉSIE.

PREMIÈRE ESPÈCE.

MAGNÉSIE SULFATÉE.

Sulfate de magnésie des chimistes.

Sal neutrum acidulare, *Wadler*, t. II, p. 71. Vitriol de magnésie; sel d'Angleterre; sel d'Epson; sel de Sedlitz, de Lüne, t. I, p. 305. Magnésie vitriolée; sel amer, etc., de *Bern*, t. II, p. 30. Magnésie vitriolée, *Scopoli*, t. I, p. 113. Naturalisches bittrische, *Kreuzberg*, t. II, p. 14. Sel d'Epson, *Daubenton*, tablon, p. 28. Epson salt, *Karwan*, t. II.

Caractère essentiel. Saveur très-amère. Non déliquescens.

(1) *Journ. des sçav.*, N°. 20, p. 52.

Caract. phys. Saveur très-amère.

Réfraction, double.

Cassure, transverse et souvent longitudinale ; conchoïde.

Caract. géom. Forme primitive. Prisme droit tétraèdre (fig. 131) *pl. XXXII*, dont les bases sont des carrés, divisible en deux moitiés par une des diagonales des bases, que nous supposons être celle qui passe par l'angle H et par son opposé. Les divisions parallèles aux plans s'aperçoivent rarement et sont peu sensibles ; celles qui se font diagonalement sont très-nettes et faciles à obtenir.

Molécule intégr. Prisme droit triangulaire, dont les bases sont des triangles rectangles isocèles (1).

Caract. chim. Fusible à un léger degré de chaleur.

Soluble dans une quantité d'eau froide moindre que le double de son poids, et dans une quantité d'eau chaude qui excède à peine la moitié de son poids.

Analyse par Bergmann.

Magnésie.....	19.
Acide sulfurique.....	53.
Eau de cristallisation.....	48.

100.

Caractères distinctifs. Entre la magnésie sulfatée

(1) Si l'on suppose que la fig. 131 représente la molécule soustruée, on aura B et C, et B ou C : H :: 16 : 2.

et les autres substances acidifères nommées acide. Elle en diffère par sa saveur amère ; de plus , elle ne détone pas avec un corps combustible comme la potasse nitratée , ne décrépite point au feu comme la soude muriatée , ne finit point par s'y convertir en verre comme la soude boratée , n'est point soluble avec effervescence dans l'acide nitrique comme la soude carbonatée , ne se volatilise pas au feu comme l'ammoniaque muriatée , et ne cristallise point en octaèdres réguliers comme l'alumine sulfatée , dont les cristaux ne présentent d'ailleurs aucun joint bien sensible.

V A R I É T É S.

F O R M E S .

(Les six premières variétés ont été décrites d'après des produits de la cristallisation obtenus par l'art).

Déterminations.

1. Magnésie sulfatée binaire. $\begin{array}{ccccccc} M & T & C & a & b & B \\ M & T & I & & & P \end{array}$

(*Fig. 13a*). Prisme rectangulaire à sommets dièdres, étendu en sens contraire , de manière que les arêtes auxquelles ils correspondent alternent entre elles sur les deux bases. De *Linné*, *s. I*, p. 308. Incidences de *M* sur *T* 90° ; de *I* sur *M* , $159^{\circ} 14'$.

2. Magnésie sulfatée pyramidale. $\begin{array}{ccc} MT & BC & \\ MT & a & I \end{array}$ (*Fig. 13b*).

Prisme rectangulaire terminé par deux pyramides tétraédres. *De Lisle, t. I, p. 310* | Var. 3, 3 et 4. Incidence de *s* sur T, $129^{\circ} 14'$. Cette forme est celle que prend le plus communément la magnésie solitaire.

3. Magnésie solitaire *trisénaire*. $\begin{array}{c} \text{MT} \quad \text{G} \quad \text{B} \quad \text{C} \\ \text{MT} \quad \text{o} \quad \text{n} \quad \text{d} \end{array}$

(*Fig. 134*). La variété précédente, dont deux arêtes verticales opposées sont interceptées par des facettes. Incidence de *o* sur M, 155° .

4. Magnésie solitaire *tritétraédre*. $\begin{array}{c} \text{G} \quad \text{MT} \quad \text{B} \quad \text{C} \quad \text{E} \\ \text{o} \quad \text{MT} \quad \text{n} \quad \text{d} \quad \text{r} \end{array}$

(*Fig. 135*). La variété précédente, dans laquelle les arêtes terminales qui répondent aux deux nouvelles facettes verticales sont elles-mêmes remplacées par des facettes. Incidence de *r* sur *o*, 129° .

5. Magnésie solitaire *diploédre*. $\begin{array}{c} \text{MT} \quad \text{G} \quad \text{G}' \\ \text{MT} \quad \text{o} \quad \text{x} \end{array}$

$\begin{array}{c} \text{C} \quad \text{e} \quad \text{B} \quad \text{B}' \\ \text{d} \quad \text{p} \end{array}$ (*Fig. 136*). La variété bisulterne (*Fig. 132a*), dont deux arêtes verticales opposées sont interceptées par des facettes gemées. Incidence de *x* sur M, $161^{\circ} 55'$.

6. Magnésie solitaire *plagiédre*. $\begin{array}{c} \text{MT} \quad \text{A}^{\frac{1}{2}} \text{B}^{\frac{1}{2}} \text{H} \\ \text{MT} \quad \text{x} \end{array}$

$\begin{array}{c} \text{B} \quad \text{C} \\ \text{n} \quad \text{d} \end{array}$ (*Fig. 137*). La variété pyramidée, dont les arêtes solides à la base des pyramides sont interceptées.

tés par des feuillets situés de biais. Incidence de x sur M, $104^{\circ} 30'$, de x sur T, $150^{\circ} 30'$

Indiscernables.

5. Magnésie sulfatée concrétionnée.
6. Magnésie sulfatée fibreuse.
9. Magnésie sulfatée pulvérolente.

ACCIDENS DE LUMIÈRE.

Colours.

1. Magnésie sulfatée écaillée.
2. Magnésie sulfatée blanchâtre.

Transparence.

Magnésie sulfatée translucide.

ANALYSE.

1. La magnésie sulfatée emprunte les noms sous lesquels on l'a connue d'abord, des lieux particuliers dont on la tiroit le plus abondamment, tels que la fontaine d'Epsea, en Angleterre, et les carri. de Seilts, village de Bohême. Elle existe aussi dans les carri. d'Egre, ville du même pays. M. Schumacher dit qu'on la trouve dans les Alpes et en Suisse, sous une forme pulvérolente, et quelquefois en masses, ou à l'état d'incrustation, avec un filon fibreux (1). On en a découvert à Montmartre qui étoit de même

(1) *A system of mineralogy*, t. 1, p. 269.

à l'état pulvérulent, et qui adhéroît aux parois d'une carrière de plâtre à ciel ouvert, située en face du Dôme des Invalides. Le citoyen Chaptal dit que ce sel existe dans toutes les eaux potables des environs de Montpellier, et qu'il effleuroit quelquefois sur les schistes, où l'on peut le recueillir. Il en a trouvé sur une montagne du ci-devant Roussas, en assez grande quantité, pour en permettre l'exploitation, et il observe que les mineurs de poux en étoient avides (1).

2. Les cristaux de cette substance, lorsqu'ils sont purs, et qu'on a soin de les tenir enfermés, se conservent très-bien. J'en ai de limpides qui, depuis plus de douze ans, n'ont encore éprouvé aucune altération sensible.

3. J'ai observé la double réfraction de la magnésie sulfatée, en regardant une épingle située horizontalement à travers une lamette artificielle, dont la position étoit analogue à celle de la face *b* (fig. 13a), et le pou opposé à *M*. Cette lamette faisoit avec *M* un angle d'environ 150° , d'où il suit que l'angle réfringent étoit de 30° .

4. La magnésie sulfatée est un des purgatifs salins les plus employés en médecine.

A P P E N D I C E.

Magnésie sulfatée cristallifère, concrétiionnée, rougeâtre.

(1) *Annales de chimie.*

Cobalt

Cobalt vitriolé, vitriol de cobalt, sulfate de cobalt, de Born, *t. II*, p. 45.

On la trouve à Herrensgrund, en Hongrie, dans les mines de cuivre gris et de cuivre pyriteux, où elle est accompagnée de quartz et de chaux sulfatée. Elle est d'un rouge de rose pâle, dû au mélange d'une petite quantité de cobalt oxydé. J'en ai reçu de M. Ramark (1) un échantillon, dont une partie, analysée par le Citoyen Vanquelin, lui a présenté tous les caractères de la magnésie sulfatée. La présence du cobalt qu'elle contenait a été indiquée par la couleur bleue qu'a prise le borax fondu au chalumeau avec un petit fragment de la substance dont il s'agit.

17. E S P È C E.

M A G N È S I E B O R A T É E.

Borax magnésien des chimistes.

Quartz cubique. *Journ. de phys.*, août, 1783, p. 501. Spath boracique, *Sciogr.*, *t. I*, p. 190. Borax magnésio-calcaire, *Annales de chimie*, *t. II*, p. 101. Chaux boracique, de Born, *t. I*, p. 579. Boraxit, *Erzwürfelg.*, *t. I*, p. 509. Spath boracique, *Doubenton*, *tabl.*, p. 10. Calc combined with the boracic acid, or boracified calc., *Kirwan*, *t. I*, p. 179. La boracite, *Brochant*, *t. I*, p. 589.

(1) Voyez le voyage minéralogique de ce travail, p. 51.

Caractère acoustiel. Electrique par la chaleur en huit points opposés deux à deux.

Caract. phys. Pesant. *spécif.*, 2,566.

Durété. Rayant le verre.

Electricité. Electrique par la chaleur en huit points opposés deux à deux, dont quatre acquièrent l'électricité vitrée, et les quatre autres la résineuse.

Caract. géom. Forme primitive. Le cube (*fig. 91*) *pl. XXXIII*. Les joints naturels sont peu sensibles et seulement à une vive lumière.

Molécule histér., *id.*

Cassure. Un peu caduée.

Caract. chim. Fusible au chalumeau avec bouillonnement, en émail jaunâtre, hérissé de petites pointes, qui, par un feu prolongé, sont lancées comme des étincelles.

Analyse par Westrumh.

Acide boracique.....	68,00.
Magnésie.....	13,50.
Chaux.....	11,00.
Alumine.....	1,00.
Oxyde de fer.....	0,55.
Silice.....	2,00.
	<hr/>
	96,05.

Cette substance, que j'avois d'abord nommée *chaux borée*, d'après l'opinion de plusieurs chimistes célèbres, vient d'être analysée de nouveau par le Ch. Vauquelin et M. Schmitt, avant de

Philadelphie. Quoique les circonstances ne leur aient pas permis de déterminer, avec une entière précision, le rapport de ses principes composants, il résulte de leur travail que l'acide boracique y est directement combiné avec la magnésie. Quant à la chaux, elle s'y trouvoit en quantité beaucoup moins sensible que dans le résultat de Westrumb, et l'on a jugé qu'elle y étoit à l'état de carbonate, d'après l'effervescence que la poudre des cristaux de borax excitoit dans l'acide nitrique. Ces cristaux étoient opaques, et l'on a présumé que si l'on en soumettoit de transparents à l'analyse, la chaux carbonatée y seroit nulle, comme étant étrangère au véritable type de l'espèce.

Caract. distinctif. Les cristaux de magnésie boratée sont faciles à distinguer de ceux des autres substances qui prennent la forme cubique, par la propriété qu'ils ont de s'électriser à l'aide de la chaleur, et par le défaut de symétrie entre leurs parties correspondantes.

VARIÉTÉS.

FORMES.

1. Magnésie boratée défective.
$$\begin{array}{ccccccc} P & B & A & a & c & E \\ P & a & a & & & E \end{array}$$

(Fig. 90). Les parties qui répondent aux angles solides E, a de la forme primitive (Fig. 91), dif-

Y 2

finent par défaut de celles qui répondent aux angles opposés. Cube incomplet dans ses douze arêtes et dans quatre seulement de ses angles saillies. Incidences de r sur P, $125^{\circ} 13' 52''$; de s sur P, 133 .

a. Magn. borée *surabondante*. $\frac{PBA \cdot A' \cdot A''}{P \cdot r \cdot r}$

$\frac{A' \cdot A''}{r \cdot r}$ (fig. 53). Les angles qui, dans la variété précédente, étoient intacts, *surabondent*, au contraire, en facettes, chacun étant intercepté par quatre, tandis qu'il n'y en a toujours qu'un à chacun des angles opposés. Les premières facettes, telles que s, r, r, r , ont ordinairement un aspect terne et mat, au lieu que les secondes ou celles qui sont solitaires, ont leur surface lisse et brillante. Incidences de r sur P, $125^{\circ} 13' 52''$; de r sur P, $144^{\circ} 44' 37''$.

A C C I D E N S D E L U M I È R E.

Couleur.

1. Magn. borée *blanchâtre*.
2. Magn. borée *gris*.
3. Magn. borée *violet*. La teinte de violet est ordinairement légère.

Transparence.

1. Magn. borée *transparente*.

2. Magn. borat translucide.

3. Magn. borat opaque.

DESCRIPTION.

1. On trouve les cristaux de magnésia boraté auprès de Lünebourg, dans le duché de Brunswick, au haut d'une montagne appelée *Kalkberg*, où ils sont engagés dans des couches de chaux sulfatée en masses opaques. La plupart ont entre quatre et six millimètres d'épaisseur ; mais il y en a de beaucoup plus petits, et d'autres dont l'épaisseur va jusqu'à un centimètre. La forme de ceux qui se sont bien conservés, a toute la perfection à laquelle la cristallisation puisse atteindre ; mais beaucoup sont comme corrodés à leur surface.

2. Ces cristaux étoient connus depuis long-temps à Lünebourg, mais seulement comme une de ces productions qui servent à amuser un instant la curiosité, lorsque Laves, en 1787, porta sur cet objet l'attention des savans. Ils firent près d'abord pour du quartz cubique, en quoi les naturalistes firent moins bien que le peuple, qui les appeloit simplement pierres cubiques. Mais Westrumb en ayant entrepris l'analyse, quelque temps après, découvrit qu'ils étoient composés d'acide boracique uni à la magnésie et à la chaux (1), résultat d'autant plus

(1) *Annales de chimie*, t. II, p. viii et ciii.

intéressant, que l'existence de cet acide dans les corps naturels, avoit été plutôt soupçonnée que prouvée, puisqu'on doutoit si le borax n'étoit pas un produit de l'art.

3. Ayant reçu, en 1791, deux cristaux de magnésie boracée qui appartenoient à la première variété, et qui étoient les seuls que j'eusse encore vus, je les exposai au feu, et les présentai ensuite au petit appareil électrique, suivant l'usage où je suis de soumettre les nouvelles substances à toutes les épreuves capables d'en développer les propriétés. Je m'aperçus que la chaleur les avoit électrisés, et qu'ils avoient même plusieurs points sollicités par des électricités différentes (1). J'éprouvai d'abord de la difficulté à déterminer les positions précises de ces points, tant à cause de la petitesse des cristaux, que parce que ces sortes d'expériences sont délicates en elles-mêmes. Mais la comparaison de ces cristaux avec les tourmalines, me fit faire réflexion que, dans celles-ci, il n'y avoit qu'un seul axe, qui se confondoit avec celui du noyau, et que, par une suite nécessaire, il ne devoit y avoir que deux pôles électriques, situés aux deux extrémités de cet axe, au lieu que dans le cube, qui étoit le noyau de

(1) J'ajoutai, à l'article de la scaramite, les principes nécessaires pour bien concevoir les phénomènes que présentent les corps susceptibles de s'électriser par la chaleur.

la magnésie borée, il y avoit quatre axes, dont chacun passoit par deux angles solides opposés, d'où il résulta qu'il devoit y avoir huit pôles électriques, deux pour chaque axe. Cette remarque, que l'expérience vérifia ensuite, en fit naître une autre qui concernoit les cristaux dont il s'agit à l'analogie des tourmalines, en ce qu'il y avoit une différence de conformation entre les parties dans lesquelles résidoit la vertu électrique, dont les uns présentoient des angles solides complets, et les autres des facettes qui interceptoient les angles opposés; et cette différence, qui n'étoit relative qu'à deux points dans la tourmaline, se multiplioit ici à proportion du nombre des axes. J'observai aussi que l'électricité résineuse étoit à l'endroit des angles complets, et l'électricité vitrée à l'endroit des facettes opposées à ces angles (1).

Je ne sais si, au milieu de l'appareil imposant de nos machines artificielles, et de cette diversité de phénomènes qu'il offre à l'œil captivé, il y a quelque chose de plus propre à exciter l'intérêt des physiciens, que ces petits instrumens électriques exécutés par la cristallisation, que cette réunion d'actions distinctes et contraires renfermées dans un cristal qui peut n'avoir pas deux millimètres d'épaisseur; et lui servir l'observation déjà faite tant de fois, que les productions de la nature, qui semblent

(1) *Annales de chimie*, t. IX, p. 59 et suiv.

venant se cacher à nos regards, sont quelquefois celles qui ont le plus de choses à nous montrer.

4. L'électricité des cristaux dont il s'agit est, en général, sensiblement plus faible que celle des tourmalines. Les expériences qui servent à la constater, exigent des soins de la part de l'observateur, surtout par rapport aux actions répulsives, qui n'ont lieu que dans un très-petit espace, en sorte que pour obtenir, par exemple, la répulsion d'un des pôles résineux sur un petit corps qui soit lui-même à l'état d'électricité résineuse, il faut diriger exactement ce corps vers le pôle répulsif, autrement il seroit attiré vers les pôles voisins, qui sont dans l'état naturel, ou à peu près (1).

5. Dans la suite, ayant reçu aussi des cristaux de la seconde variété, qui est beaucoup plus commune, je trouvai qu'ils avoient des facettes à la place des huit angles solides du cube primitif, ce qui est fait, en totalité, seulement vingt-six facettes, comme l'ont dit Westrumb et d'autres naturalistes, si les facettes dont il s'agit eussent toutes été solitaires. Mais les quatre qui avoient l'électricité résineuse et répondoient aux angles complets de la première variété, étoient accompagnées chacune de trois

(1) Il en est, à cet égard, des cristaux de magnésie boracée comme de ceux de tourmaline, où les centres d'action sont très-loin des extrémités, et où la densité électrique, diminueant ensuite rapidement, devient bientôt nulle ou presque nulle. Voyez l'article de la tourmaline.

autres, ainsi que le représente la fig. 33 (1). Au reste, ces dernières facettes, outre que leur aspect est terne, sont, en général, si faiblement exprimées, qu'elles échapperoient à l'œil, ou qu'on seroit tenté de les négliger, si leur existence n'étoit liée à un point de physique qui appelle sur elles l'attention (2). On dirait que la cristallisation ne s'est opérée qu'avec peine à l'action de la cause qui tendoit à l'écartier de sa symétrie ordinaire.

(1) On lit, dans la minéralogie de Del Rio, p. 289, le passage suivant : « Haüy a dit que ses cristaux [ceux de l'oxide magnétique] étoient réellement tronqués dans leurs angles obtus, et que l'électricité de ceux-ci étoit positive, et celle des angles aigus négative. Cependant, dans ceux que Warronk a décrits, et dans tous ceux que je possède, avec tous les angles tronqués, ils sont alternativement positifs et négatifs ». Le célèbre auteur, qui s'occupe ici que l'article des cristaux de rhombo, où j'ai publié mes premiers résultats, raisonnait d'après les observations qu'il avoit faites sur la seconde variété, et il ne parloit pas avoir tenu compte des facettes qui troubloient la symétrie.

(2) M. Marie, de la société royale de Londres, l'un des auteurs qui se sont livrés avec le plus de soin et de succès à l'étude de la cristallographie, a vu, sur quelques cristaux, au moyen de la loupe, autour des faces a' (fig. 33) qui répondent au siège de l'électricité vraie, les vestiges de trois nouvelles facettes autrement situées que celles qui accompagnent les faces opposées, mais dont il étoit impossible, à cause de leur extrême petitesse, d'estimer exactement les positions. Ainsi c'étoit bien de part et d'autre le même nombre de facettes, mais le défaut de symétrie existoit toujours.

S E C O N D O R D R E.

SUBSTANCES ACIDIFÈRES ALKALINES,

Composées d'un acide uni à un alkali.

P R E M I E R G E N R E.

P O T A S S E.

E S P È C E U N I Q U E.

P O T A S S E N I T R A T É E.

Nitrate de potasse des chimistes.

Nitrum terræ mineralatum, *Waller*, t. II, p. 45. Nitre ou salpêtre, de *Lavois*, t. I, p. 380. Alkali végétal nitré; salpêtre; nitrate de potasse, de *Born*, t. II, p. 17. Naturlicher salpeter, *Ersmorling*, t. II, p. 16. Alkali végétal nitré, *Sciagr*, t. I, p. 84. Nitre ou salpêtre, *Douleson*, *ibid.*, p. 27. Nitre, *Kirwan*, t. II, p. 28.

Caractère caractérl. Non déliquescents. Détonent avec un corps combustible.

Caractère phys. Réfraction simple.

Saveur, d'abord un peu douce et ensuite désagréable.

Caract. géom. Forme primitive. Octaèdre rectangulaire (fig. 138) pl. XXXIII, divisible parallèle-

ment à la base commune des deux pyramides, dont l'une a son sommet en I , et l'autre au point opposé.

Molécule triangulaire. Tétrèdres irrégulier (1).

Caract. chim. Soluble dans 3 ou 4 fois son poids d'eau froide, et dans la moitié de son poids d'eau bouillante.

Déto nation par le feu, avec un corps combustible.

Analyse par Bergmann.

Potasse.....	49.
Acide nitrique.....	33.
Eau de cristallisation.....	18.

100.

Caractères distinctifs. 1°. Entre la potasse nitrée et la chaux nitrée. La première n'est point déliquescante comme l'autre. 2°. Entre la potasse nitrée et les autres substances acides, dont l'acide n'est point le nitrique. Celles-ci ne détonent point, comme la potasse nitrée, avec un corps combustible.

(1) Soit en (fig. 153) l'octaèdre primitif, ayant mené l'axe ac de la pyramide $acdefg$, menées les hauteurs ad , ae des triangles acd , ace , puis ce et ce' , on aura $ac' = ac$, $ce' = ce$, et $ce' = ce' = ce' = 1$.

T R A I T É V A R I É T É S. F O R M E S.

(Les 7 premières variétés ont été décrites d'après des cristaux produits dans les manufactures de salpêtre.)

Déterminations.

1. Potasse nitratis primitive MP. (fig. 138). De Liéle, t. I, p. 351. Incidences de M sur M, 60° , et sur la face de retour, 120° ; de P sur P, $62^\circ 40'$, et sur la face de retour, $111^\circ 14'$.

2. Potasse nitratis hexaèdre. $\begin{smallmatrix} M & T & P \\ M & A & P \end{smallmatrix}$ (fig. 140). De Liéle, t. I, p. 351; var. 1. Incidences de A sur M, 120° ; de A sur P, $124^\circ 23'$.

3. Potasse nitratis tétraèdre. $\begin{smallmatrix} T & M & T & P & B \\ I & M & A & P & B \end{smallmatrix}$ (fig. 141). Les variétés pélochétes, émarginées à la jonction de ses trapèzes. De Liéle, t. I, var. Incidences de I ou de B sur A, 90° .

4. Potasse nitratis rhomboïde. $\begin{smallmatrix} M & T & I & A \\ M & A & x & i \end{smallmatrix}$ (fig. 142). Prisme hexaèdre régulier, terminé par des pyramides hexaèdres, dont l'incidence sur les pans diffère peu de celle qui a eu lieu dans les cristaux de quarts. De Liéle, t. I, p. 345; var. 6. Incidence de x sur A, ou de i sur M, $145^\circ 51'$.

Ordinairement la pyramide se termine en arête horizontale.

5. Potasse nitrée constriction. $\begin{array}{c} M \cdot T \cdot \overline{1} P B \\ M \cdot h \cdot x P \cdot \overline{1} \end{array}$ (Fig.

143). La variété haute, émarginée de part et d'autre des faces P. Incidence de x sur h , $108^{\circ} 53'$.

6. Potasse nitrée quadrangulaire. $\begin{array}{c} M \cdot T \cdot \overline{1} A P A B A \\ M \cdot h \cdot x \cdot P \cdot y \cdot x \cdot z \end{array}$

(Fig. 144). La variété tétraèdre augmentée de part et d'autre de deux nouvelles rangées de facettes. Incidence de x sur M , $143^{\circ} 54'$, la même que celle de x sur h ; de y sur M , $124^{\circ} 24'$, la même que celle de P sur h ; de z sur M , $108^{\circ} 53'$, la même que celle de x sur h .

Cette variété est remarquable par les incidences égales des faces d'un même rang, quoique produites en vertu de différentes lois de décroissement.

Ce résultat qui est général pour tous les octaèdres, dont les faces M , M (Fig. 138) font entre elles des angles de 120 et 60 degrés, dépend de ce qu'à une loi quelconque de décroissement, qui agit sur la face P, répond toujours une autre loi qui, ayant lieu sur la face M, donne une facette inclinée de la même quantité que celle qui naît du premier décroissement.

Le tableau suivant présente la série de ces lois simultanées, jusqu'à une certaine limite. Les lettres placées à la gauche de chaque colonne ont rapport aux décroissements sur la face P, soit en croissant de

l'angle I vers l'acte B, soit en descendant de celle-ci vers l'angle I. On s'y est borné aux quatre lois les plus simples, en ajoutant la lettre P, qui indique des faces parallèles à celles du noyau. Les lettres à droite font connaître les décroissemens sur la face M, en partant de l'angle A, lesquels correspondent aux précédens.

à T répond M

à B répond décro.

$$\begin{array}{r} \overset{+}{\text{I}} \dots\dots \text{A} \\ \quad \quad \quad \text{I} \\ \overset{+}{\text{I}} \dots\dots \text{A} \\ \quad \quad \quad \text{I} \\ \overset{+}{\text{I}} \dots\dots \text{A} \\ \quad \quad \quad \text{I} \\ \text{P} \dots\dots \text{A} \\ \quad \quad \quad \text{I} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \overset{+}{\text{B}} \dots\dots \text{A} \\ \quad \quad \quad \text{I} \\ \overset{+}{\text{B}} \dots\dots \text{A} \\ \quad \quad \quad \text{I} \\ \overset{+}{\text{B}} \dots\dots \text{A} \\ \quad \quad \quad \text{I} \\ \overset{+}{\text{B}} \dots\dots \text{A} \\ \quad \quad \quad \text{I} \end{array}$$

On voit, par ce tableau, que les quatre signes T, I, P et B sont les seuls qui aient pour analogues des signes dont l'exposant n'exprime aucune loi intermédiaire, et ne va pas au-delà du nombre 4 (1). Or, ce sont précisément ceux qui expriment les lois relatives au cristal dont il s'agit ici; d'où il ré-

(1) A l'égard du signe B, qui exprime une face horizontale, il n'a point d'analogues, parce qu'alors la face M se trouve masquée par l'effet du décroissement qui agit sur B, et ainsi on ne rapporte point à la question présente.

sauf que ces lois sont les plus simples possibles, si non en elles-mêmes, du moins dans leur ensemble, ce qui m'a paru rendre cette variété digne d'attention sous un nouveau point de vue (1).

Indéterminables.

7. Potasse nitrée aciculaire. C'est le produit de la cristallisation confuse de cette substance, qui se montre alors sous la forme de prismes défilés, ou de petits cylindres striés suivant leur longueur, et irrégulièrement terminés de part et d'autre.

8. Potasse nitrée fibreuse, vulgairement *salpêtre de lissage*. Elle se trouve en filets soyeux sur les plâtres des vieux bâtimens, ou à la surface de la terre.

A C C I D E N S D E L'U N I T É.

Couleur.

1. Potasse nitrée blanche.
2. Potasse nitrée blanchâtre.

Transparence.

1. Potasse nitrée demi-transparente.
2. Potasse nitrée translucide.

A D D I T I O N S.

1. La potasse nitrée, ou le salpêtre, se forme journellement dans les endroits qui, comme les dou-

(1) Voyez la partie générale, p. 51 et suiv.

ries, les étables et les écuries, renferment des matières animales et végétales en putréfaction, ou sont exposés aux émanations de ces substances. On sait que les végétaux demandent beaucoup de potasse par la dissolution, que l'acide et l'oxygène entrent dans la composition des substances animales, et forment seuls l'air atmosphérique. Or, de ces trois principes, le premier est la base du salpêtre, et l'acide nitrique naît de la combinaison des deux autres.

Ainsi, les endroits dont nous avons parlé réunissent les circonstances favorables au jeu d'affinité, d'où résulte la production du salpêtre. Indépendamment de la quantité de ce sel qui pénètre dans le sol de la terre jusqu'à une certaine profondeur, il s'en dépose à la surface des vieux murs et des décombres des bâtimens. Il y est en filamens, que l'on recueille avec des housses, d'où lui est venu le nom de *salpêtre de houssage*.

D'autres substances salines, telles que la chaux nitrée et la magnésie nitrée se forment dans les mêmes circonstances. Ces sels étant déliquescens, se trouvent surtout à la surface du sol (1). Dans le traitement du salpêtre, qui est mélangé de ces sels, leur acide abandonne la chaux et la magnésie, pour s'emparer de la potasse fournie par les cendres, ce qui augmente la quantité de salpêtre produite de

(1) *Leçons de chimie données à l'école normale*, par Berthollet, t. IV, p. 320.

l'opération. Enfin, le salpêtre contient aussi une portion de sel marin, que l'on en sépare à l'aide de la cristallisation.

3. L'observation de ce que la nature opère spontanément dans les endroits habités, a suggéré l'idée des nitrates artificielles, au moyen d'un mélange de matières animales et végétales, dont on favorise la disposition à produire du salpêtre, en les agitant, pour multiplier les points de contact avec l'air atmosphérique.

3. Quelques plantes donnent immédiatement du salpêtre par l'analyse; telles sont surtout celles qu'on appelle *borraginées*, le *trernacol* (*Helianthus annuus* Lin.), le *tabac*, etc.

4. Les cristaux de potasse nitratis parviennent quelquefois jusqu'à huit centimètres, ou 3 pouces de longueur et au-delà, sur une largeur proportionnée. J'en ai de cette dimension, qui n'ont subi aucune altération depuis plus de dix ans, moyennant des soins dirigés vers un but beaucoup plus intéressant que la conservation d'une belle suite de cristaux. Je les dois à l'amitié de l'illustre et infatigable Lavoisier.

5. Parmi les variétés que présente la cristallisation de la potasse nitratis, celle que nous nommons *tri-écaédre* se rapproche du *quatre-primé*, non-seulement par son aspect, mais aussi par la mesure de ses angles. Dans celui-ci, l'incidence des faces de la pyramide sur les pans du prisme, est de $145^{\circ} 40'$, et dans la potasse nitratis, elle est de $145^{\circ} 58'$.

TOME II.

Z *

Linnæus, qui pensoit que les pierres cristallines devoient leur forme à des sels faisant la fonction de principes fécondans, n'auroit pas manqué de saisir cette analogie, pour ranger le quartz dans l'espèce du nitre, sous le nom de *nitrum quarzaceum* (1).

6. La poudre à canon est un mélange d'environ six parties de potasse nitratisée bien purifiée, d'une partie de charbon et d'une partie de soufre. Les effets violens de ce mélange proviennent de la formation instantanée et de l'expansion subite de divers gaz qui se développent dans son inflammation. Ces gaz sont : 1°. le gaz acide provenant de la décomposition de l'acide nitrique ; 2°. l'acide carbonique formé par la combustion de l'oxygène de l'acide nitrique avec le charbon ; 3°. l'eau vaporisée par la chaleur due à la décomposition du nitrate, et provenant en partie de celle que contient la poudre, et en partie de celle qui se forme dans l'instant même. Ces matières gazeuses, produites subitement, font effort contre les obstacles qui s'opposent à leur expansion, et leur effet doit être proportionné, 1°. à la résistance qu'elles ont à vaincre ; 2°. à la rapidité plus ou moins grande avec laquelle la décomposition s'opère dans toute la masse ; 3°. au volume des gaz produits.

Il suit de là, 1°. que l'effet de la poudre sera d'autant plus terrible que les grains en seront plus arron-

(1) *Système minéral*, édité 1790, t. III, p. 84.

dis , parce que les vases les remplis d'air , qui restent alors entre les grains , étant plus nombreux et plus uniformément disséminés , cette disposition facilite l'inflammation instantanée de toute la masse ; 2°. que l'oxygène abandonné plus aisément sa base , ce qui fait que le muriate oxygéné de potasse a de l'avantage sur le salpêtre dans la composition de la poudre ; 3°. que la résistance au développement des gaz sera plus énergique ; 4°. que le nitrate de potasse sera plus pur (1).

8. La liqueur qu'on appelle communément *eau forte*, n'est autre chose que l'acide retiré de la potasse nitrée , et uni à une certaine quantité d'eau. Les arts emploient cette liqueur pour dissoudre les métaux , qui obéissent tous à son action , excepté le platine et l'or.

9. Le nitre a été regardé comme rafraîchissant , étant donné à petite dose. Il paroît provoquer spécialement , et plus que les autres , l'évacuation des urines. En grande dose , il purge , irrite , cause du laltération et cesse d'être rafraîchissant (2).

(1) Cette explication est de M. Chaptal.

(2) Article communiqué par le Cit. Hallé.

I^{re}. G È N R E.

S O U D E.

P R E M I È R E E S P È C E.

S O U D E M U R I A T É E.

Muriate de soude des chimistes.

Muria, sel commun, *Waller*, t. II, p. 55. Sel marin et sel gemme, *de Lisle*, t. I, p. 374 et 375. Alkali minéral muriatique ; sel commun ; muriate de soude, *de Bern*, t. II, p. 46. Stein salt, *Ersmarling*, t. II, p. 19. *Id.*, *Werner*, *Catal.*, t. I, p. 561. Alkali minéral muriatique, *Schlegel*, t. I, p. 98. Sel marin et sel gemme, *Desobry*, *ibid.*, p. 48. Common salt, sel gem, *Kirwan*, t. II, p. 51.

Caractères caractérl. Soluble dans l'eau ; divisible en cubes.

Caract. phys. Réfraction, simple.

Caract. géom. Forme primitive. Le cube, fig. 143, pl. XXXVIII.

Molécule intégrante, *id.*

Caract. chym. Soluble dans une quantité d'eau froide qui n'excede pas trois fois son poids. L'eau bouillante n'en dissout pas sensiblement davantage ; elle aide seulement un peu la solution.

Savcur, salin.

Dénégipation par le feu.

Analyse par Bergmann.

Soude.....	42.
Acide muriatique.....	52.
Eau.....	6.
	<hr/> 100.

Caract. distinctifs. Entre la soude muriatée et les autres substances appelées sels. Elle en diffère par un arôme connu de tout le monde, par ses fragmens cubiques et par la propriété qu'elle a de décrépiter sur des charbons allumés.

V A R I É T É S

F O R M E S.

(Les 3 premières variétés ont été décrites d'après des cristaux obtenus avec le secours de l'art.)

Déterminations

1. Soude muriatée primitive. P (fig. 145) pl. XXXVIII. De Lisle, t. I, p. 377 et 378; var. 1, 2, 3.

2. Soude muriatée cube-octaédre. $\frac{P \overset{A}{\underset{O}{A}}}{P \underset{O}{O}}$ (fig. 146). De Lisle, t. I, p. 378; var. 4. Incidence de σ sur P, $125^{\circ} 13' 36''$.

3. Soude muriatée octaédre. $\frac{A}{\sigma}$ (fig. 147). En octaédre régulier. De Lisle, t. I, p. 379, note 278. Incidence de σ sur σ , $109^{\circ} 28' 18''$.

On obtient la soude mariée sous cette forme , en la faisant cristalliser dans l'eau fraîche.

4. Soude mariée *dyonidéaliforme*. Ayant la figure d'un entonnoir carré , ou d'une trénaie , dont les faces tant intérieures qu'extérieures sont concaves parallèlement à leur base.

La formation de cette variété , qui est due à l'évaporation moyenne , ou à celle qui a lieu par une température un peu élevée , a été décrite , avec beaucoup de soin , par Rouelle (1). Elle commence par un cube qui s'enfonce en partie dans l'eau. De nouvelles molécules surviennent et s'arrangent à l'entour , en formant une espèce de cadre , qui adhère par le bas de ses faces intérieures aux bords supérieurs du cube initial. Cet assemblage s'accroît ensuite de la même manière , par de nouveaux cadres toujours plus larges , qui se placent les uns au-dessus des autres , à mesure que la partie déjà formée s'enfonce de plus en plus dans le liquide. Le corps prend ainsi la figure d'une trénaie ou d'une pyramide quadrangulaire creuse renversée. Si l'on reprend en sens contraire , ou de bas en haut , la série des cadres qui la composent , on pourra la considérer comme produite par un décroissement qui auroit agi sur des lames érigées en carrés. L'adhésion des faces sur la base varie de manière

(1) *Mém. de l'Acad. des Sc.*, an 1745.

que sa limite paroit être l'angle de 45° , ainsi que l'auroit observé Cappellet (1). Cette limite répond au résultat d'un décroissement par une simple rangée de molécules intégrantes.

Indéterminables.

5. Soude mariale *florue*. Se trouve dans les mines de Hallein, pays de Salzbourg, et dans celles de Halle, en Tyrol.

6. Soude mariale *avoyée*. En masses plus ou moins considérables, ou en grains.

ACCIDENTS DE LUMIÈRE.

Couleur.

1. Soude mariale *blanche*.
2. Soude mariale *rouge*.
3. Soude mariale *bleue*. La variété *florue* est quelquefois de cette couleur.
4. Soude mariale *brune*.
5. Soude mariale *violette*.
6. Soude mariale *blanchâtre*.

Transparence.

Soude mariale *translucide*.

ANALYSE.

1. La soude mariale est répandue dans la

(1) Poiss. Cris., p. 32

nature avec une abondance proportionnée à son utilité. Elle forme des masses immenses dans le sein de la terre , en Pologne , en Hongrie , en Russie , en Allemagne , en Angleterre et en Espagne. On a donné à cette substance fossile le nom de sel gemme. Une des mines les plus célèbres dont on la retire , est celle de Willeska en Pologne (1). Le sel y est disposé par couches , sous des lits de sable et de terre argileux. On le détache en blocs d'environ 26 décimètres ou 8 pieds de longueur , sur 13 décimètres de largeur , et 6 décimètres $\frac{1}{2}$ d'épaisseur. Vers l'année 1780 , la plus grande profondeur à laquelle on est encore parvenu , étoit d'environ 295 mètres ou 900 pieds , ce qui fait une épaisseur de 225 mètres ou 700 pieds pour la masse de sel , qui commence à peu près à 65 mètres ou 200 pieds en dessous de la surface. On a dit , et peut-être a-t-on exagéré , que cette mine avoit eue trois lieux d'étendue en tout sens. Mais il y a lieu de croire qu'elle communique avec celle de Bochna , où l'on exploite le même sel , et qui est située à cinq milles au levant de Willeska (2).

2. Toutes les mines de sel gemme occupent des

(1) Voyez la description qu'en a donnée Guettard , *Mém. de l'Ac. des Sc.* , 1765 , p. 227 et suiv.

(2) Observations sur les mines de sel gemme de Willeska , par Larnaud , *Journ. de phys.* , 1780 , p. 152 et suiv.

terrains secondaires. On trouve dans celle de Williams des coquilles et des madrépores. De Born cite un fragment de défense d'éléphant retiré de cette mine, et ajoute qu'on y rencontre aussi des dents molaires et autres ossements de ce quadrupède (1). Le même sel est souvent accompagné de chaux sulfatée.

3. Une autre quantité très-considérable de soude muriatée est tenue en dissolution par les eaux de la mer. Ce sel, après son extraction, se nomme *sel marin* ; mais il ne diffère point du sel gemme. Enfin, les eaux de plusieurs lacs et de quelques fontaines sont chargées aussi de soude muriatée. Elle entre, en proportion très-sensée, dans les eaux de Balnear, de Bourbonne, de Bourbon-Lancy et Larchambault, de la Mothe, etc.

4. On emploie divers procédés pour retirer le sel marin, et l'obtenir à l'état concret. Le premier est l'évaporation spontanée par la chaleur du soleil. La marée montante amène l'eau dans des fosses creusées d'angle bien battu, et partagées par de petits murs en divers compartimens, qui communiquent entre eux : on a soin de ne laisser entrer dans ces fosses qu'une couche d'eau assez mince, pour que l'évaporation soit prompte et facile. A mesure que le sel se forme, on le ramasse avec des râteaux, et on le met en tas pour le faire sécher.

(1) Géol., t. I, p. 458.

Le second procédé est l'évaporation artificielle à l'aide du feu, qu'on entretient sous des chaudières remplies d'eau salée. Dans certains pays, l'évaporation spontanée précède l'artificielle. On fait d'abord tomber l'eau sur des fagots d'épaves, où elle se divise en une pluie très-fine qui, présentant beaucoup de surfaces à l'air, s'évapore en grande partie, de sorte que celle qui arrive au fond se trouve très-chargée de soude muriatée. Cette eau est ensuite portée dans de grandes chaudières qu'on expose à l'action du feu, pour achever l'évaporation.

Dans quelques contrées du nord, on profite du degré de froid de l'atmosphère, comme d'un moyen préparatoire. On fait entrer une couche d'eau peu épaisse dans des fosses pratiquées à cet effet. Une partie de cette eau, en se congelant, abandonne les molécules salées, qui se concentrent dans la portion encore fluide, en sorte que celle-ci n'a plus besoin que d'être exposée à une modeste chaleur, pour que son évaporation permette au sel dont elle est chargée de se cristalliser.

5. La décomposition de la soude muriatée fournit l'acide muriatique qui se débite dans le commerce. Cet acide, distillé sur de l'oxyde de manganèse, enlève à celui-ci son oxygène, et prend alors le nom d'acide muriatique oxygéné. Berthollet, qui a découvert la vraie cause du chan-

gement d'état que l'acide éprouve dans cette opération, en a déduit des conséquences importantes pour l'art de la teinture. Il a fait voir que les étoffes et autres tissus employés à nos usages ne se décolorent au bout d'un certain temps, que parce que leurs principes colorés se combinent avec l'oxygène de l'atmosphère, surtout lorsque la lumière favorise cette combinaison (1). Or, l'acide muriatique oxygéné produit, en un instant, ou tout au plus en quelques heures, par la réaction prompte et abondante de son oxygène, le même effet que l'air n'opère qu'avec lenteur et comme par nuances. Il suffisoit donc d'exposer les toiles et les étoffes à l'action de cet acide, pour juger du plus ou moins de résistance qu'elles devoient opposer à l'action de l'air, par le plus ou moins de facilité qu'avait l'acide à les décolorer, et discerner ainsi les matières colorantes qui méritoient la préférence, par leur solidité.

6. Mais la plus belle application que Berthollet ait faite de sa découverte, est celle qui est relative au blanchiment des fils et des toiles. Ces substances sortent de la main qui les a fabriquées avec une teinte sale et désagréable, que l'on a cherché à leur enlever. Jusqu'alors on les expo-

(1) Il n'est personne qui n'ait observé les effets de cette altération sur les rideaux de toiles colorés, placés aux fenêtres des appartemens où le soleil donne.

soit à l'air pendant un temps plus ou moins considérable. L'oxygène de l'atmosphère en s'unissant aux parties colorantes qui adhèrent à ces substances, les rendoit solubles par la liqueur des lessives, dans laquelle on les passoit à plusieurs reprises. Berthollet a substitué à l'action lente de cet oxygène, l'énergie de l'acide muriatique oxygéné ; et ce procédé est devenu le fondement d'un art nouveau perfectionné dans nos manufactures, porté jusqu'en Angleterre, et reconnu par tout pour être supérieur de beaucoup à l'ancienne méthode, par l'avantage qu'il a de ménager le temps et le main d'œuvre. Il faut plus, il met en liberté les terrains où l'on étoit obligé d'exposer les fils et les toiles, et les rend à l'agriculture, qui sembleroit les redemander.

7. Le sel de cuisine, qui n'est pas de la soude muriatée pure, est employé, en petite dose, comme stimulant de l'estomac, et excitant les forces digestives. A forte dose, il sert à conserver les viandes. Mais Hippocrate prétend que, de cette manière, il dissipe leur propriété nutritive, et finit par l'acridité.

Les eaux minérales citées plus haut, dont la soude muriatée fait, en quelque sorte, le base, sont regardées comme toniques et apéritives ; elles sont purgatives ; on les administre en bains, douches et boissons. La chaleur naturelle de ces eaux est aussi regardée comme contribuant à leur activité.

On a employé le sel de cuisine et le sel marin pour le traitement des scorbuttes , et en général des engorgemens lymphatiques , mais la soude mariale, dans ce cas , se trouve mêlée de chaux mariale et de magnésie mariale (1).

A P P E N D I C E.

Soude mariale gypseuse.

Marialite , ou mariale de chaux. Fichtel, nouveaux mémoires de minéralogie ; Vienne, 1794, p. 228.

Cette substance présente l'aspect du sel gemme , et se brise, comme lui , parallèlement aux faces d'un cube. Elle s'en rapproche aussi par sa saveur, qui est seulement plus faible, et se développe beaucoup plus lentement. Suivant Fichtel, elle n'est soluble que dans une quantité d'eau chaude qui égale 4300 fois son poids. Le même auteur ajoute que les mineurs près de Halle , dans le Tyrol, lui donnent le nom de *gypus doalléen*. L'abbé Poda l'avoit appelé *marialite* ou *mariale de chaux*, parce qu'il la croyoit une combinaison de chaux et d'acide marialique. Mais d'après l'analyse qu'en a faite Klaproth, elle contient :

Mariale de Soude.....	31,2.
Sel de chaux.....	57,8.
Carbonate de chaux.....	11,0.
	<hr/> 100,0.

(1) Article communiqué par le Cit. Hallé.

Sous rapportons ici ce mélange , parce qu'il emprunte ses caractères devenus de la soude marquée.

II. E S P È C E.

S O U D E B O R A Y É E.

Soude de soude des chimistes.

Borax, *Walter*, t. II, p. 82. Borax, de *Linde*, t. I, p. 241. Alkali minéral boracique ; tincal, de *Bern*, t. II, p. 63. Tincal et borax, *Solange*, t. I, p. 98. Tincal, *Eschschlag*, t. II, p. 27. Borax ; tincal, *Kirwan*, t. II, p. 37. Borax, *Dandevon*, *tabl.*, p. 95.

Caractère essentiel. Saveur douceâtre ; fusible avec un bouillonnement considérable, en un globe vitreux.

Caractère phys. Réfraction, double à un haut degré.

Saveur, tirant sur celle du sucre.

Cristre, transversale et assez souvent longitudinale, cristallée et brillante.

Caract. géom. Forme primitive ; prisme rectangulaire oblique (fig. 148) pl. XXXVIII, dans lequel les faces M, P sont des rectangles, et la face T un parallélogramme oblique. Les coupes parallèles à M, T sont les seules sensibles. La position de la

fluë P n'est que pétunée. Matière intégr., 23. (1).

Caract. solés. Soluble dans deux fois son poids d'eau froide, et six fois son poids d'eau chaude.

Fusible à un feu modéré en une masse bouillonnante et très-poreuse.

Au chalumeau, elle se boursoufle d'abord, et finit par se convertir en verre.

Analyse.

Acide boracique..... 56.

Soude..... 17.

Eau de cristallisation..... 47.

 100.

Caractères distinctifs. 1°. Entre la soude boracée et l'alumine sulfatée. La première se divise par deux coupes perpendiculaires l'une sur l'autre, au lieu qu'on n'aperçoit aucun joint naturel bien sensible dans l'alumine sulfatée. Les cristaux de soude boracée s'éloignent totalement de la forme de l'octaèdre ou du cube, que l'alumine sulfatée présente toujours, soit simple, soit modifiée par des facettes angulaires, et quelquefois marginales. 2°. Entre la soude et la magnésie sulfatée. La soude de celle-ci est amère et celle de l'autre est rocheuse. Ses cristaux ont des joints nets situés diagonalement, que l'on n'observe

(1) Soit Ac (fig. 134) pl KKL cette matière. Si l'on mène Eg , Eg perpendiculaire, l'une sur Ac , l'autre sur ac , on pourra faire $Eg = \sqrt{2}b$, $Ag = a$, $Bc = \sqrt{2}c$, $EE' = \sqrt{2}b$.

point dans ceux de soude boratée. 3°. Entre la soude boratée et la potasse nitratée. La première ne brûle pas comme l'autre sur un charbon ardent. 4°. Entre la même et la soude muriatée. Celle-ci décrépite au feu; la soude boratée s'y fond seule. Le savor de la première est salé, et celle de l'autre acronomeux. La soude boratée est d'ailleurs la seule des substances acides et solubles qui se convertisse en verre au chalumeau.

V A R I É T É S.

F O R M E S.

(Les cinq premières variétés ont été décrites d'après des échantillons obtenus avec le secours de l'art.)

Déterminations.

1. Soude boratée *pericrystallée*. $\begin{matrix} G \\ r \end{matrix} \begin{matrix} MP \\ MP \end{matrix}$ (fig. 149).

Prisme oblique à bases hexagones symétriques. *De Lisle*, t. I, p. 245; var. 2. Incidence de P sur M, $106^{\circ} 7'$; de r sur r, $92^{\circ} 50'$; de r sur M, $134^{\circ} 2'$.

2. Soude boratée *pericrystallée*. $\begin{matrix} G \\ r \end{matrix} \begin{matrix} M & T & P \\ M & T & P \end{matrix}$ (fig. 150). *De Lisle*, t. I, p. 245; var. 3. Incidence de r sur T, $135^{\circ} 55'$.

3. Soude boratée *dissoute*. $\begin{matrix} M & T & P & A \\ M & T & P & a \end{matrix}$ (fig. 151).

La forme primitive dont les angles solides aigus
A, A

A, A (fig. 148) sont interceptés par des facettes σ, σ (fig. 151). Incidence de σ sur T, $118^\circ 52'$, et sur P, $130^\circ 46'$.

4. Soude boratée *dihexaédre*. $\begin{smallmatrix} \text{G} & \text{MP} & \text{A} \\ & \text{r} & \text{MP} & \sigma \end{smallmatrix}$ (fig. 152).

Six pans ou prismes et trois faces à chaque sommet. De Lisle, t. I, p. 246; var. 4. Incidence de σ sur le pan adjacent r à la droite du cristal, $120^\circ 6'$. C'est une des formes qu'affecte le plus communément la soude boratée.

5. Soude boratée *suboctaédre*. $\begin{smallmatrix} \text{G} & \text{M} & \text{P} & \text{A} & \text{A} \\ & \text{r} & \text{M} & \text{P} & \sigma & \sigma \end{smallmatrix}$ (fig. 153). De Lisle, t. I, p. 247; var. 6. La var. précédente aggrégée des facettes σ , entre les facettes σ et les pans r à la droite du cristal (fig. 154). Incidence de σ sur P, $115^\circ 17'$, et sur le pan r à la droite du cristal, $147^\circ 52'$.

Indéterminables.

6. Soude boratée *amorphe*.

ACCIDENS DE LUMIÈRE.

Couleurs.

1. Soude boratée *limpide*.

2. Soude boratée *vermillée*. Cette teinte est légère.

3. Soude boratée *bleuâtre*.

Tous II.

A a

Boude barattée *travaillée*, avec un aspect glau-fugux.

A N N O T A T I O N S.

1. L'origine de la soude barattée n'est pas encore bien connue, quoiqu'il y ait long-temps que l'on emploie ce sel dans les arts. Il nous vient des Indes orientales par le commerce, et quelques auteurs prétendent qu'on le fait artificiellement à la Chine, en mêlant, dans une fosse, de la graisse, de l'argile et du fumer, par couches successives, en arrosant ce mélange avec de l'eau, et en le laissant sécher dans la fosse pendant plusieurs années (1). Mais divers autres témoignages se réunissent en faveur de l'opinion que le boux est aussi un produit de la nature, et qu'on le trouve dans la terre au royaume de Thibet (2), dans le lac Nochal, dans quelques cavernes de Perse, dans l'île de Ceylon, dans la grande Tartarie, et même dans l'Électorat de Saxe (3).

2. La soude barattée, telle qu'on nous l'apporte des Indes, est plus ou moins mêlée de matières hétérogènes. Celle de Perse est en cristaux d'un volume assez considérable, revêtus d'un caillot gras, d'une couleur grise avec une teinte de verdâtre. Les Indiens l'appellent *Tischal*, et les Arabes *Bawach*,

(1) Fourcroy, *élem. d'hist. nat. et de chimie*, t. II, p. 68.

(2) *Ann. Stockholm*, 1770.

(3) *Journ. de phys.*, 1779, p. 457.

d'où l'on a formé le nom de *Borax*. Celui de la Chine est un peu moins impur, et sa couleur est d'un blanc sale. Les Hollandais ont eu seuls, pendant long-temps, le secret de raffiner le borax. Mais on y est parvenu depuis en France, au moins avec un égal succès. Le borax ainsi purifié et exposé à l'air, s'altère avec le temps, et se couvre d'une poussière farineuse, au lieu que le tinchal est garanti de cette altération par la matière grasse dont il est mélangé.

3. Le Cit. Vauquelin a obtenu des petits cristaux imparfaits de borax, épars, qui présentaient la forme de la variété *irradiée* (fig. 134). C'est au moyen de ces cristaux que j'ai reconnu la double réflexion du borax, en observant une éponge à travers une des faces terminales, telle que o et la face opposée à P sur l'autre sommet.

4. L'acide du borax s'orientations forme concrète, et cristallise en petites paillettes blanches, très-minces et très-légères, ce qui l'avoit fait prendre par Homberg pour un sel particulier, qu'il nommoit *sal sedatij*, parce qu'il lui avoit reconnu une vertu calmante. On a trouvé quelques-uns cet acide libre, dans les eaux de certains lacs, tels que ceux de Cherchénio (1), de Castelnuovo et de Monterotondo (2) en Italie.

(1) Lavoisier, *trav. chim. de chimie*, t. I, p. 285.

(2) Fourcroy, *élem. de minér. et de chimie*, t. I, p. 308.

5. La soude boratée est employée comme flux dans beaucoup d'épreuves métallurgiques. Bergmann , Kiewitz et Mongé l'ont fait servir à cet usage pour l'examen de presque toutes les substances métalliques , par le chalumeau.

Elle sert encore dans quelques verreries à déterminer la fonte de la matière. On s'en sature qu'environ une livre par pot de mélange. Elle donne alors constamment une couleur plus ou moins jaune aux substances fondues, ce qui ne permet pas de l'employer à grande dose.

Le borax est surtout utile pour les soudures , dans les ouvrages d'orfèvrerie ou d'horlogerie , et même dans les travaux grossiers des ferblantiers et des chaudronniers. Sa vertu fondante ramollit les points de contact des métaux qu'on veut réunir , et facilite ainsi leur adhésion ou leur alliage. C'est encore par son intermède qu'on applique les ars de couleur sur les bijoux. On emploie ordinairement le jet de flamme dirigé par le chalumeau , pour fondre le borax dont on a suspendu les surfaces métalliques qu'on veut unir.

Le défaut qu'a le borax de se boursoufler par la chaleur , nécessite un grand soin de le part de l'artiste qui l'emploie , parce qu'en se boursouflant il déplace les métaux , et dérange même souvent la symétrie des dessins au relief que les horlogers exécutent sur certains ouvrages délicats. C'est pour

c'est que quelques artistes préfèrent le verre de borax , qui n'a pas le même inconvénient (1).

III. ESPECES.

SOUDE CARBONATÉE.

Carbonate de soude des chimistes.

Alkali minéral, *astron*, *Waller*, t. II, p. 61.
Alkali fixe minéral, de *Linde*, t. I, p. 146. Alkali
minéral acide; *astron*; carbonate de soude, de
Born, t. II, p. 69. *Naturliches mineral-alkali*,
Essenstuck, t. II, p. 32. Alkali fixe minéral
(confusé avec l'acide sulfurique), *Strugg*, t. I, p.
77 et 78. Alkali minéral, *Desobry*, *tailé*, p. 26.

Caractère caractérist. Soluble dans l'eau; causant
effervescence avec l'acide nitrique.

Caract. phys. Siccité, urineuse.

Caract. chim. Soluble dans le double de son
poids d'eau froide, et dans un poids égal d'eau
bouillante.

Effervescent par l'acide nitrique.

Très-effervescent par l'action de l'air.

Vendissant le sirop de violettes.

Analyse par *Bergmann*.

Soude.....	88.
Acide carbonique.....	16.
Eau de cristallisation.....	64.
	<hr/> 168.

(1) Détails communiqués par le *Ch. Chaptal*.

Carbonate d'arsénigé. Le soude carbonaté est suffisamment distingué des autres substances salines qui se trouvent dans la nature, par son effervescence avec l'acide nitrique, jointe à la propriété qu'elle a de verdir le sirop de violette.

V A R I É T É S.

F O R M E S.

Déterminables (obtenus avec le secours de l'art).

1. Soude carbonaté primitive. P (fig. 153) pl. XXXIX. Octaèdre à bases rhombes, dans lequel l'incidence de l'arête D sur l'arête D', est de 120° , suivant Romé de Lisle; et celle de P sur P', de 96° . De Lisle, t. I, p. 149; var. 1. Je n'ai encore été à portée d'observer aucuns cristaux de cette espèce, et la forme primitive que je lui assigne lui vient que présentée.

Var. a Cuneiforme. L'angle solide A s'étend en forme d'aigle.

2. Soude carbonaté ductile. $\frac{P}{P} \frac{A}{a}$ (fig. 156). De Lisle, t. I, p. 149; var. 2. Incidence de a sur P, 142° . Ordinairement cette variété dérive de l'octaèdre primitif cuneiforme, dont l'arête terminale est remplacée par un rhombe allongé.

Var. a Segniforme. En segment semblable à celui que l'on obtiendrait par une coupe parallèle à la face a.

Indéterminable.

3. Soude carbonatée anhydre

ACCIDENTS DE LUMIÈRE.

Céphale.

Soude carbonatée blancheâtre.

Transparence.

Soude carbonatée translucide.

A N N O T A T I O N S.

1. La soude carbonatée abonde en Egypte, dans une vallée que l'on appelle la *Fallée des Lacs de Natron*. Elle cristallise dans l'eau de ces lacs, à l'aide de l'évaporation naturelle. On y trouve aussi de la soude muriatée; et lorsqu'une même masse d'eau contient à la fois l'un et l'autre sel, c'est la soude muriatée qui cristallise d'abord, et ensuite la soude carbonatée, en sorte qu'il se forme des couches successives de ces deux substances. Quelquefois dans un même lac, qui est divisé en deux parties, dont les eaux n'ont entre elles presque aucune communication, l'une de ces parties ne renferme que de la soude muriatée, et l'autre que de la soude carbonatée. Le terrain qui sépare les lacs est, en général, couvert d'incrustations salines, dont la plupart sont

composées de soude carbonatée plus ou moins pure, et les autres de soude muriatée.

Nous devons ces détails à Bertholet (1), auquel ce vaste laboratoire de la nature a offert un sujet digne d'exercer sa sagacité, pendant son séjour en Égypte, et qui, de l'observation exacte des faits, est remonté jusqu'à la cause qui détermine la formation de la soude carbonatée. Il l'attribue à la décomposition de la soude muriatée, par l'intermède de la chaux carbonatée, qui est en contact avec elle, et dont l'action est aidée par l'humidité du terrain et par la chaleur du climat. Il se fait, dans cette opération, un échange d'acides entre les deux sels; la soude carbonatée reste à la surface, et la chaux muriatée, qui est très-déliquescence, doit s'infiltre profondément dans le sol. Bertholet se fonde : 1°. sur ce que les portions de terrain où l'on trouve des incrustations de soude carbonatée, sont en même-temps imprégnées de soude muriatée; 2°. sur ce que quand le sol est trop aride, on ne rencontre, à la surface, que de la soude muriatée, ou du moins très-pen de soude carbonatée, en lieu que les endroits où les deux sels sont associés en proportion sensible, contiennent toujours une quantité considérable de chaux carbonatée, et de plus, sont chargés d'humidité. À l'égard des terrains trop arides, on n'y observe aucun sel,

(1) Journ. de phys., médical, etc. 8, p. 5 et suiv.

puce que les eaux de pluie ont, sans doute, entraîné avec elles tout ce qui étoit soluble.

On conçoit, d'après ce qui vient d'être dit, que la soude carbonatée d'Égypte doit toujours être plus ou moins mélangée de soude muriatée, d'où résulte une grande variation dans les qualités des différentes parties de ce sel, qui est d'autant plus précieux pour le commerce, qu'il approche davantage de l'état de pureté.

De Bora dit que les plaines de Dobruza, en Hongrie, fournissent une grande quantité de soude carbonatée, sous la forme d'une efflorescence répandue à la surface de la terre (1). Ce sel existe aussi, en divers autres endroits de l'Europe, dans les lacs et les eaux minérales. Il tapisse quelquefois les parois des murailles, et dans cet état on l'a confondu avec le salpêtre de bouage. On a donné le nom d'*sphronastron* au même sel mélangé de matière calcaire.

2. On retrouve la soude carbonatée dans les cendres de plusieurs végétaux, mais avec excès de base, particulièrement dans celles des plantes qui appartiennent au *salsola* et au *salsicornia* de Linnæus. On distingue parmi les premières le *salsola soda*, ainsi que le *salsola arboresc.* d'où provient la soude d'Alicante (2), qui est très-estimée.

(1) Gmel., t. II, p. 69.

(2) Mém. de l'Acad. des Sc., an 1795, p. 14.

3. On a regardé la soude carbonatée, pendant long-temps, comme un simple alkali, c'est-à-dire, comme n'étant autre chose que la soude à l'état de pureté, parce qu'on lui avoit reconnu plusieurs propriétés des alkalis, entre autres celle de rougir le sirop de violette. Mais il est bien prouvé, aujourd'hui, que la soude y est combinée avec l'acide carbonique; et c'est à la présence de cet acide qu'est due l'effervescence que produit, dans l'acide nitrique, le sel dont il s'agit.

4. La facilité avec laquelle la soude carbonatée entre en fusion, l'a fait adopter, de préférence, dans beaucoup de verreries, pour la mêler au sable qui forme la base du verre. Mais l'usage le plus intéressant de ce sel est de concourir, avec l'huile d'olive et la chaux, à la composition du verre solide. La chaux n'est employée ici que pour calver à la soude l'acide qui la neutralise, et amener cet alkali au degré de pureté nécessaire, pour qu'il puisse agir sur l'huile et s'unir intimement avec elle (1).

5. Il paroît, par plusieurs passages des anciens, que la soude carbonatée étoit le sel qu'ils nommoient nitrum et natrum. Tacite dit qu'on ramassoit, de son temps, sur les bords du fleuve Belus, un sable qui, mêlé avec le nitrum, produisoit

(1) Voyez le rapport sur la fabrication des verres, etc. Mem. et observ. de chimie, de B. Poisson, t. II, p. 349 et suiv.

du verre par la caustion (1). Selon Pline, on trouvoit le nitre dans des lacs; l'Égypte surtout en fournisoit abondamment, mais d'une couleur grise et mêlé de petites pierres (2). Ce sel étoit d'un grand usage dans le même pays, pour saler les cadavres, avant de les embaumer (3).

6. Les anciens attribuoient une grande vertu fécondante à leur nitre. Virgile dit qu'il a vu les cultivateurs arroser les semences des légumes, avec de l'eau nitrée et du sucre d'abeille, avant de les confier à la terre, afin que les graines prissent plus d'accroissement dans leurs enveloppes (4).

7. Le soude carbonaté est regardé comme apéritive, et facilitant le dégorgement des viscères abdominaux, et du foie en particulier. Elle fait la base des eaux de Vichy qui, en outre, contiennent, quoique chaudes, du gaz acide carbonique à leur source. Le même sel dissous dans l'eau surchargée d'acide carbonique, a été vanté par Ingenhousz, comme très-utile dans les affections calculieuses des reins (5).

(1) Histon, l. V, n. 6.

(2) Hist. nat., l. XXXI, c. 10.

(3) Plinodote, l. II, n. 66.

(4) *Remissa vultu apudque multos medicare corpora, Nec sacra prius et nigra profunda amant,*
Quandocum sit firmo caligine fallaciae avest.

Georg., l. I, vers 195 et suiv.

(5) Article communiqué par le C^{te} Bâle.

III. GENRE

A M M O N I A Q U E.

E S P E C E U N I Q U E.

A M M O N I A Q U E M U R I A T É.

Muriate ammoniacal des chimistes.

Sel ammoniacum, *Walther*, t. I, p. 77. Sel ammoniac, de *Lavo*, t. I, p. 162. Alkali volatil muriatique ; muriate ammoniacal ; sel ammoniac, de *Born*, t. II, p. 64. Alkali volatil combiné avec l'acide muriatique, *Scagr.*, t. I, p. 80. Natürlicher salzsaß, *Bewerling*, t. II, p. 24. Sel ammoniaque, *Daubenton*, *ibid.*, p. 27. Sel ammoniaque, *Kirwan*, t. II, p. 33. Sel ammoniaque de quelques auteurs.

Caractère essentiel. Volatil en entier, par le feu.

Caract. phys. Saveur, urinaire et piquante.

Elasticité. Ses cristaux en plumes ont une certaine flexibilité, et sautent sous le marteau.

Caract. géom. Forme primitive. L'octaèdre régulier.

Molécule intégrante. Le tétraèdre régulier.

Caract. chim. Volatil en fumée, lorsqu'on le jette sur un charbon allumé.

Soluble dans six fois son poids d'eau froide, et

à peu près dans son poids d'eau bouillante, il résiste très-sensiblement l'ébullition dans laquelle il se dissout.

Analyse.

Ammoniaque..... 49.

Acide muriatique..... 51.

Eau de cristallisation..... 60.

100.

Caractère distinctif. Entre l'ammoniaque muriaté et les autres substances solides, il en diffère par sa saveur urticaire et par sa volatilité.

V A R I É T É S.

F O R M E S.

(Elles ont été dérivées d'après des produits de la cristallisation obtenus par l'art.)

Déterminables.

1. Ammoniaque muriaté primitif. P (fig. 157) pl. XXXIX. En octaèdre régulier, l'incidence de deux faces quelconques adjacentes l'une sur l'autre, $109^{\circ} 28' 15''$.

Le Cit. Pelletier paroit être le premier qui ait obtenu l'ammoniaque muriaté en octaèdres bien proportionés et d'un volume sensible.

2. Ammoniaque muriaté cubique. A 'A'.

3. *Ammoniaque variété trapezoidale*. $\frac{A}{1} \frac{A'}{2}$ (Ag. 138). Inclinaison de x sur x' , 145° $25'$ $53''$; de x sur x'' , 151° $48'$ $36''$. Cette variété a été obtenue par le Cit. Plancher.

Indéterminables.

4. *Ammoniaque variété pélovaire*. En ramifications semblables à des herbes de paille, et qui, examinées à la loupe, paraissent composées de petits octaèdres implantés les uns dans les autres.

5. *Ammoniaque variété amorphe*. En masses informes, striée à l'intérieur.

A C C I D E N S D E L U M I È R E.

Couleurs.

1. *Ammoniaque variété grisâtre.*
2. *Ammoniaque variété bleue.*

Transparence.

Ammoniaque variété franchouide.

A N N O T A T I O N S.

1. On trouve l'ammoniaque variété, suivant Wallerius (1), dans la Pense et au pays de Calmar, tantôt mêlé avec de l'argile, ou avec d'autres terres, tantôt à la surface, en efflorescences ou sous forme pulvérulente. On le trouve aussi

(1) *Systema mineral.*, t. II, p. 77.

en petites masses, autour des volcans de Sicile et d'Italie, où il s'est formé par sublimation.

2. C'est de l'Égypte que nous vient la plus grande partie de l'ammoniaque mariaté du commerce. Dans ce pays, où l'on manque de bois, on régasse, avec soin, la fiente des animaux, et en particulier celle du chameau. On la mêle avec un peu de paille séchée, pour lui donner de la consistance, puis on la fait sécher au soleil, et on l'emploie comme combustible. On recueille la suie que cette combustion produit avec abondance, et on la recrée dans des vaisseaux de verre que l'on chauffe par degrés, et où l'ammoniaque mariaté se sublime. Les pains de ce sel, qu'on nous envoie de l'Égypte, sont plus ou moins noircis par le mélange d'une matière fuligineuse qui monte dans la sublimation. Mais on parvient aisément à le purifier, en le faisant dissoudre, puis en le filtrant, pour le laisser cristalliser une seconde fois.

On fabrique de ce même sel, dans la Belgique, en faisant brûler à la fois de la suie, des quenoues, de laⁿ houille et de la soude mariatée. On obtient un dépôt de suie, chargé d'ammoniaque mariaté, de suie et de bitume. Ensuite, au moyen de la sublimation, on sépare le sel des matières hétérogènes qui altèrent sa pureté (1).

(1) Voyez le minéralogiste du G^{te}. Boëlle, sur cet obj^t, Journal des mines, 8^e. 10, p. 5 et suiv.

3. Le refroidissement produit par l'ammoniaque saturée dans l'eau qui dissout ce sel, va, suivant Macquer, jusqu'à 18 degrés de Réaumur au-dessous de la température qu'avoit d'abord le liquide. Aussi obtient-on un froid artificiel considérable, en mêlant de l'ammoniaque saturée avec de la glace pilée. On parvient de cette manière à faire congeler l'eau saturée dans un vase entouré de ce mélange.

4. Ce même sel a deux principaux usages dans les arts, l'un pour l'éclairage, et l'autre pour la teinture. Dans le premier cas, il sert à décaper les métaux, et a de plus l'avantage de prévenir l'oxydation de la surface métallique, par le principe huileux et charbonneux qu'il contient. On l'emploie en vapeur, pour décaper les lames de fer que l'on se propose de convertir en fer blanc.

Dans les teintures, il sert à convertir l'acide nitrique en acide nitro-ammoniacal. On en dissout, pour cet effet, dans le premier de ces acides, une quantité qui varie entre un huitième et un sixième.

On a remarqué que l'ammoniaque saturée avoit la propriété de rendre le plomb sègre, lorsqu'on le mettoit avec ce métal fondus ; et c'est d'après cette observation qu'on l'emploie dans quelques ateliers, où l'on convertit le plomb en grenaille (1).

(1) Détails communiqués par le Cit. Chapuis.

5. La cristallisation ordinaire de l'ammoniaque saturée en petits cristaux phénix, a été décrite, avec beaucoup de soin, par le C^t. Monge, dans le mémoire très-intéressant qu'il a publié sur la météorologie (1). Si l'on remplit un vase de verre, profond et étroit, d'une dissolution de sel saturée à chaud, et qu'on laisse ensuite refroidir lentement celle-ci dans un air calme, la surface du liquide est la première qui arrive à la supersaturation, tant à cause du refroidissement direct auquel elle est exposée, qu'à cause de la concentration que lui fait éprouver l'évaporation; et c'est à la surface que les premiers cristaux se forment. Ces cristaux, d'une extrême petitesse, sont aussitôt submergés que formés; et parce que leur pesanteur spécifique est un peu plus grande que celle du liquide qui les contient, ils descendent avec lenteur. en même temps leur volume augmente, par une addition de cristaux semblables qui se forment sur leur passage, en sorte qu'ils arrivent au fond du vase en flocons blancs, nombreux et volumineux.

Ce que le C^t. Monge trouve surtout de plus remarquable dans ce phénomène, c'est le progrès rapide de la cristallisation dans un liquide dont la supersaturation n'est pas assez avancée pour lui donner naissance par elle-même. Mais

(1) *Annales de chimie*, par Berthollet, Lavoisier, Monge, etc., t. V, p. 1 et suiv.

Il se passe ici un effet analogue à ce qu'on observe, lorsqu'on place un petit cristal solide dans une dissolution du même sel, où l'on ne voyoit encore rien paroître : la présence de ce cristal sollicite à l'instant les molécules disséminées dans le liquide, à des mouvemens qui leur font vaincre les petits obstacles que ce liquide opposoit à leur réunion, et de nouveaux cristaux naissent de toutes parts. De même, dans le cas dont il s'agit, le passage des petits cristaux d'ammoniaques muriat qui descendent dans le liquide, devient comme le signe de ralliement de toutes les molécules qui avoient une tendance prochaine à se réunir, en vertu de leur affinité mutuelle.

Le Ch. Monge compare, avec beaucoup de justesse, à ce phénomène, la formation de la neige, dont les premiers cristaux, qui ont pris naissance au haut de l'atmosphère, déterminent, à mesure qu'ils descendent, par l'exercice de leur pesanteur spécifique, la cristallisation des molécules aqueuses, que l'air environnant seroit retenu en dissolution, sans leur présence. Il en résulte des états à six degrés, lorsque le temps est calme, et que la température n'est pas assez élevée pour défaire les cristaux, en provoquant la fusion de leurs angles, ou des flocons irréguliers, lorsque l'atmosphère est agitée, et que les cristaux tombent de trop haut, se bécotent et se réunissent en groupes.

TROISIÈME ORDRE
SUBSTANCES ACIDIFÈRES
ALKALINO-TERREUSES.

GENRE UNIQUE

ALUMINE

PREMIÈRE ESPÈCE

ALUMINE SULFATÉE ALKALINE.

Sulfate alkalin d'alumine des chimistes.

Alumen, *Waller*, t. I, p. 32. Alum, *de Lavo*, t. I, p. 323. Alumine vitriolée; alun; sulfate d'alumine, *de Bern*, t. II, p. 32. Argyle vitriolée; alun, *Scopoli*, t. I, p. 124. Natürlicher alun, *Königsberg*, t. II, p. 9. Alm, *Danderson*, 1784, p. 28. Alum, *Kirwan*, t. II, p. 15.

Caractère essentiel. Non volatile par le feu; cristallise ordinairement en octaèdres réguliers.

Caract. phys. Réfraction, simple. Saveur, douceâtre et astringente.

Caract. géom. Forme primitives. L'octaèdre régulier. On aperçoit quelquefois de légers indices de lames parallèlement aux faces de cet octaèdre.

Molécule intégrante. Le tétraèdre régulier.

Cassure, indécise, vitreuse.

Gross. chèn. Soluble dans environ neuf fois son poids d'eau froide, et dans une quantité d'eau bouillante moindre que la moitié de son poids.

A une chaleur modérée, elle se liquéfie et se boursouffle considérablement.

Analyse par Vauquelin.

Sulfate d'alumine.....	49.
Sulfate de potasse.....	3.
Eau de cristallisation.....	44.
	<hr/>
	100.

Caractères distinctifs. 1°. Entre l'alumine sulfatée alcaline et la magnésie sulfatée. La saveur de la première est douceâtre, et celle de l'autre très-aigre. La magnésie sulfatée affecte des formes toutes différentes de celles de l'alumine sulfatée, qui sont l'octaèdre régulier et ses modifications. 2°. Entre la même et la soude boratée. Celle-ci se réduit en verre au chalumeau, ce qui n'a pas lieu pour l'autre. Ses cristaux ont des formes pennées, au lieu que ceux de l'alumine sulfatée présentent l'octaèdre régulier simple ou modifié. 3°. Entre l'alumine sulfatée fibreuse et le fer sulfaté sous la même forme. Celui-ci a une saveur beaucoup plus forte et plus astringente; sa dissolution dans l'eau colore en noir l'écorce de chêne et l'infusion de noix de galle, ce qui n'a pas lieu pour l'alumine sulfatée. 4°. Entre la même variété et la chaux sulfatée fibreuse. Celle-ci n'a

point de savoir sensible, comme l'alumine sulfatée; elle est très-peu soluble; elle blanchit et devient pulvérulente sur un charbon allumé, au lieu de s'y liquéfier avec bouillonnement, comme l'alunpe sulfatée.

VARIÉTÉS

FORMES.

Déterminations.

1. Alumine sulfatée primitive. P (Fig. 159) pl. XXXIX. De Lisle, *t. I*, p. 314. Incidences de deux faces voisines quelconques l'une sur l'autre, $103^{\circ} 58' 18''$.

a. Alumine sulf. prism. canaliculée. De Lisle, *t. I*, p. 314; var. 1.

b. Alumine sulf. prism. sautoiriforme. Semblable à un segment extrait d'un octaèdre coupé parallèlement à deux de ses faces opposées. De Lisle, *t. I*, p. 316; var. 6 et 7.

2. Alumine sulfatée cubique. $\frac{A}{r} \frac{A'}{r'}$ (Fig. 160).

3. Alumine sulfatée cubo-octaèdre. $\frac{P}{r} \frac{A}{r} \frac{A'}{r'}$ (Fig. 161). De Lisle, *t. I*, p. 315; var. 3. Incidences de r sur P , $125^{\circ} 15' 54''$.

4. Alumine sulfatée triforme. $\frac{P}{r} \frac{A}{r} \frac{A'}{r'}$ (Fig. 162).

Dérivée de l'octaèdre régulier par les faces P , du dodécaèdre rhomboidal par les faces e, e' , et du cube par les faces r, r' . *De Lisle, t. I, p. 316*; voir 5. Incidence de e sur P , $144^{\circ} 44' 6''$.

5. Alumine sulfatée transparente. En octaèdres, dont une moitié est creusée avant tourné sur l'autre, d'une quantité égale à un 6° . de dissymétries. Voyez l'article relatif à la 3^e. variété du spinelle, où ce jeu de cristallisation se trouve expliqué dans un plus grand détail.

Inditernisables.

6. Alumine sulfatée fibreuse. *Alun de plume, Tournefort, relation d'un Voyage au Levant, t. I, p. 141. Halotrichum; Scopoli de hydrargyro Idriensi tentamen; Venet., 1764, p. 68. Humale, Esmerling, t. II, p. 10.* En filaments réunis par filicieux, et quelquefois disposés confusément. Celle que Scopoli a nommée halotrichum, et qui se trouve à Idria, en Carniole, contient, accidentellement, un peu de chaux et de fer.

7. Alumine sulfatée concrétionnée.

8. Alumine sulfatée amorphe.

A C C I D E N S D E L U M I È R E.

Couleurs.

1. Alumine sulfatée Noire.

2. Alumine sulfatée Bleueâtre.

*Transparence.**Alumine sulfatée transparente.**ANALYSE.*

1. L'alumine sulfatée alkalinne ne se trouve isolée, dans la nature, qu'en petite quantité. Elle se présente alors ordinairement sous la forme de filamens auxquels on a donné le nom d'*alun de plume*. On a confondu cette variété avec l'asbeste flexible, dit *asbeste*, et avec le fer sulfaté libreux; celui-ci pécchoit d'autant plus à la méprise qu'on le trouve quelquefois, en même temps que l'alun, dans les manufactures de ce dernier sel.

Le plus bel alun de plume qui soit connu, est celui que le célèbre Tournefort a découvert dans la grotte du fils de Milo. On voit par la description qu'il en donne, dans la relation de son voyage, qu'il en avoit très-bien senti les caractères, et avoit évité de le confondre avec une autre substance filamenteuse, qui se rencontre au même endroit, et qu'il doit être insipide et pierreuse.

Le Cit. Olivier a rapporté, récemment, des morceaux de ces deux substances qu'il avoit trouvés dans la même grotte, et qu'il a bien voulu partager avec moi. J'ai reconnu que la seconde étoit une chaux sulfatée libreuse. On conserve encore, dans quelques cabinets, de l'alun de plume rapporté par

Tournefort. J'ai eu la satisfaction de le comparer avec celui du Cit. Olivier, et je la dois au Cit. Lucas, fils (1), qui m'en a donné une petite touffe, composée de fibres, dont la longueur est d'environ quatre centimètres.

a. L'alumine caillée qui se débite dans le commerce, est réunie des substances qui en sont impures, ou qui en contiennent seulement les principes.

Les premières n'ont besoin que d'être lessivées pour fournir l'alun. Telle est surtout la terre qui se trouve à la Solitaire, près de Pozzuolo. Les chaudières où l'on met cette terre, pour en extraire le sel, sont enfouies dans le sol, dont la chaleur naturelle est d'environ $37^{\circ}\frac{1}{2}$ de Réaumur, ou $46,5$ du thermomètre décental; et ce sol a ainsi le double avantage d'offrir le matière de l'alun toute préparée, jointe à une température qui fournit un moyen économique de retirer le sel sans employer aucun combustible, et de l'arroseur, par des cristallisations répétées, à un degré suffisant de pureté.

On a appelé d'abord *alun de Rome*, celui qu'on extraisoit d'une pierre dure, située près de la Tolpha, à environ 14 lieues de Rome. Mais on a étendu depuis cette acception à l'alun qu'on

(1) Adhémar ou Cit. son père, garde des péchés du musée d'histoire naturelle.

retrouvé en général de toutes les pierres et terres dans lesquelles ce sel existe tout formé.

Quant aux substances qui renferment seulement les principes de l'alun , ce sont particulièrement des schistes argileux pétrifiés de fer sulfuré ou de pyrite ferrugineuse , dont la décomposition donne lieu à la combinaison de l'acide sulfurique avec l'alumine. On a nommé *alun de roche* ou *alun de gypse*, celui qu'on obtient par le traitement des substances dont nous venons de parler. La première de ces dénominations , suivant Lefebvre, tire son origine du nom de la ville de Roche , en Syrie , d'où l'art de fabriquer l'alun a été apporté en Europe (1).

3. L'alun du commerce a été regardé , pendant long-temps , comme uniquement composé de sulfate d'alumine et d'acide sulfurique. Mais Van-quelin , en l'examinant plus particulièrement , est parvenu à ce résultat également important pour la chimie et pour les arts , que le sel dont il s'agit renferme toujours une certaine quantité d'alkali , qui est tantôt la potasse , et tantôt l'ammoniaque , ou même l'un et l'autre à la fois ; il a trouvé , de plus , que les deux alkalis se remplaçoient mutuellement , c'est-à-dire , qu'à mesure que la proportion de l'un étoit plus forte , celle de l'autre se trouvoit diminuée , en sorte que la

(1) Lefebvre, *protop.*, p. 47.

masse des deux étoit constamment la même (1). Cette identité de fonctions, qui permet de substituer un alkali à l'autre, offre aux chimistes un nouveau sujet de recherches ultérieures.

4. On a observé que l'alun prenoit la forme de l'octaèdre régulier, lorsque sa base étoit saturée d'acide; mais qu'il cristallisoit en cubes, lorsqu'il y avoit excès de base jusqu'à un certain degré, et que, quand elle dominoit trop, la cristallisation devenoit confuse, et ne produisoit plus qu'une espèce de magma.

Le Cit. Leblanc, qui a beaucoup perfectionné l'art de faire cristalliser les sels, a obtenu des cristaux d'alun octaèdres, cubes-octaèdres et cubiques, également remarquables par la netteté des formes et par la grosseur du volume : il est parvenu à maîtriser, pour ainsi dire, la cristallisation, en amenant, à volonté, telle forme particulière, ou le passage d'une forme à une autre, et en faisant prendre aux cristaux un accroissement illimité, sans nuire à leur régularité. Il a tiré surtout un grand parti de l'influence que pourroit avoir la diversité des proportions entre les sels et leurs bases, pour faire varier les formes (2). Mais on ne doit pas en conclure que cette diversité entraîne aucun changement dans la forme

(1) Voyez le Journ. des mines, N°. 28, p. 520.

(2) Voyez le Journ. du phis., nov., 1788, p. 374 et suiv.

des molécules intégrantes. Il paraît que quand la quantité de base dépasse le point qui détermine l'octaèdre régulier, la portion de cette base, qui se combine directement avec l'acide, reste la même, et que la portion additionnelle s'unit au sel résultant de cette combinaison, sans en altérer les caractères essentiels. Mais quand même cette manière de voir ne serait pas la véritable, il faudrait en chercher une qui ne portât aucune atteinte à la constance des molécules intégrantes, si bien démontrée pour tous ceux qui ont étudié, avec soin, la théorie des lois auxquelles est soumise la structure des cristaux.

J'ajouterai une observation qui en offre une nouvelle preuve. Il arrive souvent qu'une forme cristalline a des facettes qui lui sont communes avec une autre forme originaire de la même substance, plus des facettes qui lui sont particulières. Or, les facettes communes ayant absolument les mêmes inclinaisons dans la variété plus composée, que dans celle qui est plus simple, on doit en conclure qu'elles résultent des mêmes lois de décroissement; ce qui suppose qu'il ne s'est fait aucun changement dans les molécules. Donc, puisqu'il est impossible que la nature soit en contradiction avec elle-même, on ne peut pas dire que la portion surabondante de base à laquelle on attribue la production des facettes particulières à la variété plus composée, ait déterminé un

changement dans les molécules, surtout si l'on considère que les positions de ces facettes s'accordent toujours parfaitement avec d'autres lois de décroissement dépendantes de la même forme de molécule.

5. Les cristaux d'alun, dont la formation n'a pas été conduite avec les précautions nécessaires pour les avoir isolés, forment souvent des suites d'octaèdres implantés les uns dans les autres. On dispose quelquefois, dans la capsule où l'alun est tenu en dissolution, une petite charpente que ce sel recouvre en se cristallisant, de manière à imiter des caplans de girihades composées de ces octaèdres implantés, et qui produisent un assez bel effet. J'en ai vu que l'on faisoit passer, vis-à-vis des personnes peu instruites, pour des stalactites calcaires ou rhyppes.

6. Ce sel est une des substances les plus précieuses pour l'art de la teinture, où il fait l'office de mordant. On appelle ainsi un corps qui, fixé sur une étoffe, facilite la combinaison du principe colorant avec elle. Un mordant est donc un intermédiaire d'union entre le principe colorant et l'étoffe. Tout mordant doit avoir les qualités suivantes : 1°. être blanc, afin de ne pas altérer la nuance du principe colorant ; 2°. être à l'abri des changements que pourroit occasionner l'action de l'air ou celle des lessives, pour que la couleur soit indélébile ; 3°. n'être point corrosif, pour ne

peut endommager l'étoffe. L'alumine et l'oxyde d'étain réunissent plus ou moins ces avantages.

L'alumine a une telle affinité avec la plupart des étoffes, qu'elle se sépare de son acide pour se fixer sur elles, de manière qu'il suffit de les alouer, et d'y porter ensuite le principe colorant, pour obtenir une couleur fixe. D'autres fois on commence par déposer sur l'étoffe un principe astringent, après quoi on aloue, et alors le mordant est formé du principe astringent et de l'alumine combinés ensemble (1).

On croyoit autrefois que l'adhérence des parties colorantes avec les étoffes étoit l'effet d'une cause mécanique, et l'on considéroit le mordant comme une espèce de mastic, qui tenoit ces parties enchaînées dans les pores de l'étoffe, d'abord ouverts par la chaleur, et ensuite resserrés par le froid. Une chimie plus éclairée a prouvé que l'adhérence dont il s'agit, dépendoit des affinités réciproques de certains agents, les parties colorantes, les fibres de l'étoffe, et les mordans (2).

7. On a remarqué que le bois imprégné d'une dissolution d'alun, brûloit avec difficulté. Lorsqu'on veut empêcher l'encre de couler sur le pa-

(1) Etoffe mordantée par le Co. Chapel.

(2) Voyez le traité de la teinture, par Bertholet.

pier qui boit, on le plonge dans la même liqueur.

A. L'alun est employé particulièrement à l'extérieur, pour restreindre les chairs qui se hémorrhoeut, et pour arrêter les hémorragies des petits vaisseaux. Mais, dans le premier cas, on s'en sert surtout après l'avoir privé de son eau de cristallisation, et sous la forme de ce qu'on appelle *alun calciné* (1).

1P. ESPÈCE.

ALUMINE FLUATÉE ALKALINE.

Fineur d'alumine et de soude des chimistes.

Cryolite d'Abiskoörd. Kryolith, Karsten, *Mineral. tabellen*, p. 28.

Caractère chimique. Insoluble dans l'eau; éprouvant un commencement de fusion, à la simple flamme d'une bougie.

Caract. phys. Pouss. spécif., 2,649.

Durété. Rayée par la chaux fluatée; rayant la chaux sulfatée.

Trisublim. Réduite en petits fragments, et mise dans l'eau, elle y acquiert de la transparence, et présente l'apparence d'une espèce de gélée.

Caract. géométr. Elle se dissout en prismes

(1) Article communiqué par le Cit. Balle.

droits, qui paroissent rectangulaires, et dont les bords sont assez nettes. On ne distingue bien les divisions latérales qu'en faisant mouvoir les fragmens à la lumière d'une bougie. On aperçoit de plus, dans ce même cas, une multitude de petites lames étendues parallèlement à des plans, qui, en portant des deux diagonales de chaque base, intercepteroient les angles solides du prisme. Ces dernières divisions conduisent à un octaèdre rectangulaire surbaissé, et en les combinant avec les premières, on conçoit que celles-ci spécifiroient l'octaèdre suivant trois plans perpendiculaires entre eux, dont l'un coïncide avec la base commune des deux pyramides qui composent l'octaèdre, et les deux autres passent par les arêtes terminales et en même temps par l'axe. Mais il seroit plus simple d'adapter, pour forme primitive, le prisme rectangulaire au lieu de l'octaèdre.

Caract. chim. Au chalumeau, elle se fond d'abord très-facilement, en coulant sur la pince; elle se couvre ensuite d'une croûte blanche, et devient plus difficile à fondre.

1^{re} analys. par Klaproth.

Soude	36,0.
Alumine	23,5.
Acide fluorique et eau	40,5.
	<hr/>
	100,0.
	<hr/>

2^{de}, analysée par Vauquelin.

Soude	7a.
Alumine,	21.
Acide fluorique et eau.....	47.
	<hr/>
	100.

Caract. distinct. 1^{re}. Entre l'alumine fluatée et la chaux sulfatée laminaire blanchâtre. Celle-ci se divise en prismes rhomboïdaux de 113^e et 67^e, et l'autre en prismes rectangulaires. La chaux sulfatée, exposée à la flamme d'une bougie, s'enflamme, et blanchit sans se fondre; l'alumine fluatée y entre en fusion. Le pesantier spécifique de la chaux sulfatée est plus petite dans le rapport, d'environ 4 à 5. 2^{de}. Entre la même et la baryte sulfatée en masses blanchâtres. Celle-ci se divise en prismes rhomboïdaux de 101^e $\frac{1}{2}$ et 50^e $\frac{1}{2}$; et l'autre en prismes rectangulaires. La baryte sulfatée a une pesanteur spécifique plus grande, dans le rapport d'environ 11 à 7. Exposée à la flamme d'une bougie, elle y décrépète; l'autre y éprouve un commencement de fusion.

V A R I É T É.

F O R M E.

Alumine fluatée alaline laminaire.

Couleur.

Alumine fluatée alaline blanchâtre.

Transparence.

Transparence.

Alumine fluatée alcaline transluide.

ANALYSE.

1. Les seuls morceaux d'alumine fluatée alcaline qui soient encore connus, ont été trouvés dans le Groenland, par un missionnaire, qui les porta à Copenhague, où ils restèrent dans l'oubli pendant plusieurs années. Enfin, ils attirèrent l'attention de M. Abildgaard, qui entreprit de les examiner chimiquement, et y reconnut la présence de l'acide fluorique et de l'alumine, résultat d'autant plus intéressant, que l'acide fluorique n'avoit encore été retiré que de la chaux fluatée, désignée anciennement sous le nom de *spath fluor*, qui a donné naissance à celui de cet acide. Mais le même résultat offroit un défaut considérable, qui avoit d'abord fait soupçonner que quand on décomposoit le minéral par l'acide sulfurique, une partie de l'alumine étoit enlevée par l'acide fluorique, à mesure que celui-ci se dégageroit. Klaproth a découvert, depuis, le véritable complément de l'analyse, qui consiste dans une quantité de soude égale à environ un tiers de la masse; et le résultat de ce second collébre se trouve confirmé par celui de Vauquelin, qui, sans connaître le procédé du chimiste de Berlin, a obtenu, à quelque chose près, les mêmes quantités relatives d'acide,

d'alunite et de soude. C'est à la générosité de MM. Abildgaard et Martley que nous sommes redevables, le Cit. Vauquelin et moi, des morceaux de ce précieux minéral, qui nous ont mis à portée, lui d'en répéter l'analyse, et moi d'en étudier les caractères minéralogiques.

2. La grande fusibilité de ce minéral qui, exposé au feu, coule presque comme la glace, suivant l'expression de M. Abildgaard, lui a fait donner, par ce savant, le nom de *cryolithe*, dérivé de *κρυο*, *froid ou glace*, et de *λίθος*, *pierre*.

S E C O N D E C L A S S E

S U B S T A N C E S T E R R E U S E S.

Dans la composition desquelles il n'entre que des terres, unies quelquefois avec un alkali.

Cette seconde classe présente des diversités très-sensibles dans les caractères des substances qui la composent. La pesanteur spécifique y varie entre 4,4, qui est celle du silex, et environ 0,7, qui est celle de l'asbeste, du *légérsoufre*. Plus des deux cinquièmes des espèces ont une dureté assez grande pour résister par le choc du briquet, tandis qu'une partie des asbestes ont la souplesse du fil. Quatre espèces sont électriques par la chaleur, en deux points opposés, savoir : la topaze, la tourmaline, la mésothype et la pyrobite. Les couleurs

viers sont beaucoup plus communes dans cette classe que dans la précédente, et elle est la seule, jusqu'ici, où l'on trouve des corps qui lincnt de leur intérieur des reflets chatoyans. Quelques substances, telles que le mica et la diallage, ont, dans certaines circonstances, un feu brillant métallique.

Les formes primitives sont aussi très-diversifiées. Elles offrent plusieurs polyèdres réguliers ou remarquables par leur symétrie, comme le cube dans l'arsénine, l'octaèdre régulier dans le spinelle et le pérouite, le prisme hexaèdre régulier dans la télaie, l'émeraude, la népheline, et peut-être aussi dans la pyrite et le diopse. Cinq espèces ont pour noyau un rhomboïde, savoir : le quartz, la tourmaline, le corindon, la diopase et le chabasie. Plusieurs autres, telles que le topaze, la cymophane, l'aichse, le pyroxène, la staurolite, l'épidote, la néphotype, la stilbite, le périclète, la grenatite, le mica, ont leurs cristaux originaux d'un prisme tétraèdre, droit ou oblique, dont les divisions latérales sont ordinairement les plus nettes. Il faut en excepter surtout le topaze et le mica, où c'est le contraire qui a lieu.

La même classe réunit à plusieurs substances infusibles par un feu très-vif, telles que le quartz, la télaie, la cymophane, des substances qui se fondent aisément au chalumeau, les unes en une masse blanchâtre, comme le feldspath, d'autres en une masse spongieuse, comme la néphotype, la stilbite, la

C o n

préhaire, etc. Aucune espèce n'est soluble ni dans l'eau, ni dans les acides; deux seulement se résolvent dans ceux-ci en une espèce de grès, savoir, la gadolinite et la néstotype.

Si nous considérons maintenant les caractères relatifs à la seconde classe, par exclusion à ceux de la première, nous pourrions dire qu'elle est distinguée de celle-ci, en ce qu'aucun des corps qu'elle comprend,

1°. N'est soluble ni dans les acides ni dans l'eau.

2°. N'est électrique par la chaleur en plus de deux points opposés, (ce qui exclut la magnésie bouillie, qui s'électrise en huit points différens).

3°. N'est divisible en octaèdre régulier, à moins qu'en même temps il ne raze facilement le verre; (ce qui établit une distinction entre le spinelle et le pléonaste d'une part, et la chaux fluatée de l'autre).

4°. N'est divisible en prisme hexaèdre régulier, à moins qu'en même temps il ne soit susceptible ou de rayer facilement le verre, ou de se fondre au chalumeau. (Ceci regarde l'émeraude et le néphéline, dont l'une raze aisément le verre, et l'autre est fusible, tandis que la chaux phosphatée est infusible et ne raze point le verre) (1).

5°. N'a une pesanteur spécifique au-dessus de

(1) La télaire n'étant de plus rien analogue que dans un sens perpendiculaire à l'axe, n'est pas proprement divisible en prisme hexaèdre.

3,5 , à moins qu'il ne raze absolement le verre, (ce qui sépare la baryte sulfatée, la strontiane sulfatée et la baryte carbonatée du zircon et de la tellurie).

La classe des substances terreuses diffère de la troisième et de la quatrième, en ce qu'aucun des corps qui y sont compris n'est combustible, n'a le brillant métallique, ou n'est susceptible de l'acquies par la réduction.

On a reconnu, depuis quelques temps, dans plusieurs substances terreuses, la présence de la potasse, reconnue anciennement alliée végétales. Si tous les corps de cette classe avoient été complètement analysés, on pourroit en distinguer deux ordres, dont l'un contiendrait de porter le nom de substances terreuses, et l'autre porteroit celui de substances alkalis-terreuses.

Non-seulement l'art de la chimie a été plus tardif dans ses progrès, relativement à l'analyse des substances de cette classe, que de celles de la précédente; mais il n'a pas même fait le premier pas vers leur synthèse. Il parvient souvent à imiter la nature dans les combinaisons des acides avec les alkalis et les terres, et même à créer des produits dont elle ne lui avoit pas fourni le modèle. Mais à l'égard des substances terreuses, il s'est borné, jusqu'à présent, à rompre l'alliance naturelle de leurs molécules, sans pouvoir en retrouver le lien.

Dans les méthodes publiées précédemment, les

substances terreuses formoient la plus grande partie de la classe des pierres; le reste étoit composé des substances acides ou insolubles dans l'eau.

P R E M I E R E E S P E C E .

Q U A R T Z.

Caractère essentiel. Divisible en rhomboïde légèrement obus. Insoluble.

Caract. phys. Pesanteur spécifique du quartz-hyalin, 2,6513 2,6701; du quartz-épave, 2,4655 2,667; du quartz-résine, 2,0499 2,6695; du quartz-jaspe, 2,3587.... 2,806.

Durcié. Rayant le verre; élimant sous le briquet.

Réfraction, double.

Phosphorescence. Les morceaux blanchâtres en produisent une sensible, par leur frottement mutuel.

Caract. géom. Forme primitive: Rhomboïde légèrement obus (fig. 4) pl. XL, de 34° 4' et 85° 56' (1). Les coupes à l'aide desquelles on extrait ce rhomboïde des cristaux secondaires, sont quelquefois assez nettes. Mais il y en a de moins faciles à obtenir dans d'autres sens, que nous serons bientôt en mesure de décrire.

(1) Le rapport entre les deux diagonales est celui de 1715 à 1045.

Molécule intégrante ; tétraèdre irrégulier.

Molécule soustractive ; rhomboïde assimilable au moyen.

Caract. chém. Indiscutable.

Caract. dist. 1°. Entre le quartz-hyalin prismal, var. a, et le charn. phosphatisé pyramidal. Le premier a les faces de ses pyramides inclinées de $141^{\circ} 40'$ sur les pans adjacens, et la seconde seulement de $129^{\circ} 28'$. 2°. Entre le quartz-hyalin bleu taillé et la téflée bleue. Celle-ci a une pesanteur spécifique plus grande dans le rapport, d'environ 3 à 2; elle n'a point la double réfraction, comme le quartz. 3°. Entre le quartz-hyalin bipède et la téflée, dite apatir blanc, id. 4°. Entre le quartz-apatir chatoyant et le feld-spath nacré. Le premier n'a point le liseré très-lamelleux comme l'autre. Le couleur du fond est brune, grise ou verdâtre, dans le quartz chatoyant; elle est blanchâtre dans le feld-spath.

I. QUARTZ-HYALIN.

C'est-à-dire, ayant une apparence vitreuse. Cassure conchale et brillante, sans avoir le liseré de la résine; corps souvent cristallins.

VARIÉTÉS.

FORMES.

Déterminables.

1. Quartz-hyalin dodécédre. $\frac{P}{P} \frac{a}{x} \frac{b}{x}$ (fig. 1)

Cristal de roche dodécédrique. *De Edsle, t. II, p. 70.*
Incidence de P sur s' , ou de s sur P' , $103^{\circ} 20'$; de
 P sur s , $155^{\circ} 48'$ (1).

Pour mieux concevoir la structure de cette variété, rappelons-nous que quand les lamæ de superposition décroissent par deux rangées en largeur sur les angles latéraux aux , tos , aux , etc. (Fig. 2), d'un rhomboïde quelconque, le décroissement donne six faces parallèles à l'axe. (Voyez t. I, p. 65). Si la loi avoit une action plus rapide, comme dans le cas où elle auroit lieu par trois ou par quatre rangées, les faces produites s'inclinoient de manière que celle qui proviendrait, par exemple, du décroissement sur l'angle aux , fût coupée en dessous du sommet f le prolongement de l'axe.

Supposons, d'une autre part, une loi de décroissement par deux rangées en hauteur, laquelle sera nécessairement moins rapide que celle par deux rangées en largeur, puisque son expression est $\frac{1}{2}$, tandis que celle de l'autre est $\frac{1}{3}$; alors les faces produites se rejettent en sens contraire, c'est-à-dire, par exemple, que celle qui résultera du décroissement sur l'angle aux , deviendra parallèle au triangle aux , et ira couper en dessous du sommet m le prolongement de l'axe.

(1) La perpendiculaire menée du centre de la base d'une des pyramides sur un des côtés de cette base, est à l'axe de la même pyramide dans le rapport de $\sqrt{3}$ à $\sqrt{6}$.

Si les décroissemens atteignent leur limite, la forme à laquelle ils donneroient naissance auroit cela de remarquable, qu'elle ressembleroit artificiellement au noyau, excepté qu'elle auroit de plus grandes dimensions. Mais si l'on suppose qu'ils s'arrêtent à un certain terme, il restera six triangles parallèles aux faces du noyau, et le résultat sera semblable à celui qui est représenté fig. 3, où l'on voit le noyau $f'ce'$ enfoncé dans le cristal secondaire; on voit, par exemple, que le triangle $h'f'k$ est parallèle au rhombe $f'o'a'x'$, et que le triangle $h'ek$ est le produit d'un décroissement exécuté par $\frac{1}{2}$ sur l'angle $o'a'x'$.

Les petits rhomboïdes que nous venons de considérer comme éléments de la structure, ne représentent ici que les molécules constructives et non pas les molécules intégrantes, qui sont, comme nous l'avons dit, des tétraèdres. Pour déterminer la forme de ces tétraèdres et leurs positions dans l'intérieur des cristaux, supposons que les molécules constructives, dont l'une est représentée fig. 2, soient soulevées suivant des plans $h'ek$, $h'f'g$, $h'ek$, etc., qui passent par les sommets f , ce , et par les milieux des bords inférieurs ce , xe , ef , xe , etc. Le rhomboïde se trouvera transformé en un dodécèdre semblable à celui de la fig. 1. Concevons, d'une autre part, que le dodécèdre soit divisible à son tour dans le sens de six plans, dont les sections coïncident avec les arêtes fg ,

fh , fk , etc., et en même temps par l'axe. Il en résultera six tétraèdres, dont l'un, par exemple, aura pour faces, d'une part, les triangles hfk , hok , et de l'autre, ceux qui ont pour côtés extérieurs fh , ho , fk , ko , avec un côté commun intérieur, qui est l'axe du dodécèdre.

Si nous supprimons maintenant les autres tétraèdres, tels que $ahok$ (fig. 2), etc., interceptés par les premières divisions, le dodécèdre (fig. 1) se trouvera uniquement composé de tétraèdres semblables à ceux que nous avons obtenus en second lieu, et qui représenteront les molécules intégrantes. Par une suite nécessaire, il y aura dans l'intérieur du cristal des vides produits par l'absence des tétraèdres semblables à $ahok$ (fig. 2); mais les molécules contractives seront toujours, ou moins équivalamment, des rhomboïdes que l'on se représentera, en complétant, par la pensée, les petits dodécèdres qui en forment la partie solide; et ainsi la structure se trouve ramené au résultat que nous avons dit être général pour toutes les espèces de formes primitives. (Voyez t. 1, p. 95.)

Dans cette même hypothèse, les cristaux de quartz, outre les coupes parallèles aux faces hfk , hok , ghk , etc. (fig. 1), qui correspondent aux rhombes du noyau, en admettront d'autres qui seront parallèles aux faces intermédiaires hfl , ghl , etc. (1),

(1) Dans ce cas, les faces dont il s'agit ne sont plus com-

et d'autres encore dans le sens des plans verticaux *fgw*, *fkm*, *filn*, etc. Mais les uns et les autres de ces dernières coupes seront moins nettes et moins faciles à obtenir que les perpendiculaires. La raison en est que les joints situés aux endroits de ces mêmes coupes ne sont pas exactement sur un même plan, ainsi que le démontre la théorie; mais nous nous bornons à indiquer ici ce résultat, qui a été développé dans la partie géométrique (1). D'ailleurs, si l'on s'en tient aux molécules attractives, dont la considération suffit pour concevoir les effets des décroissemens, tout se simplifie et rentre dans les lois des cristallisations ordinaires.

2. *Quartz-hyalin prism.* $\frac{\hat{a}P\hat{c}}{rPz}$ (fig. 5). De *Lisle*, t. II, p. 71 et suiv.; var. 1 jusqu'à 9 inclusivement. Incidence de P sur *r*, ou de *a* sur *r'*, 141° 40'.

Les pans du prisme sont souvent sillonnés par des stries perpendiculaires aux arêtes longitudinales, qui indiquent les bords des lames décroissantes d'où résulte le même prisme. Souvent aussi les faces des pyramides sont chargées de sillons

peu de points de rhomboïdes, comme dans la suppression que nous avons faite d'abord; elles sont, au contraire, des assemblages de faces triangulaires, mais leur inclination reste la même.

(1) Voyez t. I, l'article du dodécèdre tétragonal.

triédroïtes, qui forment des espèces d'ondulations, et quelquefois ressemblent à de petits triangles isocèles arrondis par le bas.

a. *Alternas*. Les faces de chaque pyramide sont alternativement grandes et petites, de manière que les unes et les autres se correspondent sur les deux pyramides. Les petites conservent la figure triangulaire, et les grandes sont des pentagones.

b. *Diachernes*. Les faces de chaque pyramide sont alternativement grandes et petites, de manière que les unes et les autres alternent avec entre elles sur les deux pyramides, chacune des grandes étant parallèle à une petite prise vers le sommet opposé.

Dans certains cristaux isolés, où le prisme est presque nul, les plus petites faces elles-mêmes sont à peine sensibles, de manière que le solide offre à peu près l'aspect d'un rhomboïde (Fig. 4) peu différent du cube, l'angle au sommet étant, comme nous l'avons dit, de 94° $\frac{1}{2}$. Il y a aussi de ces cristaux réunis en groupes, et tellement serrés les uns contre les autres, qu'on ne voit que leurs sommets; en sorte qu'on seroit tenté de les prendre pour un amas de cubes. C'est ce qui a fait croire à quelques naturalistes qu'il y avoit du quartz cubique.

c. *Comprimé*. Prisme aplati, de manière que deux de ses pans opposés étant beaucoup plus larges que les quatre autres, le cristal ressemble

à une table oblongue, dont les bords sont en biseau.

3. *Quartz-byala rhombôgène*. $\begin{smallmatrix} \alpha P \alpha \\ r P \alpha \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} \beta \\ \alpha \end{smallmatrix} \left(\begin{smallmatrix} E' B' D' \\ \alpha \end{smallmatrix} \right)$

(*Fig. 6*). Six des angles solides latéraux de la var. α remplacés par des facettes rhombes α bisalternes, dont les angles sont de $108^{\circ} 32'$ et $71^{\circ} 28'$. Valeur de l'angle plan γ , $137^{\circ} 36'$. Incidence de α sur r , 142° . La figure du rhombe dépend de ce que les deux côtés supérieurs sont parallèles aux arêtes α , r de la pyramide. Dans ce cas, les deux intersections du plan α avec les faces de la pyramide, forment entre elles le même angle que celles qui se font sur les pans du prisme; et il est remarquable que ce résultat ait toujours lieu, quelque soit l'inclinaison des faces de la pyramide.

Il est rare que les six rhombes existent à la fois sur le cristal. Le plus souvent il n'y en a que deux ou trois.

4. *Quartz-byala pélagiôdre*. $\begin{smallmatrix} \alpha P \alpha \\ r P \alpha \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} \beta \\ \alpha \end{smallmatrix} \left(\begin{smallmatrix} E' D' D' \\ \alpha \end{smallmatrix} \right)$

$\left(\begin{smallmatrix} E' D' B \\ \alpha' \end{smallmatrix} \right)$ (*Fig. 7*). Les angles solides latéraux de la var. α interceptés par autant de facettes trapézoïdales, situées de biais. Incidence de α sur P , ou de α' sur α , $140^{\circ} 42'$; valeur de l'angle g' ou g , $162^{\circ} 46'$; valeur de l'angle γ ou

y' , et 56° . Les facettes x , x' , quoiqu'elles soient semblablement par rapport au cristal, ont des positions différentes relativement au noyau, (fig. 4), d'où il suit qu'elles doivent résulter de deux lois différentes de décroissement (1).

Quelquefois les facettes du plagiédre se combinent sur un même cristal avec celles du rhombifère; et parce que l'angle y ou y' (fig. 7) est égal à l'angle y (fig. 6), les bords qui, dans les deux facettes, correspondraient au plan r , sont parallèles entre eux.

5. Quartz *pentahédre*. $\begin{smallmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & P & \frac{1}{2} \\ r & m & P & x \end{smallmatrix}$ (fig. 8).

Les arêtes horizontales du quartz prismatique remplacées par des triangles m , en incidence de m sur P , et $41^\circ 51'$; de m sur r , et $56^\circ 43'$. Cette variété a été déterminée par le Cit. Tremery, ingénieur des mines.

Il y a aussi des cristaux qui sont à la fois rhombifères, plagiédres et pentahédres, mais seulement sur quelques-uns de leurs angles ou de leurs bords, en sorte que les lois de la symétrie ne sont pas observées.

Indéterminables.

6. Quartz *hyalin laminaire*. Cette variété, com-

(1) Voyez l'article du quartz, partie géom. ci-dessus, p. 30 et suiv.

aidée relativement aux jeux de lumière, est un quartz gris. Ses lames sont quelquefois assez distinctes pour permettre d'extraire, sans beaucoup de difficulté, le rhomboïde qui représente la molécule constructive.

7. Quartz-hyalin amorphe. *Quartzes quartz*, *Essenring*, t. I, p. 125. *Id.*, *Werner*, *cat.*, p. 241. Le quartz commun, *Beudant*, t. I, p. 243. En masses vitreuses, plus ou moins considérables.

8. Quartz-hyalin roulé. En petites masses arrondies par le frottement, vulgairement caillou du Rhin, de Cayenne, de Madag., etc. Cristallin opaque; albâtre cristallin, *Waller*, t. I, p. 229. *Keystein*, de *Born*, t. I, p. 44.

9. Quartz-hyalin aréolé. Grains arrondis ou anguleux, sans cohésion, ayant une surface vitreuse, vulgairement, sable ou sableux. Arena, *Waller*, t. I, p. 103 et suiv., N^{os}. 1, 2, 3 et 5. Sable quartzeux pur, de *Linde*, t. II, p. 116. Quartz gross, de *Born*, t. I, p. 7. Quartz en grains détachés; sables, *Dauvenant*, *sabl.*, p. 2.

a. Mobile. Sable mouvant. Grains fins, arrondis, susceptibles de voltiger au gré du vent.

b. Anguleux. Gravier ou grav. Sable. Grains grossiers, irréguliers, anguleux.

Nota. Le grès quartzeux n'est autre chose que du quartz aréolé, dont les grains ont été réunis par un ciment. Il ne diffère des poudings et des

bêches quartreuses, que par la petitesse des fragmens agglutins; il doit être placé, en conséquence, dans l'appendice général, à la suite de ces aggrégats.

10. *Quarta-hyelin concentré*. Fécite de Thomson, *ibid. Britan., t. I, janv. 1796, n°. quinquiesme, N. 2, p. 185. Hydrie, Kirwan, t. I, p. 296. Muller glass ou lavaglass des allemands. Cylindrique, coriace, musclé, ramé, etc.; tantôt limpide et tantôt d'un blanc de lait joint à un aspect écaillé.*

Le célèbre Thomson a trouvé de ces concrétions dans les cavités d'une lave dure de la montagne de Santa-Fiora. On en a observé, depuis, à la Solitaire, à l'île d'Ichia et dans d'autres endroits. Celles qui sont déphanes deviennent opaques, et prenant une apparence perlée, par une légère action du feu. Mais il s'en trouve aussi qui ont naturellement cette apparence. Telle est celle que m'a donnée M. Léopold de Buch, et que ce savant naturaliste avoit prise à Santa-Fiora. Elle est, de plus, légère et fragile. Thomson attribue la formation de ces stalactites à une dissolution de la silice par le soude, à l'aide de la haute température des vapeurs qui s'échappent du sein de la terre, dans les endroits volcaniques, par des espèces de soupiraux naturels, nommés *fumaroli*.

Le Muller glass des allemands a été trouvé aux environs de Frankfort sur le Rhin, dans une substance que l'on a regardée comme une lave. Les

inorganiques

marbreux que j'en ai vu étoient mamelonnés, translucides, et d'une couleur grisâtre; leur structure étoit un peu concave, et avoit un luisant qui m'a paru rapprocher davantage ces concrétions du *quartz-hyalin* que du *quartz-agathe calcedoine*, avec lequel plusieurs minéralogistes les ont réunies.

ACCIDENS DE COULEUR.

Couleurs.

1. *Quartz-hyalin incolore*. *Quartzum crystallinum colore aquo*, Waller, t. I, p. 222. *Crystals montane*, id., p. 226. *Cristal de roche*, de Lisle, t. II, p. 70. *Id.*, de Bern, t. I, p. 13. *Berg kristall*, Kamsberg, t. I, p. 117. *Id.*, Werner, *catal.*, p. 235. *Cristal de roche*, Sciogr., t. I, p. 317. *Cristal de roche blanc*, Dandenton, *tabl.*, p. 2. Le cristal de roche, Brachant, t. I, p. 245. Le Cit. Rochon en a trouvé, à Madagascar, des morceaux qui étoient d'une si belle eau, et d'une densité si égale, « qu'à peine, dit-il, les mailles leurs glaces pouvoient-elles soutenir la comparaison avec ce cristal » (1).

2. *Quartz-hyalin violet*. *Crystallus colorata violacea*, Waller, t. I, p. 231. *Amethyste*, de Lisle, t. II, p. 113. *Id.*, de Bern, t. I, p. 16. *Amethyst*,

(1) Recueil de min. sur la physiq. et le mécan., p. 156.

Reusselberg, t. I, p. 111. Cristal de roche violet, *Dandewton*, *ibid.*, p. 2. *Améthyste*, *Karwan*, t. I, p. 246. L'*améthyste*, *Brochant*, t. I, p. 240.

Rarement la couleur violette s'étend uniformément dans la pierre ; elle est plus foncée à certains endroits, plus faible dans d'autres, et il y a des parties où elle disparaît.

Le mot *améthyste* dérive, dans la langue grecque, au dire qui n'est pas sûr. On avoit donné ce nom à certaines pierres, dans lesquelles le rouge du vin étoit tempéré par un mélange de violet, en sorte qu'elles n'usent, pour ainsi dire, que schématiquement de cette liqueur (*).

3. *Quartz-hyalin bleu* *Cristallus coloratus ceruleus*, *Waller*, t. I, p. 234. Cristal bleu ou asphr d'eau, de *Lisle*, t. II, p. 113. Cristal de roche bleu ; asphr d'eau, *Dandewton*, *ibid.*, p. 2. Fant asphr et asphr occidental de quelques auteurs.

4. *Quartz-hyalin bleu-grisâtre*. Rapporté d'Espagne par Lennoy, en cristaux dodécédres.

5. *Quartz-hyalin rose*. *Cristallus coloratus ruber*, *Waller*, t. I, p. 230. Cristal de roche, couleur de rubis, de *Lisle*, t. II, p. 119. *Rosmaroth-quartz*, *Reusselberg*, t. I, p. 136. Cristal de roche rouge, *Dandewton*, *ibid.*, p. 2. *Quartz laiteux* ou *quartz rose*, *Brochant*, t. I, p. 246. *Rubis de Bohême*, *rubis de Sibirie*, *prims*

(*) *Philos. hist. nat.*, t. XXXVII, c. 9.

de rubis de quelques auteurs. Sa couleur rouge est ordinairement peu intense.

6. Quartz-hyalin jaune. *Crystallus coloratus flavus*, *Waller*, t. I, p. 231. Cristal d'un jaune clair, de *Linde*, t. II, p. 118. Cristal de roche jaune; topaze occidentale, *Dandenton*, *tabl.*, p. 2. Fausses topazes; topaze de Bohême; cristal citrin de quelques auteurs.

7. Quartz-hyalin orangé. Rapporté d'Espagne par *Lamoy*, en cristaux prismes.

8. Quartz-hyalin enfumé. *Crystallus coloratus fuscus*, *Waller*, t. I, p. 232. Cristal de roche d'un brun foncé, de *Linde*, t. II, p. 119. Quartz brun, de *Bern*, t. I, p. 25. Cristal de roche noir ou noirâtre; topaze enfumée, *Dandenton*, *tabl.*, p. 2. Diamant d'Alençon de quelques auteurs.

9. Quartz-hyalin vert-émeraude. *Quartzum coloratum viride*, *Waller*, t. I, p. 223. Quartz infusé, gras, vert, demi-transparent, de *Bern*, t. I, p. 9. *Prisman*, *Emmerling*, t. I, p. 233. *Id.*, *Werner*, *catal.*, t. I, p. 235. La pierre, *Brochant*, t. I, p. 262. *Prisman*, *Krieger*, t. I, p. 249. Il ne faut pas le confondre avec le quartz mélangé de chlorite, laquelle forme une espèce de usage comme suspendu dans l'intérieur de la pierre, ou une simple croûte appliquée à l'extérieur, au lieu qu'ici la couleur verte est distribuée uniformément dans la masse. C'est à ce quartz coloré par la chlorite que se rap-

portent les phrases suivantes : cristallus colorata viridis, *Waller*, t. I, p. 252. Quartz cristallisé vert, de *Born*, t. I, p. 28. Cristal de roche vert, *Dandenton*, *ibid*, p. 2.

10. Quartz-hyalin hématite. D'un rouge sombre, quelquefois jaunâtre, qui provient d'un mélange de fer oxydé, semblable à celui dont est composé le fer hématite.

a. Cristallisé. Cristal de roche d'un rouge plus ou moins foncé. De *Lisle*, t. II, p. 78. Cristallus colorata ferri rubens, *Waller*, t. I, p. 251. Quartz cristallisé d'un rouge de corailine, de *Born*, t. I, p. 14. Vulgairement hyacinthe de Compostelle, et, selon d'autres, hyacinthe occidentale. On en trouve en cristaux isolés, ordinairement prismes, quelquefois dodécédres, et d'une régularité parfaite.

b. Massif. Jaspé opaque, particulis distinctis, sinapci, *Waller*, t. I, p. 318. Sinape ou sinapci, de *Lisle*, t. II, p. 166. Jaspe à couleur sêbe, rouge, ferrugineux, de *Born*, t. I, p. 124. Sinaple, *Schlegel*, t. I, p. 346. *Id.*, *Kirwan*, t. I, p. 313. On l'avait rangé parmi les jaspes ; mais Dolomieu a reconnu qu'il appartenait plutôt au quartz hématite. Il contient différentes substances métalliques, et quelquefois du fer.

11. Quartz-hyalin laiteux. D'un blanc mat, quelquefois en cristaux isolés.

12. Quartz-hyalin noir. Cristallus colorata nigra,

Haller, t. I, p. 232. Cristal noir, de Lienz, t. II, p. 122.

Oùver, Wallerius cite un quartz-hyalin d'un rouge violâtre, qu'il regarde comme étant l'albaidine d'Aldrovande (1). Il ajoute que d'autres le rapportent au grenat, dont il diffère cependant par sa forme. Selon l'auteur de l'article dissimilaire, Encyclopédie Méthodiq. (2), l'albaidine, qu'il nomme aussi *aduvandine*, est une pierre d'un rouge foncé, que l'on classe entre le rubis et l'améthyste, quoiqu'elle n'en ait pas la dureté. Une pareille indication laisse trop à deviner, pour donner matière à aucune conjecture.

Rejets particuliers.

13. Quartz-hyalin gras. *Quartzum solidum, attractu pingue, facie nitens. Quartzum pingue, Haller, t. I, p. 221. Quartz gras, de Lienz, t. II, p. 124. Quartz informe, gras, de Bern, t. I, p. 8.* Il a un aspect gras et onctueux, comme s'il eût été froissé d'huile.

14. Quartz-hyalin aventuriné. *Quartz informe aventuriné, de Bern, t. I, p. 20. Aventurinus naturalis, ou quartz aventuriné, de Lienz, t. II, p. 124.* Il est, suivant les nuances, d'une couleur rouge-foncé, ou grise, verdâtre, noirâtre, etc.,

(1) T. I, p. 232, 2.

(2) *Ann. de Minér.*, 2^e partie, t. II, p. 148.

brillante par les reflets, tantôt jaunes et tantôt argentés, que lancent des parcelles très-minces de quartz pur, disséminées dans la masse. Il faut éviter de le confondre avec le quartz mélangé de mica, ou quartz micacé, qui appartient aux roches.

Un ouvrier ayant laissé tomber, par hasard, en, comme l'on dit, *par aventure*, de la limaille de laiton dans une matière vitreuse en fusion, donna le nom d'*aventurine* à ce mélange, dont on a fait, depuis, des vases et autres objets d'ornement. Les minéralogistes ont appliqué le même nom aux substances naturelles dont ce produit de l'art offroit une imitation apparente.

15. Quartz-hyalin irisé. Iris par fibres, de Lacle, t. II, p. 113. Cristal de roche diaphane, irisé, de Born, t. I, p. 40.

a. Irisé intérieurement. Il sort de son intérieur des reflets diversément colorés, semblables à ceux du l'arc-en-ciel. Nous en exposerons le cause physique à l'article du quartz réfractif opalin.

Le quartz-hyalin irisé à l'intérieur est ce que plusieurs auteurs ont appelé iris. Mais on a donné aussi ce nom aux cristaux de quartz limpide d'un poli assez égal, pour que deux de leurs plans inclinés entre eux fassent l'office de l'angle réfringent d'un prisme triangulaire, en sorte qu'étant exposés au soleil, ils projettent l'image colorée de cet arc sur une muraille située à une

distance convenable. Pline a parlé de cette sorte d'iris, et il dit qu'elle est hexagonale comme le cristal (1).

6. Irisé superficiellement.

Transparence.

1. Quartz-hyalin transparent. Les variétés violettes, bleues, jaunes, orangés et rubines.

2. Quartz-hyalin translucide. Le quartz rose, le vert obscur, le gris et quelquefois l'hématite.

3. Quartz-hyalin opaque.

A P P E N D I C E.

Quartz-hyalin aéro-hydré. Quartz contenant des bulles d'air et d'eau. De Lisle, t. II, p. 110. Cristal de roche diaphane, renfermant une goutte d'eau mobile, de Bern, t. I, p. 41. L'écoulement dont il s'agit ici est surtout sensible lorsque la goutte d'eau occupe une cavité tubulée, en sorte que la bulle d'air qu'elle contient monte et descend pendant les mouvemens de la pierre, comme dans le niveau d'eau.

II. QUARTZ-AGATHÉ.

Cassure plus ou moins lisse, quelquefois écailleuse. Corps ordinairement concrétionnés.

(1) Hist. nat., l. XXXVII, c. 3.

Silice, pétrosilice, schiste (à l'exception de quelques variétés de pétrosilice), *Waller*, t. I, p. 263. Quartz, espèce II, de *Lisle*, t. II, p. 133. Silice, de *Born*, t. I, p. 146. Terre siliceuse unie à l'argileuse, *Sciogn*, t. I, p. 325.

F O R M E S.

1. Quartz-agathe stalactite. Quartz en stalactites, de *Lisle*, t. II, p. 133. Calcédoines mamelonnées et calcédoines stalactites, de *Born*, t. II, p. 92 et suiv. Calcédoines en stalactites, *DuRoi*, *ibid.*, p. 3.

a. Cylindrique.

b. Conique.

c. Mamelonné.

2. Quartz-agathe sphéroïdal.

a. Solide. En boule pleine, dont le centre est quelquefois occupé par du quartz-hyalin. Géode ou boule d'agate, de *Lisle*, t. II, p. 138.

b. Creux. Tantôt tapissé de cristaux de quartz violet, ou d'une autre couleur, tantôt renfermant une poussière ou un noyau solide de crin. Œlites siliceux, cavités interdum vanae, interdum gossili, etc., *Waller*, t. II, p. 614.

c. Ecliydre. Creux et renfermant de l'eau. Quelquefois la cavité est en outre tapissée de petits cristaux de quartz-hyalin. Ecliydre, de *Lisle*, t. II, p. 37, note 12, et p. 142. Calcédoine grise transparente, ronde, renfermant une goutte d'eau

matité, de Bern, t. I, p. 96. Calcédoine arrondie et creusée, enhydre, Daubenton, tabl., p. 3.

3. Quartz-agathe rosée. Galles, de Lisle, t. II, p. 581.

4. Quartz-agathe amorphe.

QUALITÉS DE LA PÂTE ET ACCIDENS DE LUMIÈRE.

Pâte fine. Couleurs vives et agréables, surtout après le poli; corps souvent translucides.

1. Quartz-agathe calcédoine. D'une transparence nébuleuse. Achates vix pellucidas, achelousas, colore griseo mixtas, calcédonias, Waller, t. I, p. 287. Calcédoine, de Lisle, t. II, p. 143. Id., de Bern, t. I, p. 89. Calcédon, Emmertag, t. I, p. 252. Id., Werner, catal., t. I, p. 252. Calcédoine, Selag., t. I, p. 325. CCXVI. B. Idem, Daubenton, tabl., p. 3, n°. 1, 2, 3. Calcédoine, Kirwan, t. I, p. 297. La calcédoine, Brochant, t. I, p. 268.

a. Blanchâtre.

b. Blanche.

Les cristaux de quartz-hyalin sont quelquefois revêtus d'une croûte de quartz-agathe calcédoine.

2. Quartz-agathe cornaline. Le plus beau a la couleur rouge, et la demi-transparence de la corne. Quelquefois le rouge tempéré par une teinte d'o-

orangé, approche de la belle couleur de chair. *Achatas ferè pellucida*, colore rubente, carneolus, *Waller*, t. I, p. 285. Cornaline, de *Linde*, t. II, p. 145. Calédoine rouge ou cornaline, de *Born*, t. I, p. 106. Cornaline, *Seign.*, t. I, p. 330. *Karaïch*, *Emmerling*, t. I, p. 157. *Id.*, *Werner*, *catal.*, t. I, p. 155. *Id.*, *Dauvenon*, *tabl.*, p. 3. Carochon, *Kirwan*, t. II, p. 300. La cornaline, *Brochant*, t. I, p. 272.

3. Quartz-agathe sardaise. Couleur orangée, qui est sujette à être effleurée par une teinte de brun sombre ou de noirâtre. *Carnaculus flavescens*, colore crudi vel aurantiorum, *Waller*, t. I, p. 28, 6, d. *Carnaculus fuscus*, *ibid.*, c. Calédoine jaune ou orangée; cornaline arde, de *Born*, t. I, p. 100. Sardaine, *Seign.*, t. I, p. 352. *Id.*, *Dauvenon*, *tabl.*, p. 3, n°. 1 et 2.

Le *sardonyx* des anciens étoit une pierre de différentes couleurs. Voyez les annotations, n°. 13.

4. Quartz-agathe prase. D'un vert clair et tendre. *Achatas pellucida*, subulcus, viridacens; prasina, *Waller*, t. I, p. 292. Prase ou chrysoprase, de *Linde*, t. II, p. 167. Agathe vert de prase, compacte, demi-transparente; chrysoprase, de *Born*, t. I, p. 111. *Kriôprase*, *Emmerling*, t. I, p. 74. *Id.*, *Werner*, *catal.*, p. 164. Chrysoprase et prase, *Seign.*, t. I, p. 326. Prase, *Dauvenon*, *tabl.*, p. 3. Chrysoprasium, *Kirwan*, t. I, p. 284. La chrysoprase, *Brochant*, t. I, p. 260.

Klaproth a prouvé que sa couleur étoit due à l'oxyde de nickel.

5. Quarz-agathe vert obscur. Il est translucide et souvent marqué de points rouges : dans ce dernier état, il appartient au quartz-agathe pectiné, dont nous parlerons plus bas.

6. Quarz-agathe chatoyant. Des reflets blanchâtres qui partent d'un fond brun, gris ou verdâtre. *Pseudopodus opacus radice ad superficiem evirescentibus et flaviscentibus, oculis cati*, *Waller*, t. I, p. 296. Œil de chat, de *Lisle*, t. II, p. 145, note 68. Feld-spath infusus, chatoyant, gris; œil de chat, de *Born*, t. I, p. 148. Katon asge, *Bassowling*, t. I, p. 188. Quarz à reflets diversément colorés; œil de chat, *Darben-ton*, tabl., p. 2. Chatoyante des lapidaires. L'œil de chat, *Brachant*, t. I, p. 292. On l'avoit regardé comme une variété de feld-spath; mais d'après l'analyse que Klaproth en a faite, il est presque entièrement composé de silice (1).

PATE MOINS FINE OU GROSSIÈRE.

Conchroagathinaria, corps rarement translucides, et ce n'est sur les bords.

7. Quarz-agathe pyromaque, c'est-à-dire, qui fait feu pour le combat. Divisible, par la perru-

(1) *Journ. des min.*, 2^e 25, p. 92.

sion, en fragmens convexes, à bord tranchant, qui, frappés par l'acier, en fissent de vives étincelles. Couleur noirâtre, grisâtre ou blonde. Silex opacus, fracturâ nîcus, costacis, durus; silex ignisarius, *Waller*, t. I, p. 275. Pierre à fusil, de Born, t. I, p. 227 et suiv. Fous stein, *Boernerberg*, t. I, p. 145. *Id.*, *Werner*, *catol.*, t. I, p. 250. Silex ou pierre à fusil, *Solign.*, t. I, p. 351. Pierre à fusil, *Daubenton*, *tabl.*, p. 3. Flint, *Kirwan*, t. I, p. 701. La pierre à fusil, ou pierre à fusil, *Becham*, t. I, p. 265.

8. *Quartz-agathe molle*, c'est-à-dire, propre à faire des meules. En masses, en parties solides et en partie concaves, ou comme caries. Couleur blanchâtre ou jaunâtre. Petrosilex opacus, varis foramsibus inordinatè distinctus; petrosilex molis, *Waller*, t. I, p. 282. Pierre meulière, de Lisle, t. II, p. 286. Quartz curé; pierre meulière, *Daubenton*, *tabl.*, p. 1.

9. *Quartz-agathe grossier*. Durent difficilement des étincelles par le choc du bruyet. Silex opacus, gregarius, squabîlis, parum squamosis, mollis, *Waller*, t. I, p. 272. Coillon, *Daubenton*, *tabl.*, p. 4.

P R E M I È R E A P P E N D I C E .

Mélanges de matières diversément colorées, qui deviennent semblables surtout à l'aide du poli.

1. *Quartz-agathe aye*, c'est-à-dire, semblable

d'un angle (1). Des bandes parallèles de différentes couleurs, dont les bords sont nettement tranchés. Achates vit semi-pellucidas, facies est strata diversè colorata ornatus, onyx, *Haller*, t. I, p. 289. Achates semi-pellucidas, nuchosus, stratus — donatus rubentibus aut nigrescentibus, sardonyx, *ibid.*, p. 291. Cornedus oculatus et onychinus, *ibid.*, p. 285, b, c. Agathe onyx; cornelina onyx; sardonius, de *Link*, t. II, p. 150. Calcédoine rouge ou cornaline onyx, orientale, de *Born*, t. I, p. 168. III, B, à a et suite. Agathe rubanée, *ibid.*, p. 291. Agathe onyx; agathe grillée, *Songr.*, t. I, p. 309. Onyx, *ibid.*, p. 330. Agathe, calcédoine, cornaline, sardoine, caillou onyx, *Danderton*, *ibid.*, p. 2 et suite.

Exemples. a. Bandes d'un blanc de lait, sur un fond de quartz calcédoine ordinaire.

b. Bandes alternatives de quartz calcédoine et de quartz sardoine.

c. Bandes alternatives de quartz opaque, les uns d'un brun noirâtre, les autres d'un brun jaunâtre. Cet aspect est celui que présente souvent le quartz, connu sous le nom de caillou d'Égypte.

d. Quartz-agathe *ponarâs*. Orné de veines ou de taches distribuées sans ordre. Cornalus rubentibus, maculis, vel lineis ornatus. *Haller*, t. I, p. 286, g. Calcédoineus hians et maculis ornatus, *ib.*,

(1) Cette éponymie sera expliquée dans les annotations, N°. 19.

p. 288, c. Agathe tachée, Sciagr., t. I, p. 329. Agathe, calcédoine, ardoise, grise, coillon, veinée ou tachée, Dandenton, tabl., p. 2 et suite.

9. Quarze-agathe ponctuée. *Carneculus albicernus*, punctulis rubris; stigmates, gemmae Sancti-Stephani, P'aillet, t. I, p. 285. Calcédoine grise, transparente, tachée de petits points rouges; graine de Saint-Etienne, de Bern, t. I, p. 104. Agathe ponctuée, Sciagr., t. I, p. 328. Id., Dandenton, tabl., p. 2.

Exemples. a. Points rouges sur un fond de quarze-agathe calcédoine.

b. Points rouges sur un fond de quarze-agathe vert-obscur. C'est le véritable *heliotropus* des anciens. Voyez Boiss de Bosc, de lapid. et gemm., lib. II, c. 268, p. 255. Heliotrop? Emmerling, t. I, p. 171. On le range, mal à propos, parmi les jaspes, puisqu'il est translucide (1).

10. Quarze-agathe arboresc. *Achatas figuratus*; *achates mochoisus*, moches, dendrochates, pierre de moche, P'aillet, t. I, p. 299. *Carneculus dendriticus*, ibid., p. 287. Agathe herbacée, de Lisle, t. II, p. 148. Calcédoine grise herbée ou moussueuse, avec des herbacisations brunes; pierre de moche, de Bern, t. I, p. 105. La même,

(1) Boiss de Bosc observe que les plus belles lapidaires l'en séparent, pour cette raison. Ibid., p. 257.

avec des héberisations rouges, blanches ou roseâtres, *ibid.*, p. 106. Agathe héberisée, *Sciogr.*, t. 1, p. 729. Agathe, coralline, ardoise héberisée, *Daubenton*, *ibid.*, p. 2 et 3.

Exemples. a. Dendrites noires, sur un fond de quartz-agathe calcédoine. Ces dendrites sont composées d'une multitude de petits grains ferrugineux, rangés sur différentes files, qui se ramifient en partant d'un tronc commun.

â. Dendrites rougeâtres sur le même fond. Le dessin en est ordinairement moins fin que celui de la variété a.

L'agate monacque des naturalistes est un quartz-agathe demi-transparent, dont la substance enveloppe des matières hétérogènes, qui ressemblent souvent à des brins de petites plantes. Daubenton a cru y reconnaître des confères, des lymanes, des lycées, et autres plantes cryptogames (1).

S E C O N D A P P E N D I C E.

Agate entièrement terreuse.

1. Quartz nectique, c'est-à-dire, disposé à nager, vulgairement pierre légère. En masses tuberculeuses, ordinairement blanches ou grises, à cassure reboteuse, quelquefois cellulaire et cartilagineuse à l'intérieur. Leur pesanteur est acide au toucher.

(1) *Mém. de l'Acad. des Sc.*, 1780, p. 601.

Le centre de la masse est assez souvent occupé par un noyau de quartz-agathe pyromaque.

Cette substance, mise sur l'eau, y nage plus ou moins long-temps, après quoi elle se précipite par l'effet de l'imbibition. Vauquelin en ayant analysé un morceau, y a trouvé 36 pour 100 de silice, et a de chaux carbonatée; il en résulte qu'elle n'est autre chose qu'une modification du quartz pyromaque, dont les molécules ont pénétré, dans leur aggrégation, un relâchement considérable, ce qui modifie tellement l'aspect de la masse, qu'on la prendroit pour une pierre calcaire à grain fin.

2. Quartz-agathe cacholong. *Achatos opellius*, *traces*, *foetus*, *marquatus*, *cacholensis*, *Waller*, *t. I*, p. 185. Cacholong, de *Léob*, *t. II*, p. 146, sans réf. Calcédoine blanche, opaque, cacholong, de *Born*, *t. I*, p. 101. Cacholong, *Sélag*, *t. I*, p. 330.

D'un blanc mat, opaque ou légèrement translucide aux bords, à cassure très-unie, et légèrement conchoïde; lustrant à la langue, lorsqu'il est traité à un certain degré. Il est souvent d'enveloppe au quartz-agathe calcédoine. Il paroit devoir sa couleur blanche à un mélange d'argile semblable à celle qu'on appelle kaolin. Sa cassure est quelquefois luisante; et, dans ce cas, il peut être regardé comme une variété du quartz-résinite.

3. Quartz-agathe calcifère. *Silice-calce*, *Savanne*, *Poyage*

Épave dans les Alpes, n°. 1524. Gris ou roux, à cassure fine, terne et largement conchoïde, donnant rarement et difficilement des étincelles par le choc du briquet; faisant une lente et légère effervescence dans l'acide nitrique; fusible au chalumeau, en scorie blanche et bulleuse. Il renferme souvent, dans son intérieur, des nœuds de quartz-agathe pyroscaphe, ou sorte qu'il n'est autre chose qu'un mélange de cette variété et de chaux carbonatée.

III. QUARTZ-RÉSINITE.

Minéral semblable à celui de la résine nouvellement cassée. Cassure largement conchoïde; corps qui étincellent difficilement par le choc du briquet.

Opal edler und semi-opal, *Kirwan*, t. 1, p. 289 et 290.

1. Quartz-résinite hydrophane, c'est-à-dire, qui devient transparent par imbibition. Adhèrent fortement à la langue; blanc, et quelquefois jaunâtre ou rougeâtre; légèrement translucide. Achates ungaria colore, in albe opacus, aqua pellucens, oculis nudis, *Waller*, t. 1, p. 296. Hydrophane, *Seign.*, t. 1, p. 226 et 227. Halbopal, *Ersmann*, t. 1, p. 226. *Id.*, *Werner*, *cat.*, t. 1, p. 276. Calcédoines argileuses hydrophanes, *Dauvenot*, *tabl.*, p. 3. On donne souvent pour

hydrophanes des pierres qui se rapprochent beaucoup du quartz-agathe cacholong; mais l'effet en est très-lent et peu sensible. Les bons hydrophanes ont l'aspect moins terreneux et plus lumineux que le cacholong.

2. Quartz-résinite opale. Laitieux et répandant de beaux reflets d'iris. Achates sunt pellucidus, colores sub refractione et reflectione variis; opalus, *Waller*, t. I, p. 293. Opale, de *Linde*, t. II, p. 145. *Id.*, de *Bern*, t. I, p. 31. Edelce opal, *Kunzling*, t. I, p. 243. *Id.*, *Werner*, catal., t. I, p. 277. Calcédoine irisée, opale, *Doubenton*, tabl., p. 3.

3. Quartz-résinite girasol, c'est-à-dire, qui tourne au soleil. Fond d'un blanc blanchâtre, d'où sortent des reflets rougeâtres lorsqu'on fait mouvoir le corps à une vive lumière. Les plus beaux ont l'aspect d'une gelée soyeusement translucide. An paradoxalus opacus, lucem dum circumvertitur ostendens quasi mobilem? *Waller*, t. I, p. 296. Asteria, aut solis gemma, *Boece*, de lapid. no. gem., lib. II, cap. 76. Girasol, de *Linde*, t. II, p. 145, note 163. Girasol, *Sciogr.*, t. I, p. 327. Gemeiner opal, *Kunzling*, t. I, p. 261. *Id.*, *Werner*, catal., t. I, p. 277. Calcédoine arrosée et solide, *Doubenton*, tabl., p. 3. Pierre du soleil suivant quelques auteurs, asterie selon d'autres.

4. Quartz-résinite commune. Ne s'imbibant pas sensiblement, et n'ayant aucun reflets partico-

blanc, souvent opaque, et quelquefois translucide; blanc, gris, rouge, jaune, brun, olivâtre, noir, etc., et quelquefois veiné; tantôt très-luisant, et tantôt presque pas. Pierre de colophon, de Lûde, *t. II*, p. 153. Hallopel, Remerding, *t. I*, p. 164. *Id.*, Werner, *cat.*, *t. I*, p. 178. Pierre de poix, Dandenton, *mémoires de l'Acad. des Sc.*, 1787, p. 86.

La sous-variété, qu'on a appelée *pedicels de Météorite-Montant*, ou *néphrite* (1), est en masses tuberculeuses, opaques, légèrement luisantes dans leur cassure, grisâtres ou d'un gris livide, quelquefois marquées de bleuâtre à l'extérieur. Il y en a qui sont feuilletées, ce qui peut provenir de ce qu'elles ont été formées par cristallisation dans une argile schisteuse. On en trouve aussi à Saint-Ouen, près de Paris, dans les environs du Mans, et dans quelques autres endroits de la France.

IV. QUARTZ-JASPE.

Couleur brune et composée, jointe à l'opacité. Couleur pâle ou moins persistante par l'action du feu. Substances qui, mises en communication avec un conducteur électrisé, étincellent souvent à l'approche du doigt. Elles sont composées de quartz-agathe enpié d'argile ferrugineuse. Jaspé,

(1) *Journ. de phys.*, 1787, sept., p. 219.

Waller, t. I, p. 310. Jaspé, de Lède, t. II, p. 164. Id., de Bern, t. I, p. 102. Gemme jaspée, Esmerling, t. I, p. 243. Id., Werner, catal., t. I, p. 278. Jaspé, Sciogr., t. I, p. 343. Id., Dandenton, tabl., p. 4. Jaspé, Kirwan, t. I, p. 309.

Couleurs.

1. Quarta-jaspé rouge.
2. Quarta-jaspé vert. Jaspé vert; pierre à Lancette, Dandenton, tabl., p. 4.
3. Quarta-jaspé jaune.
4. Quarta-jaspé bleu de lavande.
5. Quarta-jaspé violet.
6. Quarta-jaspé noir. Jaspé unicolor nigre; paragon, Waller, t. I, p. 313, g.

La substance appelée jaspé blanc, se rapporte au quarta-agathe, attendu qu'elle ne contient pas la quantité de fer suffisante pour caractériser le quarta-jaspé.

A P P E N D I C E.

Mélanges de divers principes colorans.

1. Quarta-jaspé oxyz. Band jaspé, Esmerling, t. I, p. 237. Id., Werner, catal., t. I, p. 271. Jaspé oxyz, Dandenton, tabl., p. 4.
2. Quarta-jaspé sanguin. Des points d'un rouge de sang, sur un fond d'un vert-bleu. Jaspé variegata obscure viridis, punctata rubris; heliotropus, Waller, t. I, p. 313. Jaspé heliotrope

ou sanguin, de *Lisle*, t. II, p. 166. Holotrop, *Emserling*, t. I, p. 171. Son aspect le distingue du quartz-agathe vert-bleuâtre parvenu de rouge, qui est translucide.

3. Quartz-jaspe pavaché. Jaspe particula sub-filicaria, solide, opaque, variegata; jaspe variegata, *Waller*, t. I, p. 313. Jaspe fleuri ou pavaché, de *Lisle*, t. II, p. 165. Jaspe veiné et jaspe onyx, *Dandevant*, *ibid.*, p. 4.

Nota. La substance du quartz-jaspe est quelquefois interrompue par des portions de quartz-agathe. On a donné à ces corps mixtes le nom de *jaspe-agathe*, ou *d'agate-jaspe*, suivant que la quantité de jaspe l'emportoit sur celle d'agate, ou réciproquement.

V. QUARTZ-PSEUDOMORPHIQUE

1. Quartz-hyalin en chaux cristallée lenticulaire. Quartz en crêtes de coq, de *Lisle*, t. I, p. 170. Quartz figuré en crêtes de coq, de *Bern*, t. I, p. 49. Se trouve à Passy, près de Paris. Il forme des groupes de cristaux lenticulaires qui ont succédé à des cristaux de chaux cristallée de la même figure, soit que la chaux fût déjà libre, lorsque la matière quarzueuse y est arrivée, en sorte qu'elle s'en fût fait que s'y modeler; soit que les molécules quarzueuses ayant remplacé successivement celles de la chaux cristallée, à mesure que les cristaux de

cette dernière substance se détruisaient. La netteté des saillies qui forment les bords des inutilles, en se relevant les unes au-dessus des autres à certains endroits, rend cette seconde explication plus plausible, parce qu'il est difficile de croire que la terre qui composait le moule eût conservé aussi fidèlement les empreintes de ces reliefs délicats.

2. *Quartz-hyalin en chaux carbonatée métaséique.* Le Cit. Goyen a observé cette pseudomorphe, dont il a donné la description dans les annales de chimie (1), avec le résultat de l'analyse, par laquelle il s'est assuré que la substance dont il s'agit étoit réellement un quartz.

3. *Quartz-agathe en chaux carbonatée prismatique.*

4. *Quartz-agathe en chaux carbonatée équiaxe.* Cette variété et la précédente ont été observées par le Cit. Dupuyt. La pâte des cristaux étoit opaque et d'une couleur brune. Quelques-uns présentoient, dans leur essence, des couches concentriques, et formoient des espèces de globes, dont l'intérieur étoit garni de quartz-agathe moulonné.

5. *Quartz-agathe en chaux carbonatée dodécaèdre.*

6. *Quartz-agathe conchyloïde.* En ovale, en cornue d'annon, en turbinelle, etc.

(1) *Le journal*, n. 7, p. 107.

7. *Quartz-agathe crysolite*. Bois agathisé. *De Lisle*, t. II, p. 166. *Dendralithe*, de *Born*, t. I, p. 496. *Holstein*, *Emmerling*, t. I, p. 166.

8. *Quartz-éolite crysolite*. *Holopai*, *Emmerling*, t. I, p. 210. *Id.*, *Werner*, *catol.*, t. I, p. 210.

Le quartz forme quelquefois des inclusions sur des cristaux d'une espèce étrangère, et en particulier sur la chaux carbonatée malacotique.

NOTES.

Raisons qui ont déterminé la réunion du quartz et du silex dans une même espèce.

1. Lorsque j'ai séparé le silex du quartz, pour en faire une espèce particulière, dans l'extrait qui a paru de ce *Traité*, je me suis laissé entraîner par l'autorité de plusieurs naturalistes célèbres; et en réunissant aujourd'hui ces deux substances sous un même nom spécifique, je reviens à l'opinion que j'avois déjà émise, plusieurs fois, dans mes cours sur la minéralogie. Ce qui m'a surtout confirmé dans cette opinion, c'est que plus j'ai réfléchi sur les distributions méthodiques des minéraux, et plus j'ai senti l'avantage dont j'ai déjà parlé ailleurs, d'en avoir une où les espèces se trouvaient réservées dans leurs véritables limites, où les différences qui servent à tracer ces limites, fussent prises dans le fonds

même des étres, plutôt que deux leurs véritables extérieurs. Or, en examinant attentivement la chose sous ce rapport, on n'aperçoit plus aucune ligne nette de séparation entre le quartz et le silice.

D'une part, l'analyse du silice pyromorphe (pierre à fusil), par le célèbre Klaproth, a donné 98 de silice sur cent, avec 0,50 de chaux, 0,45 d'alumine, 0,22 d'oxyde de fer, et 1 de matière volatile; d'où l'on peut inférer que le silice n'est essentiellement composé que de silice, comme le quartz lui-même, du moins à en juger par ce que nous concluons de mieux avisé, en fait d'analyse. D'une autre part, le silice considéré minéralogiquement, paroît n'être autre chose que du quartz concrétionné. Dans cet état, il diffère du quartz proprement dit, par une cassure plus ou moins terre. Mais on remarque la même différence entre l'albâtre coquille et la chaux carbonatée cristallisée; et lorsque l'on compare avec celle-ci certains morceaux de chaux carbonatée amorphe, à grain fin et serré, qui cependant se dissolvent en entier avec une vive effervescence dans l'acide nitrique, on seroit tenté de croire que l'on a sous les yeux deux espèces distinctes. Et si l'on objecte que le quartz cristallin se trouve souvent associé au silice, de manière qu'il semble que les circonstances ayant été également favorables à la cristallisation de tous les deux, il n'y

a qu'une diversité de nature qui ait pu déterminer des états si opposés ; cette considération s'appliquera également à la chaux carbonatée et à d'autres substances , qui offrent des contrastes analogues , sans qu'on ait cru devoir pour cela multiplier les noms spécifiques. Et l'on doit plutôt inférer de ces contrastes , que les circonstances n'ont pas été les mêmes , mais qu'il y a eu ici deux époques distinctes , l'une où la cristallisation a été guidée ou précipitée par l'effet de quelques causes accidentelles ; l'autre , où rien ne s'opposoit à l'aggrégation régulière des molécules.

Ce que je viens de dire à l'égard du silex , s'étend au quartz-réclaire et au quartz-jaspe , qui ne sont que des modifications de la substance quarreuse , dues à des mélanges de principes hétérogènes.

Mais l'espèce de quartz se trouvant alors compliquée d'une multitude de variétés de formes et d'aspects , c'est une raison de la condenser , ainsi que je l'ai fait , en plusieurs variétés principales , qui rendent plus facile l'étude des détails , sans nuire à l'unité de l'ensemble.

GISEMENTS.

QUARTZ-HYALIN.

a. Le quartz-hyalin , sans former jamais à lui seul aucune montagne , est cependant une des

substances les plus abondantes du rhyte micacé. Il appartient aux terrains de toutes les époques, et de tous les modes de formation.

Sol primordial. A l'état de cristallisation régulière, et plus ordinairement en grains informes de différentes grosseurs, il est une des parties intégrantes de beaucoup d'espèces de roches granitiques. En grains cristallins, il entre dans la pâte de plusieurs roches porphyroïques. Il forme la base ou la matière prédominante d'un grand nombre de roches micacées foliées.

Ses cristaux occupent les cavités accidentelles de presque toutes les masses considérables de roches, même de celles qui sont d'une nature calcaire, telles que les *marbres pélobitiques*. Celui de Carraro, entre autres, en rendant de très-parfaits, soit par leur limpidité, soit par la régularité de leur forme.

Mais c'est principalement dans les filons qui traversent les montagnes primordiales, que le quartz-byssin est dominant; tantôt il remplit seul ces filons; tantôt il y est associé à d'autres substances, les unes terreuses acidifères, les autres métalliques, et auxquelles il sert de gangue. Ces filons, en se dilatant, laissent des cavités plus ou moins considérables, dont les parois sont revêtues ou hérissées de cristaux transparents de quartz prismatique, qui ont quelquefois jusqu'à trois décimètres ou environ un pied de diamètre. On trouve ces

cavités poches ou foyers d cristaux, et c'est sans doute de cette localité que le quartz transparent cristallisé a emprunté le nom de cristal de roche. Les montagnes de la Tarentaise, dans le département du Mont-Blanc, les Alpes Dauphinoises et les montagnes de Madagascar, sont particulièrement renommées pour la beauté, la limpidité et le volume des cristaux quartzaux que l'on en retire.

Plusieurs parties de la chaîne des Alpes fournissent la variété appelée quartz enfumé, et les montagnes de Murcie, en Espagne, sont riches en quartz violet, dit améthyste.

Dans certains lieux, des filons quartzaux de plusieurs mètres de puissance, mis à découvert et devenus saillans par la dégradation des roches dans lesquelles ils étoient comme encaissés, ont pu faire naître l'opinion qu'il existoit des montagnes uniquement composées de quartz.

Sol secondaire. On trouve sans fréquemment du quartz informe, en veines et en filons, ainsi que des cristaux limpides et réguliers de la même substance, dans les couches de pierres argillo-ferrogineuses et argilo-calcaires faibles des montagnes secondaires. Plusieurs carrières d'ardoises, beaucoup de grèses argilo-calcaires, en particulier celles de Meilant, près de Grenoble; les collines d'argile adouées aux Apennins, et celles de la Sicile, certaines masses gypseuses, les ca-

vités des couches de marne et de craie qui forment les collines situées le long de la Seine, servent également d'habitation à des cristaux quartzes, les uns prismés, les autres simplement dodécédres, groupés ou solitaires.

Sol de transport. Les couches de quartz arrondé sont très-communes dans les terrains de cet ordre. Il couvrent, en Afrique, des plaines immenses, et s'y amoncellent en collines qui changent continuellement de place, par l'action des vents. Les eaux qui descendent des montagnes primitives, charrient dans les vallées une grande quantité de ce quartz, provenant de la destruction des roches.

Sol volcanique. L'infiltration dépose continuellement, dans les cavités des laves, et dans les amas de divers produits volcaniques, des moléculas quartzeuses, qui se réunissent ensuite conformément aux lois de l'affinité (1).

Ainsi, la cristallisation du quartz-hyalin agit de toutes parts avec une énergie toujours nouvelle. Elle remplit, pour ainsi dire, toute la nature de ses produits, comme elle correspond à toutes les parties de la durée.

(1) Tout ce qui précède, sur les gisemens du quartz, a été rédigé d'après des notes fournies par le Cit. Dolomieu.

3. Le Quartz-agathe ne se rencontre point en général dans les terrains de première formation. Celui dont la pâte est plus fine, et que l'on nomme plus particulièrement *agate*, est connu dans le duché des Deux-Ponts, et à Oberstein dans le Palatinat. La pierre dont il occupe les cavités a été regardée comme une lave par différents naturalistes. Mais, suivant le Cit. Farjas-Saint-Fonds, qui a examiné les lieux avec beaucoup d'attention, cette matière enveloppante est une roche à base de trapp.

Les masses sphéroïdales de ce même quartz-agathe, à pâte fine, ont le plus souvent une enveloppe brune, rougeâtre ou jaunâtre, dont la couleur est due au fer. Quelques-unes sont recouvertes de pyramides de quartz, dont les pointes sont tronquées en dehors. Souvent leur milieu est occupé par une portion de matière quartzenne, plus raffinée et plus transparente que le reste, ou même par une substance vraiment cristalline, disposée comme en rayons qui convergent vers un même centre. L'intérieur de celles qui forment de vrais globes est tantôt marbré et tantôt tapissé de quartz blanc ou violet.

À l'égard des globes anhydres, leur demi-transparence permet d'apercevoir, à travers leur coque, le liquide aqueux qu'elles contiennent. Mais elles

sont sujettes à laisser échapper cette eau par des fissures imperceptibles qui en favorisent l'évaporation. Elles abondent sur une colline volcanique, près de Vicence, dans l'État de Venise.

Les quartz-agathes pyromaque et grossier sont enchevêtrés dans des carrières de marne blanche, où ils forment des espèces de bancs situés les uns au-dessus des autres, à des intervalles à peu près égaux (1). Ils sont recouverts d'une croûte de cette même marne, et souvent ils en renferment des portions empîcées dans leur substance. La résonance que quelques-uns font entendre lorsqu'on les agit, provient de la poussière marneuse ou du noyau dur de la même substance qui joue dans leur intérieur. Quelquefois ce noyau est adhérent. De plus, il n'est pas rare, en brisant ces allex, d'y apercevoir une ou plusieurs cavités garnies de petites pointes de quartz cristallin.

Q U A R T Z - É L É S I N I T E.

4. Le quartz-élésite se trouve en filons, et quelquefois en masses sphéroïdales ou tuberculeuses, dans une terre argileuse, dont la cou-

(1) Voyez un minéral indiquant du Ch. Lefebvre, intitulé : *Observations sur une variété des rochers primitifs en granite, la à la société d'histoire naturelle, le 29 avril 1791, où l'on trouve plusieurs détails sur la carrière et sur le gisement du quartz pyromaque.*

leur venir suivant les localités. Les opales et les hydrophanes sont déposés par veines ou en grains dans des roches primitives altérées, en sorte que les fentes et autres cavités provenues de cette altération, ont été dans la suite occupées par un liquide qui y a déposé une matière siliceuse. Il y a, dans la haute Hongrie, des opales très-estimées par la richesse de leurs couleurs; et il seroit difficile de voir des hydrophanes d'un plus bel effet, que ceux qui se trouvent à Habertshourg en Saxe. On en a découvert à Châtellaudren, en France, qui ne le cèdent pas de beaucoup aux précédens. Mais on donne souvent pour hydrophanes des fragmens de calcédoine, qui approchant de la nature du onycholite, et dont l'effet est lent et à peine sensible.

QUARTZ-FAÏTE

5. Lorsque l'on regardoit la pâte de certains porphyres comme un jade, on ne pouvoit se dispenser d'attribuer aux terrains primitifs une partie des corps originaux de cette dernière substance. Mais les naturalistes ayant reconnu, depuis, que cette pâte étoit composée des ingrédients du granite, le jade n'est plus qu'un quartz-agathe rempli d'argile ferrugineuse, et paroît appartenir exclusivement au sol secondaire. On observe même une succession de masses non interrompues, à l'aide desquelles la matière siliceuse passe du

quartz-agate à pâte fine au quartz-agate grossier, et de celui-ci au quartz-jaspe. Il existe une gradation sensible entre le quartz-agate et le quartz-résinite. Ici, comme dans beaucoup d'autres cas, la méthode ne consistait que les échantillons placés à une certaine distance entre les points de contact, par lesquels les directions voisines se fixaient et semblaient se confondre.

QUARTZ-PSEUDOMORPHIQUE.

6. Les pseudomorphes de quartz-agate, mentionnés en cristaux semblables à ceux de la chaux carbonatée, se trouvent particulièrement à Schœnberg en Saxe. Les cristaux stériles sont assez fréquents dans les mêmes carrières de marbre, où se rencontrent les alex. ordinaires. Il y a près de Salsbourg, en France, des turbinites quartziques turbidolites et à pâte fine, qui ont parfaitement conservé l'empreinte de leur moule.

Partie rhétorique.

FORMES CRISTALLINES DU QUARTZ.

7. Le quartz transparent, sous forme régulière, portoit, chez les anciens, le nom de cristal, dérivé d'un mot grec qui signifie glace ou eau congelée. Ils s'imaginoient que le quartz provenoit d'une eau qui avoit subi une forte congélation ;
et

et Plin., qui n'est quelquefois que bel esprit lorsqu'il croit être physicien, remarque que c'est par une suite de cette origine, que le cristal ne peut soutenir l'action de la chaleur, et ne sympathise qu'avec les liqueurs froids (1). Or, comme on avoit été frappé d'abord de cette forme géométrique qu'affectoit la substance que l'on appeloit cristal, on a transporté ensuite, par extension, la même dénomination à tous les corps naturels pierreux, solides ou métalliques, dont la figure avoit aussi un caractère marqué de symétrie et de régularité.

3. La cristallisation du quartz est une des moins variées qu'il y ait, si l'on ne considère que le nombre de formes réellement distinctes qu'elle produit. La plupart des cristaux présentent celle du prisme terminé par deux pyramides. Rarement observe-t-on le dodécèdre simple, sans aucun indice de prisme. Les facettes qui modifient quelquefois la première de ces formes sont, pour l'ordinaire, en nombre incomplet, et c'est probablement ce qui les aura fait négliger jusqu'à présent par la plupart des cristallographes. Il semble que la nature ne dispense ici qu'avec réserve ces accessoires, dont elle est si prodigue dans d'autres substances, et en particulier dans la chaux carbonatée.

(1) Hist. nat., L. XXXVII, c. 2.

Mais ces mêmes formes, si distinctes dans leurs diversités essentielles, se multiplient, pour ainsi dire, à l'infini, par des anomalies purement accidentelles, qui proviennent de ce que les faces, en conservant toujours leurs incidences mutuelles, varient dans leurs distances relativement au centre. Tantôt une face de la pyramide prenant un accroissement démesuré, semble servir de base à un prisme oblique. Tantôt les différentes faces de la pyramide se perdent dans les pans du prisme, en sorte qu'il n'est pas facile de démêler ce qui appartient à l'un ou à l'autre, et de placer le polyèdre dans sa véritable attitude. Les cristaux les plus limpides, et dont la surface jette le plus vif éclat, sont ceux qui demandent le plus d'exercice aux observateurs, par cet aspect équivoque. La symétrie et la régularité sont plus spécialement le partage de certains cristaux opaques et mélangés, tels que ceux d'une couleur rose, et les rouges qu'on a nommés *hyacinthes de Campanelle*. Ici, comme dans beaucoup d'autres espèces, la présence d'une substance hétérogène semble déterminer une aggrégation de molécules plus conforme aux lois d'une cristallisation parfaite; ce que l'artiste rejetteroit, pour le telle, est ce que la nature affecte d'élaborer d'une manière plus fine.

Indépendamment de ces accidens, qui n'altèrent point la mesure des angles, mais seulement les figures des faces, les cristaux de quartz sont susceptibles

d'une multitude d'irrégularités, qui influent sur le type même de la forme, et qui sont dues soit à l'amaïssement du prisme en forme d'obélisque, soit à des articulations produites comme par plusieurs prismes accolés les uns dans les autres, soit à des excavations ou à des renflements qui affectent certaines parties, etc. Nous nous bornons à indiquer, en général, toutes ces altérations d'une forme unique, que quelques auteurs ont classées, décrites et figurées avec le même soin que si elles constituaient autant d'espèces distinctes (1).

3. Le noyau du quartz est, en général, difficile à obtenir. J'ai reçu du Citoyen Fraussinet, des cristaux de quartz noir, que ce naturaliste a recueillis dans les montagnes de Toscane, qui se défilent assez bien, suivant les directions de leurs joints naturels. et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que dans ceux qui ont été divisés parallèlement à l'axe, on voit, vers le centre, un quadrilatère d'une couleur griseâtre, peu différent d'un carré, et qui présente la coupe du noyau. Quant aux cristaux ordinaires, on peut, après les avoir fait chauffer fortement, les jeter aussitôt dans l'eau froide. Les fissures qui s'y forment permettent d'en détacher des fragmens, dont les

(1) Voyez, entre autres, le *crystallographia haupttheil* de Dequell, p. 202 et suiv. où ce serait difficile à décrire les variétés de quartz, tant cristallins qu'amorphes.

faces lisses se réunissent de manière à offrir un ou plusieurs angles solides du rhomboïde presque cubique, et quelquefois le rhomboïde entier. Les lapidaires emploient un procédé analogue dans une autre vue : après avoir fait chauffer un morceau de quartz-impide, ils le plongent dans une liqueur colorée, ordinairement en rouge, qui s'introduit, sous la forme de vases, dans les fissures occasionnées par la rapidité du refroidissement. Le quartz, dans cet état, porte le nom de *rubané*.

Double réfraction.

10. Pour observer la double réfraction du quartz, au moyen d'un cristal dichroïse de cette substance, il faut regarder une épingle que l'on tient horizontalement, à travers une des faces de la pyramide et le pan opposé à celui qui est contigu à cette même face, par exemple, à travers la face P, (Fig. 5), et le pan opposé à R. L'effet de la réfraction sera de rejeter, de bas en haut, les deux images qui seront irisées. Si l'on fait ensuite tourner l'épingle jusqu'à ce qu'elle prenne la position verticale, les deux images se rapprocheront peu à peu, et finiront par se confondre, excepté que l'une dépassera l'autre vers la tête de l'épingle. Pour faire cette observation, il faut avoir un prisme dont les pans soient naturellement lisses, ou du moins peu chargés de stries. On réussira encore à apercevoir la double image, quelques années

facilement, en regardant à travers deux pans du prisme qui forment entre eux un angle de 60° , et en tenant l'épingle dans une direction parallèle à l'axe.

Pour faire en sorte que les deux réfractations se réduisent à une seule, il faut tailler un cristal prismé de quartz, par un plan perpendiculaire à l'axe, ou, ce qui revient au même, parallèle aux bases des pyramides; alors, en regardant les objets à travers l'un des faces terminales et la face produite artificiellement, on verra les images simples, quelque densité que soit l'angle réfringent soit de $51^{\circ} 40'$, ou bien que dans le cas indiqué plus haut, où les images paraissent doubles, l'angle réfringent n'est que de $58^{\circ} 20'$.

Prétendue conductibilité de quartz.

11. LAMARCA avait annoncé (1) que le quartz étoit, ainsi que le diamant, une substance conductible. Il se fondeoit sur ce que, pendant la collision mutuelle de deux morceaux de cristal de roche, les parcelles que l'on recevoit sur un papier blanc, étoient enlées d'une manière fulgurante; en sorte qu'étant frottées contre le papier, elles y laissent une trace semblable à celle que produit le charbon. Mais d'après les observations

(1) Journ. de phys., 1785, juillet, p. 66.

du Cit. Monge, la matière fuligineuse provient de ce que les fragmens détachés du quartz se trouvent élevés à une très-haute température par la violence du choc imprimé à leurs petites masses, entraînant quelques-uns de ces corpuscules qui flottent dans l'air, et que l'on aperçoit dans un appartement obscur où l'on introduit un rayon solaire : ces corpuscules, en s'attachant au quartz, le couvrent de leur chignon.

Explication du phénomène de l'hydrophane.

12. Le quartz-agathe hydrophane, plongé dans l'eau, pendant quelques instans, s'imbibe de ce liquide, et en même temps acquiert de la transparence. Pendant l'imbibition, on voit s'élever de la pierre des files de bulles d'air, qui en avertent pour faire place à l'eau. Un hydrophane du poids de 178 centigrammes, après avoir séjourné dans l'eau pendant environ 4 minutes, pèse 212 centigrammes, ce qui faisoit une augmentation de poids de 34 centigrammes. L'eau dont l'hydrophane s'est imbibé, s'échappe par le dessèchement, et la pierre retrouve à son premier état. La cause physique de cet effet est facile à concevoir.

Lorsque la lumière, après avoir traversé un milieu quelconque, en rencontre un autre d'une densité différente, elle ne passe pas toute entière dans celui-ci; mais une partie des rayons est réfléchi au contact des deux milieux. C'est en con-

abaissement de ces derniers rayons que la surface d'une eau tranquille fait l'office de miroir. Or, cette portion de rayons qui se réfléchissent au lieu de se réfracter, est plus grande, sous une incidence donnée, lorsque les densités des deux milieux diffèrent davantage entre elles, et plus petite, lorsqu'elles diffèrent moins; en sorte que si elles étoient égales, tous les rayons passeroient du premier milieu dans le second.

Maintenant l'hydropneus, dans son état naturel, est un corps spongieux, parsemé de vacuoles qui sont occupés par des molécules d'air en contact avec les molécules propres de la pierre. Les rayons qui entrent dans celle-ci, rencontrant successivement deux milieux de densités très-inégaux, savoir, l'air et la matière de l'hydropneus, subissent aux points de contact des réflexions qui en détournent une grande partie; et ceux qui ont passé outre, éprouvant, à leur tour, de nouvelles réflexions, il n'y en a que très-peu qui arrivent à la surface opposée. Substituez l'eau à l'air, c'est-à-dire, un liquide dont la densité approche incomparablement davantage d'être égale à celle de la pierre; le nombre des réflexions diminuera d'autant, et il y aura beaucoup plus de rayons qui pénétreront l'hydropneus de part en part; en sorte que la transparence qui dépend de ces rayons traversés d'une surface à l'autre, sera considérablement augmentée.

Explication des couleurs de l'opale.

13. La quarta-agathe opale doit sa beauté à ses imperfections. Les reflets si agréablement colorés qu'il lance dans son intérieur, proviennent d'une multitude de lentes et de gazettes qui interrompent la continuité de sa surface propre, et laissent entre ses lames des intervalles qui réfléchissent diversement les rayons de la lumière. Toute cette variété de couleurs disparaît dès qu'on brise l'opale (1). La cause physique dont elle dépend est la même que celle du phénomène des anneaux colorés, observé par Newton avec une sagacité digne de son génie (2). Nous nous bornerons à l'exposition de ce qui est essentiel pour notre objet.

Si l'on applique un verre de télescope légèrement convexe sur un verre plan, en les pressant l'un contre l'autre, la lumière réfléchie par la lame d'air dont l'épaisseur s'accroît graduellement dans l'espace intermédiaire, offre plusieurs séries de couleurs disposées par bandes annulaires autour d'une tache noire qui répond au point de contact. Les couleurs des différentes séries, prises en partant de ce même point, sont, pour la première,

(1) *Bureau de Bont, gemmes et l'artif. des, lib. II, cap. 46, p. 190.*

(2) *Optics desir, lib. II, pars I^{re}.*

bleu, *bleu*, *jaune et rouge*; pour la seconde, *violet*, *bleu*, *vert*, *jaune et rouge*; pour la troisième, *pourpre*, *bleu*, *vert*, *jaune et rouge*; pour la quatrième, *vert et rouge*. Il y a encore d'autres séries au-delà des précédentes, mais dont les couleurs sont plus pâles, et finissent par s'effacer entièrement.

Newton fit une seconde expérience, qui offre comme l'analyse du phénomène. Elle consistait à ne laisser réfléchir à la lame d'air qu'une seule couleur homogène à la fois, savoir, le *violet* en premier lieu, puis successivement le *bleu*, le *vert*, le *jaune* et le *rouge* (1). Chaque couleur produisoit alors uniquement des cercles de son espèce, tellement espacés, que les degrés d'épaisseur de la lame d'air, aux endroits correspondans, subissoient une certaine loi (2). A mesure qu'une nouvelle couleur parvenoit à son tour, chacun des cercles concentriques qu'elle formoit, étoit un peu plus loin

(1) Les couleurs sont ici rapportées à leurs termes les plus généraux.

(2) Cette loi est telle, que les différens degrés d'épaisseur qui donnent les anneaux successifs d'une même couleur, sont entre eux comme les nombres impairs 1, 3, 5, 7, 9, etc. Newton a reconnu aussi que chaque couleur étoit transmise à travers la lame d'air, par les degrés d'épaisseur intermédiaires, avec le ceux qui subissoient le rapport des nombres pairs 2, 4, 6, 8, etc.

du contact des deux verres, que le cercle du même ray, donné par la couleur précédente.

De là il suitroit que chacune des séries que présentait le phénomène, quand la lame d'air recevoit l'ensemble de tous les rayons de la lumière, étoit une espèce de combinaison des diverses couleurs dont nous venons de parler, et que si elle n'en offroit pas la succession distincte, c'est parce que les cercles produits par chaque couleur particulière ayant une certaine largeur, et anticipant plus ou moins sur ceux d'une autre couleur à certains endroits, y formaient des couleurs mixtes, comme le pourpre, qui commençoit la troisième série, ou même reproduisoient la lumière blanche, en se confondant tous ensemble, comme cela avoit lieu sur un petit espace de la première série.

Les bulles de savon que soufflent les enfans, présentent des effets analogues; et, en général, l'expérience prouve que toute matière fluide ou solide, ayant un certain degré de ténuité, et renfermée entre deux milieux d'une densité différente de la sienne, réfléchira, si son épaisseur varie, une suite de couleurs diversifiées, et si elle est constante, une couleur uniforme assortie au pouvoir réfléchissant qui résulte de cette épaisseur. Newton étend ensuite cette explication à la coloration de tous les corps naturels, dont chacun fut, pour ainsi dire, le triage des rayons que ses lames composantes ont la faculté de réfléchir par une

suite de leur degré de ténuité. C'est principalement de la finesse de la toile que dépend ici le coloris du tableau.

L'épale étant remplie de fissures occupées par quelque matière subtile, telle que l'air, chaque lamelle de cette matière peut être assimilée à la lame d'air comprise entre les deux verres, dans l'expérience de Newton; et parce que les fissures sont nombreuses et situées en différents sens, les reflets ont des positions mobiles, et paraissent se jouer dans l'épale, à mesure que l'on fait tourner celle-ci à la lumière.

Il y a des hydrophanes qui deviennent opales en acquérant de la transparence, ce qui provient aussi de certaines fissures, dans lesquelles il s'introduit des lamelles d'air qui font l'office de la lame d'air dont nous avons parlé. Tel est, entre autres, un hydrophane d'Huberstsburg, dont je suis redevable au Cit. Dupuget, et qui est un des plus parfaits que j'aie vus.

U S A G E S.

14. On emploie le quartz limpide pour la garniture des lustres. On en fait des vases de différentes formes. On le taille à facettes pour en orner les ouvrages communs de joaillerie. On estime beaucoup plus le quartz violet, dit *améthyste*, surtout lorsque le pourpre domine dans sa cou-

leur; et les morceaux taillés de cette substance, qui ont en même temps d'un certain volume, tiennent leur rang parmi les gemmes. Le quartz bleu, dit *saphir d'eau*, n'a pas, à beaucoup près, la même valeur.

15. On voit à l'intérieur de certains morceaux de quartz limpide, des glaces ou des nuages qui s'étendent comme une espèce de voile, ce qui peut empêcher de confondre le quartz travaillé avec le verre, dans lequel on n'aperçoit que des bulles isolées. Cette observation est due au Cit. Gilles-Loumont.

16. Le mélange du quartz ardoisé avec la chaux, est la matière du mortier qui lie les pierres de nos bâtimens. La chaux étant soluble dans l'eau, devient par là susceptible de s'unir intimement aux grains quartzeux qu'elle emplit, et avec lesquels elle forme une espèce de glaise capable de faire corps après le dessèchement.

17. Un autre usage très-intéressant du quartz, est celui qu'on en fait dans la vitrification. Ce minéral étant infusible par lui-même, on est obligé d'y mêler des fondans, c'est-à-dire, des substances dont les molécules, en attirant à elles, par leur affinité, les molécules quartzeuses déjà dispersées à se séparer par la force élastique du calorique, conspirant avec cette force, pour produire leur réparation totale, dans laquelle consiste la fusion. A l'aide de ces fondans, nous formons un verre

qui le cède sensiblement en dureté au quartz diaphane, mais qui, dans son état de perfection, jouit d'une égale transparence, reçoit, comme lui, un très-beau poli, et auquel nous sommes redevables de tant de vases d'une utilité aussi générale que variée, des vitres qui descendent avec à la lumière dans nos appartemens, des glaces qui multiplient tout ce qui se présente devant elles, et des instrumens d'optique, qui ont dévoilé un nouveau ciel à l'astronomie, et ouvert un nouveau champ à l'histoire naturelle.

18. Les variétés du quartz-agathe s'emploient à différens usages, dont les uns sont pour le besoin, et les autres pour l'agrément. Le Cit. Delaunay a décrit, dans un mémoire lu à la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut national, l'art très-simple, mais peu connu, de tailler les pierres à feu. Tout le monde sait que lorsqu'on emploie un fragment de ce quartz, pour allumer du feu, suivant le langage ordinaire, les bords vifs et acérés de ce fragment détachent de l'acier des particules métalliques, qui, éprouvant un choc violent, à raison de leur extrême petitesse, sont par là même disposés à entrer en combustion, par leur union avec l'oxygène de l'atmosphère. Et ainsi cette expression vulgaire, *battre le fer*, est très-juste, quoiqu'un peu doute elle n'ait pas été réunie.

19. On se sert avantageusement du quartz mo-

laire pour la maçonnerie ou moellons. La solidité des murs, dont il fournit les matériaux, dépend de sa dureté, et de ce que le ciment, en se logant dans les interstices de son tissu caverneux, le sertent les pierres entre elles.

Mais l'usage le plus intéressant de ce quartz, est celui d'où il a emprunté le nom de *pierré soculaire*, qu'on lui donne communément. On pique les endroits pleins, et l'on remplit, en partie, les cavités trop profondes avec une espèce de plâtre qui, par le dessèchement, prend une forte consistance. La surface de la maçonnerie se trouve ainsi criblée d'une multitude de petits trous, dans lesquels le grès s'accroche, de manière à être plus exactement lié par la force du frottement.

13. On taille les morceaux de quartz-agate à pâte fine, et dont les couleurs sont vives et agréables, pour en faire des boîtes, des vases, ou des plaques d'ornement. Le quartz-agate voya est surtout recherché pour cette destination. Le nom d'*oyya*, qui signifie agate, avoit été donné originellement à une pierre, dont la couleur blanchâtre étoit sur celle de l'ongle séparé de la chair. D'une autre part, on appeloit *sarde* une variété de la même pierre, qui étoit d'une couleur de chair. Dans la suite, on appela *sardonyx* un composé de l'une et de l'autre, dans lequel une couche blanchâtre recouroit une autre couche d'un rouge incarnat, dont la couleur perçoit à travers la pre-

mière, comme celle de la chair à travers l'ongle (1). On a fini par appliquer le nom d'oeux à toutes les pierres formées de couches différemment colorées.

On appelle *œil œillé*, ou *agathe œillée*, les morceaux dont la coupe présente des bandes circulaires étroites, rapprochées autour d'une tache rouge. L'artiste donne à ces morceaux, en les arrondissant, une forme qui favorise leur ressemblance avec un œil.

L'*agathe orientale* du commerce est un œil fort souvent translucide, dont l'intérieur paroit comme bouillonné ou pommelé, par l'effet des ondulations que forment les couches comprises dans son épaisseur.

On taille le quartz gris-bleu et le quartz opalin en cabochon, pour favoriser le développement des veilles. L'auteur de l'article diamantaire de l'Encyclopédie méthodique (2), dit qu'une belle opale orientale est ornée de le double d'un saphir oriental de la même grosseur.

20. Les anciens qui avoient cultivé, avec beaucoup de succès, l'art de travailler les pierres, y employoient souvent le quartz-agathe à pâte fine, et le quartz jaspé. Ils s'étoient attachés surtout à la gravure, tant en creux qu'en relief, sur une

(1) Plin., *hist. nat.*, l. XXXVII, c. 6. Boissac de Boët, cap. 84. 2.

(2) Art et Métier, t. II, 1^{re} partie, p. 154.

substances; et l'on voit encore, dans différentes collections, une foule de productions de leur industrie en ce genre, qui présentent des sujets relatifs à la mythologie ou à l'histoire, les copies en raccourci des chefs d'œuvres de peinture et de sculpture, les caractères des écritures les plus anciennes, etc. Ces petits monuments deviennent ainsi doublement intéressans sous le rapport de l'art et sous celui de l'érudition (1).

21. Tous ces différens usages que l'on fait du quartz-agathe, ont donné lieu de distinguer plusieurs variétés de cette substance, qui dépendent, en grande partie, de l'aspect que présentent les morceaux travaillés par la main de l'artiste. Ainsi, ce qu'on appelle *alex ovys* ou *œillé*, n'est autre chose qu'une portion de *alex stilaçité*, dont les couches concentriques ont été mises à découvert par la taille. Mais les naturalistes ayant admis, dans leurs collections, ces *alex* travaillés, qui en font un des principaux ornemens, les méthodes se sont prêtées à cette espèce d'adoption, en fournissant des dénominations assorties au point de vue sous lequel l'art nous offre ici les productions de la nature.

(1) Voyez l'introduction à l'étude des pierres gemmes, par Mills.

1^{re} ESPÈCE.

ZIRCON,

Dérivé du mot zircos, qui désigne la terre particulière renfermée dans cette substance.

Topasius flavo rubens; hyacinthus, *Waller*, *t. I*, p. 280, & Topasius clarus, hyalinus; jargon, *ibid.*, *f.* Hyacinthe, de *Lisch*, *t. II*, p. 281. Diamant brut ou jargon de Ceylan, *ibid.*, p. 283, note 100, et p. 282. Hyacinthus, de *Born*, *t. I*, p. 77. Jargon de diamant; jargon de Ceylan, *ibid.*, p. 88. Hyacinthe, *Sciogr.*, *t. I*, p. 282. Jargon de Ceylan, *ibid.*, p. 270. Hyacinth, *Königsberg*, *t. I*, p. 22. Zircon, *ibid.*, p. 3. Hyacinth, *Kriewar*, *t. I*, p. 257. Jargon, *ibid.*, p. 353. Hyacinthe et jargon, *Dandlartou*, *tabl.*, p. 6 et 206. Le zircon, *Brochant*, *t. I*, p. 153. L'hyacinthe, *ibid.*, p. 163.

Caract. essentiel. Pesant. spécifique, d'environ 4,4; joints naturels, les uns parallèles, les autres obliques à l'axe des cristall.

Caract. phys. Pesant. spécif., 4,3858... 4,4161 (1).

(1) Le *Cat. Belcon* indique 3,6874 pour la pesanteur spécifique de l'hyacinthe. Mais la pierre que ce auteur décrit a soumise à l'expérience lui avoit été fournie par un joaillier, qui, sans doute, la nommoit hyacinthe, à raison de sa seule couleur.

Dureté. Rayant difficilement le quartz.

Réfraction, double à un très-haut degré.

Eclat de la surface extérieure, ordinairement un peu gras.

Caract. géométr. Forme primitive. Octaèdre à triangles isocèles (fig. 9 et 11), *pt. Xld*, qui se subdivise parallèlement à des plans qui passeroient par les sommets *Aa* (fig. 11), et par les apothèmes *Ae*, *aa*, etc., des faces. Ces dernières coupes sont les plus nettes (1).

Molécule intégrante. Tétrahédre irrégulier.

Couleur, transverse, ondulée, éclatante.

Caract. chim. Infusible au chalumeau; il y perd seulement sa couleur, ce qui a souvent lieu, même lorsqu'on se borne à en exposer un fragment à la flamme d'une bougie.

Analyses par Klaproth, de la variété dite *jargon de Ceylan*.

Zircon.....	70.
Silice.....	26.
Fer.....	1.
Perte.....	3.
	<hr/>
	100 (2).

(1) Soit *ra* (fig. 11) une des faces de l'octaèdre. Si l'on mène l'apothème *ry*, les lignes *ra*, *ry*, *ry* auront ensemblement entre elles dans le rapport des nombres 5, 4, 3.

(2) *Conclusions chimiques des minéraux*, t. I, p. 215.

Analysé par Vauquelin, de la variété dite *Apyclaire de France*.

Zircon.....	64,5.
Silice.....	32,0.
Fer.....	2,0.
Perte.....	1,5.
	<hr/>
	100,0 (1).

Caractères distinctifs. 1°. Entre le zircon dodécédre et le grenat péristyle. Dans celui-ci, toutes les incidences des faces adjacentes sont de 120° ; dans le zircon, les axes sont de $124^{\circ} 12'$, et les autres de $117^{\circ} 54'$. 2°. Entre le zircon et l'idocrase. La pesanteur spécifique de celle-ci est moindre, dans le rapport de 7 à 9 ; ses fragmens ne perdent pas leur couleur à la flamme d'une bougie, comme ceux du zircon. Sa division mécanique ne donne point de coupes obliques à l'axe. L'incidence des faces de ses sommets sur les pans adjacents, est de 127° au lieu de 131 . Sa double réfraction est beaucoup moins forte. 3°. Entre le zircon et la topaze. La pesanteur spécifique du premier est plus grande dans le rapport, d'environ 9 à 7 ; il ne se divise point, comme la topaze, dans un sens perpendiculaire à l'axe des cristaux. 4°. Entre le zircon et l'harmotome. Les cristaux dodécédres de zircon

(1) Journ. des min., N°. 25, p. 104.

(*Fig. 2*) se divise parallèlement à leurs arêtes verticales, et ceux d'hermoteone parallèlement à leurs pans. Les incidences respectives des faces du sommet sont de $124^{\circ} 12'$ dans le circon, et de $121^{\circ} 57'$ dans l'hermoteone; le circon est infusible, et l'hermoteone facile à fondre. *V.* Entre le circon taillé et les autres pierres appelées gemmes. Il en diffère sensiblement par la force de sa double réfraction.

V A R I É T É S.

F O R M E S.

Déterminations.

1. *Circon primitif*. P (*Fig. 3*) Incidence des faces d'une même pyramide qui se réunissent sur chaque arête oblique B, $124^{\circ} 12'$; des faces de chaque pyramide sur celles qui leur sont adjacentes dans l'autre pyramide, $82^{\circ} 20'$. Valeur de l'angle plan A, $55^{\circ} 45'$. Se trouve en France, près la ville du Fay.

Si l'on suppose que l'octaèdre soit divisé d'abord parallèlement à ses huit faces, et que l'on fasse passer les coupes, pour plus grande simplicité, par les lignes *ca*, *ca*, etc. (*Fig. 11*), qui partagent en deux moitiés les bords de l'octaèdre, la division donnera six octaèdres partiels, dont les sommets se confondront avec ceux du solide pri-

mitif, et huit tétraèdres interposés entre les octaèdres (1).

Conservons maintenant d'autres coupes dirigées suivant les apothèmes Ac , az de l'octaèdre total, et qui passent par le centre. Ces coupes diviseront chaque octaèdre partiel en deux solides hexaèdres tri-irréguliers, et chaque tétraèdre en deux nouveaux tétraèdres. C'est ce que l'on comprendra, en considérant, par exemple, l'effet de la coupe qui passe par ac , à l'égard du tétraèdre dont elle soustrait la face extérieure en deux moitiés : car ce tétraèdre pouvant être regardé comme une pyramide triangulaire qui a pour base le triangle rac , et dont le sommet se confond avec le centre de l'octaèdre total, la coupe qui passe par ce sommet et en même temps par le milieu de la base, doit diviser la pyramide elle-même en deux parties égales, dont chacune sera aussi un tétraèdre.

Or, si l'octaèdre total n'étoit divisible que parallèlement à ses faces, comme celui de la chaux fluorée, on auroit déjà un motif de vraisemblance pour exclure les octaèdres partiels, et préférer les tétraèdres, comme représentant les molécules intégrantes ; mais dans le cas présent, où la stru-

(1) On peut appliquer ici ce que nous avons dit au sujet de la division mécanique de l'actinolite régulière, à l'article de la chaux fluatée, p. 262.

division de l'octaèdre donne des solides dont la figure s'écarte encore plus de la simplicité que celle de l'octaèdre lui-même, tandis que les coupes faites dans le tétraèdre le partagent en deux solides de la même espèce, on a une nouvelle raison de préférence en faveur du tétraèdre.

Dans cette hypothèse, les cristaux de zircons sont composés primitivement de petits tétraèdres appliqués deux à deux par une de leurs faces, et secondairement de tétraèdres réunis par leurs bords, comme ceux dont la chaux fluatée est l'assemblage.

Ici revient l'observation que nous avons déjà faite ailleurs (t. I, p. 93); savoir, que les octaèdres et les tétraèdres sont tellement assortis entre eux, que leur assemblage compose des parallélépipèdes, et que les décroissemens ont toujours lieu par des rangées de ces mêmes parallélépipèdes.

8. *Zircon dodécédre.* $\frac{E-P}{s-P}$ (fig. 12). De Lisle,

t. II, p. 284. *Ibid.*, p. 287; var. 1. Les faces s, s sont communément des hexagones allongés, et quelquefois des rhombes. Inclinaison de P sur P , $124^{\circ} 12'$; de s sur s , 90° . Valeur de l'angle α , $75^{\circ} 44'$, et de l'angle π , $116^{\circ} 6'$. Se trouve à Ceylon et en France.

C'est la forme la plus ordinaire sous laquelle se présentent les cristaux qu'on nomme *hyacinthes*. Lorsque les faces s, s sont des rhombes, ce qui est assez rare, le dodécédre a de la ressemblance avec

celui du grenat primitif. Mais il sera facile à un œil un peu exercé de l'en distinguer; car si on le place de manière que deux de ses angles solides, composés de trois plans, soient sur une même verticale, on s'apercevra qu'il n'est pas, si je puis ainsi parler, dans sa véritable attitude, parce que les plans dont il s'agit ne font pas entre eux les mêmes angles. Pour qu'il soit dans cette attitude, il faut que la verticale passe, au contraire, par deux des angles solides composés de quatre plans, tandis que le dodécaèdre du grenat est susceptible de prendre l'une et l'autre position, de manière à s'offrir toujours sous un aspect symétrique.

3. Zircon *prism.* $\begin{array}{c} \text{D} \cdot \text{P} \\ \text{I} \cdot \text{P} \end{array}$ (Fig. 13). Diamant brut ou jargon de Ceylan, de Lisle, t. II, p. 229. Incidence de P sur I, $131^{\circ} 25'$. Se trouve à Ceylan.

4. Zircon *dodécaèdre.* $\begin{array}{c} \text{D} \cdot \text{E} \cdot \text{P} \\ \text{I} \cdot \text{A} \cdot \text{P} \end{array}$ (Fig. 14). Hyacinthe, de Lisle, t. II, p. 289; var. 2. Incidence de I sur A, 135° .

J'ai dans ma collection des cristaux de cette variété, dont le prisme est très-court, en sorte que l'on pourroit les considérer comme des octaèdres épointés et émargés latéralement. Ces cristaux sont diaphanes, et ont une couleur d'un jaune-vertâtre. Il y a apparence que de Born en a dé-

est un semblable avec le nom de *stérolite* de Ceylan (1).

5. *Zircon acutaire*. $\begin{smallmatrix} \dot{E} & \dot{E} & P \\ x & x & P \end{smallmatrix}$ (fig. 15). La variété dodécaèdre émarginée entre les faces du sommet et les pans. Incidence de x sur P , $152^{\circ} 5'$.

6. *Zircon plagioclre*. $\begin{smallmatrix} \dot{D} & \dot{E} & P \\ l & x & P \end{smallmatrix}$ (fig. 16). La variété présente biséparation aux angles solides latéraux. Incidence de x sur l , $142^{\circ} 55'$. Valeur de l'angle α , $153^{\circ} 56'$. Se trouve à Ceylan.

7. *Zircon équilibré*. $\begin{smallmatrix} \dot{D} & \dot{E} & P \\ l & x & P \end{smallmatrix}$ (fig. 17). La variété 5, émarginée verticalement. Dans certains cristaux, les faces l prennent beaucoup plus d'étendue que les faces x .

8. *Zircon couronné*. $\begin{smallmatrix} \dot{D} & \dot{D} & \dot{E} & P \\ l & n & x & P \end{smallmatrix}$ (fig. 18). Incidence de n sur l , $152^{\circ} 17'$; de n sur P , $152^{\circ} 8'$. Se trouve en Norwège, dans une roche feldspathique.

Indéterminables.

9. *Zircon granifère*.

(1) *Quat.*, t. 1, p. 67

ACCIDENS DE LUMIÈRE.

Couleurs.

1. Zircon orangé-brunâtre. Hyacinthe orientale, *Coppélier, prod. crist., p. 29.*
2. Zircon rougeâtre.
3. Zircon jaunâtre.
4. Zircon verdâtre.
5. Zircon jaune-verdâtre.
6. Zircon blanchâtre. On le nommoit jargon d'hyacinthe lorsqu'il avoit la forme de la variété dodécaèdre.

Transparence.

1. Zircon transparent. Tel est surtout le zircon jaunâtre qui se débite sous le nom de jargon de Ceylan.
2. Zircon translucide.

Substances étrangères d cette espèce, auxquelles on a donné le nom d'hyacinthe.

1. Hyacinthe orientale. La télesse d'une couleur orangée, de *Linde, t. II, p. 282.*
2. Hyacinthe occidentale. La topaze d'un jaune aigre, de *Dufour, des pierres préc., p. 62.* J'ai examiné de ces prétendues hyacinthes, qui étoient électriques par la chaleur, et avoient la double réfraction dans un degré beaucoup plus faible que

le zircon, deux propriétés dont la réunion ne peut convenir qu'à une topase.

3. Hyacinthe miellée. La topase d'un jaune de miel.

4. Hyacinthe la belle. Probablement le grenat d'un rouge saturé d'orangé.

5. Hyacinthe cruciforme. L'harmotome.

6. Hyacinthe brune des volcans. L'idocrase.

7. Hyacinthe blanche de la Somme. La mésonite.

8. Hyacinthe de Compostelle. Le quartz hématite.

9. Hyacinthe de diorite, Saumur, voyagé dans les Alpes, n. 1902; une variété du grenat.

A P P O S T R O P H E.

1. On trouve le zircon, avec des cristaux de spinelle, de tourmaline, de pléonaste, etc., à Ceylan, dans une rivière qui vient des hautes montagnes situées vers le milieu de cette île (1). On le trouve aussi en France, dans un ruisseau nommé Rhupeyronillon (2), près du village d'Espeilli, à un quart de lieue du Puy, dans le ci-devant Velay, où ses cristaux sont disséminés dans un sable volcanique rempli de petits coquilles et de grains de fer, qui contient aussi des trilles bleues. Une

(1) De Laile, t. II, p. 266.

(2) Faujas, recherches sur les volcans éteints du Vivarais, p. 286.

autre localité du zircon, citée par le Cit. Faujas, est le territoire de Vicenza, où ses cristaux accompagnent un sable semblable au précédent (1). M. Henri Urtasa, savant minéralogiste espagnol, a eu la complaisance de me donner de petits cristaux de la même substance qui avoient été recueillis dans le lit des rivières de la province d'Antioquia, au royaume de Santa-Fé de Bogota. On distinguoit parmi eux des fragments noyés, qui paroissent appartenir à des pyroènes, et de très-petits cubes de fer sulfaté. Le sable dans lequel on les trouve, contient aussi des paillettes d'or.

Mais aucun de ces cristaux n'étoient originaires de la localité qui les renfermoit ; ils y avoient été conduits par les eaux, et nous n'avons, jusqu'ici, aucune indication de leur lieu natal, ni des substances qui leur y servent d'enveloppe ou de rapport ; mais nous avons acquis, depuis peu, des connaissances plus précises relativement à d'autres cristaux de la même espèce, qui faisoient partie de l'énorme collection que le Cit. Lacroix a rapportée de son voyage en Suède et en Norwège, et dans laquelle ce naturaliste m'a permis obligamment de choisir ce qui pourroit servir à mes observations. Ces cristaux étoient engagés dans une roche composée de feld-spath roséâtre et d'amphibole, trouvée à Fridschovera en Norwège. On leur avoit

(1) Faujas, *minéralogie des volcans*, p. 222.

donné dans le pays le nom de *récuriènes* (idooruan de notre méthode); mais leur structure et leurs autres caractères me les ont fait reconnaître pour une nouvelle variété de zircon, qui est la soustractive (1). La longueur du plus volumineux, prise entre les sommets des deux pyramides, est de 18 millimètres, et son épaisseur est de 8 millimètres. M. Menihy a depuis apporté ici d'autres cristaux provenant de cette même localité, recueillis aussi dans leur gîte, et j'en ai plusieurs échantillons dont je suis redevable à son amitié.

2. Le zircon a formé, pendant long-temps, deux espèces de pierres, dont l'une se nommoit *hyacinthe* et l'autre *jargon*. On les distinguoit principalement par les formes extérieures des cristaux. Tous ceux qui avoient l'aspect du dodécaèdre (fig. 12), ou pouvoient y être facilement ramenés, passaient pour hyacinthes. La variété primée, représentée (fig. 13), étoit comme le type des cristaux de jargon. D'après cette distinction, la France ne possédait que des hyacinthes; mais on trouvoit à Ceylan l'hyacinthe avec le jargon.

Cependant Bourc de Lisle, dans son ouvrage sur les caractères des minéraux, imprimé en 1784, avoit supprimé le jargon, sur le tableau qui termine cet ouvrage; et à côté du nom de *hyacinthe*,

(1) Bulletin des sciences de la société philomathique, premier, an 8, p. 126.

on voit cette phrase : *souffrassité d'être identique avec le jargon de Geyser*. Il ne dit pas sur quoi il se fondeit pour présumer cette identité ; mais il étoit trop attentif et trop exact pour jeter une conjecture au hasard, et c'est à lui qu'appartient l'initiative d'un rapprochement que l'analyse, entre les mains du célèbre Klaproth, a mis depuis en évidence, d'une manière d'autant plus intéressante, qu'elle a conduit en même temps à la découverte de la nouvelle terre nommée *terre aéronautique* ou *aérodur*.

3. Le nom d'*Hyacinthe* peut avoir son origine à la ressemblance de couleur qu'avoient les pierres, ainsi appelées, avec le fleur qui, au rapport de la fable, provenoit de la métamorphose du jeune Hyacinthe tué par Apollon, et sur laquelle le dieu avoit tracé l'expression de sa plainte (1). L'*hyacinthe* des anciens, colorée d'un violet assez agréable, mais seulement au premier aspect, sembloit bien plus prompte à se flétrir, dit Plin., que la fleur du même nom (2). Les modernes ont appelé *hyacinthes* des pierres d'un rouge-orange, souvent

(1) La plante qui portoit cette fleur, bien différente de notre jacinthe, étoit une espèce de li, qui avoit en racolle marquée entièrement de deux caractères, dans lesquels, l'œil aidé par l'imagination, voyoit le mot AI, qui est le cri de la douleur.

(2) Hist. nat., L. XXXII, chap. 9.

avec une teinte de brun. La couleur étoit ici, comme par rapport aux autres gemmes, une source d'équivoques et de méprises. Mais il est remarquable que cet accident lui-même devenant, pour ceux dont l'attention va au-delà de ce qui frappe les yeux, un moyen prompt et facile de distinguer la véritable hyacinthe, par la volatilité du principe dont il dépend, et que la simple flamme d'une bougie colore en un instant à cette pierre.

A l'égard du nom de jargon, on le donnoit, en général, aux gemmes sans couleur, qui, après la taille, en imposent aux yeux par un faux air de ressemblance avec le diamant, quoiqu'elles lui célassent très-sensiblement en éclat et en dureté. Ce nom seroit-il alluë à l'idée qu'on y attache, lorsqu'on l'emploie pour désigner un langage affecté, qui n'est qu'une imitation vicieuse de la bonne éloquence? Quoi qu'il en soit, le sircos étant la pierre qui, dans certains cas, jouoit le mieux le diamant (1), le nom de jargon lui sera resté, comme nous propre et spécifique. On a pu remarquer que la nomenclature, qui indiquoit les hyacinthes sans couleur sous le nom de jargons d'hyacinthe, avoit prévus, comme par accident, la réunion des deux espèces en une seule.

4 La double réfraction du sircos est telle, que,

(1) *Inter adamantes communiores solus*; Waller, t. I, p. 252.

dans tous les cas où elle peut être observée, son intensité seule peut servir de caractère distinctif à cette substance. J'ai soumis à l'observation des cristaux intacts et des morceaux taillés. L'un de ceux-ci étoit en forme de prisme, ayant son angle réfringent de 22° . Les deux images d'une épingle, vues à travers ce prisme, à la distance de 5 décimètres, étoient écartées l'une de l'autre d'environ 14 millimètres.

3. La pierre que les lapidaires nomment communément *jargon de Ceylan*, est un véritable zircon, d'un jaune-pâle, qui prend un assez beau poli. C'est cette même pierre que l'on fait quelquefois passer pour un diamant d'une qualité inférieure. Son éclat a effectivement quelque rapport avec celui du diamant; mais ses reflets sont incomparablement moins vifs; ainsi est-elle peu estimée. À l'égard des zircons dont la couleur est l'orangé-brunâtre, et que l'on appelle *hyacinthes*, il y en a qui ne prennent qu'imparfaitement le poli, surtout parmi ceux que l'on trouve en France. J'ai cependant vu de ces zircons qui, après avoir été taillés, avoient un éclat assez vif; je les reconnoissois surtout à l'intensité de leur double réfraction. Mais il m'a paru que les gemmes qui se vendoient sous le nom d'*hyacinthes*, appartenoient le plus souvent à des espèces différentes de celles-ci, et étoient des grenats ou des topases.

III. ESPÈCE.

T É L É S I E, c'est-à-dire, corps parfait.

Rubina vivida rubro colore; rubina orientalis, Waller, t. I, p. 247, a. Topazius flavus, topazius orientalis, ibid., p. 251, a. Gemma pellucidissima, duritie totius, colore caeruleo, in igne fugax, saphirus, ibid., p. 248. Rubis d'Orient, de Lisle, t. II, p. 212. Saphir, Esmarling, t. I, p. 67. Saphir, Schagr., t. I, p. 213. Pierre orientale, Daubenton, tabl., p. 7. Oriental rubis; oriental topaz; oriental saphir, Kirwan, t. I, p. 200 et suiv. Le saphir, Brochant, t. I, p. 207.

Caractère essential Pesantiers spécifique, densité 4; joints naturels trois-sensibles perpendiculaires à l'axe des cristaux.

Grav. phys. Pesant. spécif., 3,5911. - 4,0833.

Durété. Rayant toutes les autres substances terrestres.

Réfraction, unique.

Cassure, longitudinale, conchoïde, éclatante.

Car. géom. Forme primitive. Prisme hexaèdre régulier (fig. 19), pl. XLII. Les coupes parallèles aux bases sont seules sensibles. La position des pans n'est que primordiale (1).

(1) Il se pourrait que cette forme primitive que j'ai désignée
Maboule

Malécule isogr. Prisme triangulaire équilatéral (Fig. 20) (1).

Caract. phys. Infusible. La variété bleue, exposée à un feu soif, perd sa couleur.

Analysé par Klaproth.

Alumine..... 95.

Fer..... 5.

100.

Caract. distinctifs. 1°. Entre la télaie et la cymophane. La première se divise nettement dans un sens parallèle à la base de son prisme hexaédre; dans l'autre, les coupes les plus nettes sont parallèles à deux faces latérales opposées. La réfraction de la télaie est simple; celle de la cymophane est double. 2°. Entre la télaie rouge taillée et le spinnelle. La première est plus dure, et a une pesanteur spécifique plus grande, dans le rapport d'environ 20 à 19. 3°. Entre la même de couleur jaune et la topaze. Celle-ci a la double réfraction; la télaie l'a simple; elle est plus dure, plus pesante, dans le

à la télaie est simplement hypothétique, et que les parts nécessaires pour compléter la structure, manquent des portions obliques à l'axe. Mais je n'ai encore, à cet égard, que de légers indices, que je me propose de vérifier. Je reviendrai sur ce sujet en comparant la télaie verticalement, à l'analyse de ces dernières substances.

(1) La hauteur Ad du triangle de la base est à la hauteur Ae du prisme comme 2 à 1/2.

rapport d'environ 8 à 7, et n'est jamais électrique par la chaleur, comme certains topases. 4°. Entre la télaie tellée et le quartz-hyalin. La télaie raye le quartz; sa pesanteur spécifique est plus grande, dans le rapport d'environ 3 à 2. Sa réfraction est simple; celle du quartz est double. 5°. Entre la télaie sans couleur, dite *opaler blanc*, et le diamant. Celui-ci raye la télaie; son éclat est plus vif; sa pesanteur spécifique est moindre, dans le rapport d'environ 7 à 8.

V A R I É T É S.

F O R M E S.

Déterminables.

1. *Télaie primitive*. MP (fig. 19).

2. *Télaie usinée*. $\frac{B}{2}$ (fig. 21). En dodécèdre pyramidal. Incidence de B sur B' , $159^{\circ} 34'$; de B sur A , $123^{\circ} 58'$. Valeur de l'angle au sommet du triangle A , $22^{\circ} 24'$. Valeur de chaque angle latéral, $76^{\circ} 48'$.

3. *Télaie usinée*. $\frac{B}{n}$ (fig. 22). En dodécèdre pyramidal, moins étalagé. Incidence de n sur n' , $122^{\circ} 36'$; de n sur n , $127^{\circ} 58'$. Valeur de l'angle au sommet du triangle n , 34° . Valeur de chaque angle latéral, $74^{\circ} 30'$.

4. Tétréde tétraédrique. $\begin{smallmatrix} \frac{1}{2}P & \frac{1}{2}A & \frac{1}{2}a & \frac{1}{2}E \\ \frac{1}{2}P & r & r & r \end{smallmatrix}$ (fig. 23).

La var. unitaire dont les deux sommets sont remplacés par des bases entourées de facettes tétraédriques. Incidences de r sur P , $122^{\circ} 18'$.

5. Tétréde distodicaédre. $\begin{smallmatrix} \frac{1}{2}H & \frac{1}{2}h \\ l & n \end{smallmatrix}$ (fig. 24). Incidences de l sur l' , $159^{\circ} 18'$; de l sur l , $121^{\circ} 4'$; de n sur l , $161^{\circ} 38'$.

Indéterminables.

6. Tétréde amorphe.

ACCIDENTS DE LUMIÈRE.

Couleurs.

1. Tétréde Esquide. Saphir blanc des lapidaires. Lemois-saphir, *Mémoires indiens*, ch. *P'*.

2. Tétréde rouge. D'un rouge très-intense. Rubis d'Orient des lapidaires.

3. Tétréde rouge-rose. Vermeille orientale, Buffon, *hist. nat. des min.*, édit. in-12., t. *P*II, p. 406.

4. Tétréde jaune. C'est le jaune pur. Topaze orientale des lapidaires.

5. Tétréde bleu. D'un bleu d'acier, Saphir oriental des lapidaires. Saphir bleu de quelques an-

H h a

teurs. La téksie d'un blanc bleuâtre porte, en Allemaigne, le nom de Iachaphir (1).

6. *Téksie indigo*. Saphir mâle de quelques auteurs.

7. *Téksie verte*. *Emeraude orientale*? Solage, t. I, p. 150.

8. *Téksie violette*. *Amethyste orientale* des lapidaires, *Encyclop. method., arts et métiers*, t. I, première partie, p. 150.

Parmi les téksies, quelques-unes sont en partie colorées et en partie luisides. D'autres réunissent deux couleurs et quelquefois trois couleurs situées dans différentes parties.

Reflets particuliers.

9. *Téksie girazé*. Des reflets d'une légère teinte de rouge et de bleu, sortant d'un fond sans couleur. *Briasson, poésies épiques*, n°. 122.

10. *Téksie blanc chatoyante*. A reflets blancs, nacrés, quelquefois très-vifs. Saphir de chat de quelques minéralogistes.

11. *Téksie rouge chatoyante*.

12. *Téksie aisérie*. *Aisérie* luiside et aisérie visible, *Smuteau, Voyage dans les Alpes*, n°. 163. A reflets disposés en étoile à 6 rayons.

Transparence.

1. *Téksie transparente*.

2. *Téksie translucide*.

(1) *Erckmant, traité des-min. de suède*, p. 207.

*Substances étrangères à la télaie bleue, auxquelles
on a donné le nom de saphir (1).*

Saphir d'eau. Le quartz-hyale bleu.

Saphir du Brésil. La tourmaline bleue.

Saphir (faux). La chaux fluide bleue.

NOTES.

1. Les cristaux de télaie les plus anciennement connus, ont été apportés du royaume de Pégu et de l'île de Célan. On en a trouvé, depuis, en Bohême, entre Mersebourg et Bôlitz; et en France, à une lieue de la ville du Puy, dans le sable d'un ruisseau voisin du village d'Espailly, où ils sont mêlés avec des gravats, des pierres et des grains de fer. On a donné à ces derniers le nom de saphirs du Puy. Mais il ne paraît pas que, jusqu'ici, on ait encore observé la télaie dans les lieux où elle a pris naissance, et accompagnée des substances qui lui ont servi de gîte.

2. La télaie a rarement une forme bien prononcée; ses cristaux sont souvent ternes et ont leurs angles oblitérés. Souvent aussi les faces des pyramides présentent des interruptions, des co-

(1) On trouve aux articles de spinelle et de la topaze les noms des substances qui ont été confondues avec la télaie rouge et la jaune, sous le nom de rubis ou de saphir.

pièces d'assoliers, qui subissent une cristallisation précipitée. Plusieurs s'amincissent insensiblement en pyramides, dont les faces sont à peine inclinées sur les bases. J'ai été très-long-temps sans pouvoir m'en procurer d'autres caractérisés, pour se prêter à l'application de la théorie des décroissemens.

3. On voit dans la collection du muséum d'histoire naturelle, une télaie bleue d'un volume considérable, qui y a été transportée du garde-musée de la couronne. Elle pèse, suivant le Cit. Brisson (1), 7 gros, 7 grains $\frac{1}{2}$, qui reviennent à peu près à 272 décigrammes. Elle a la forme d'un parallépipède oblique. Mais son aspect dénote visiblement le poli de l'art, et n'est point fait pour donner une véritable idée de sa véritable forme originale. On peut seulement présumer que celle-ci avoit, avec le rhomboïde, un certain rapport que l'artiste aura conservé, du moins en gros, pour ménager le volume de la pierre.

4. Le nom de *d'oriental* a été donné à la télaie, parce qu'on l'avoit trouvée d'abord dans l'Inde, et l'on appelloit *occidentales* d'autres pierres, telles que la topaze de Saxe, qui se trouvoient dans les pays occidentaux. Les variétés de la télaie étant plus estimées que ces dernières pierres, à raison de leur dureté, de leurs vives couleurs, du beau poli dont elles étoient susceptibles, les mots *d'oriental* et

(1) *Pauc.* opusc., N°. 170.

d'*occidental* emportoient en même temps avec eux l'idée d'une plus grande ou d'une moindre perfection; et ils ont fini par n'être plus que les signes de cette idée, lorsque des observations plus récentes eurent fait rencontrer dans les pays occidentaux des pierres qui ne le cédoient en rien aux premières. C'est dans ce sens que le saphir du Puy peut être appelé *oriental*. La même acception a été étendue, depuis, aux *agates*, aux *aldéens*, etc. Ce sont les qualités qui plaient à l'œil, et non pas les localités qui, dans l'usage du commerce, décident de l'appellation des mots *oriental* et *occidental*.

5. L'usage qui s'étoit introduit de distribuer les gemmes d'après les couleurs, a jeté une grande confusion dans cette partie de la lithologie. Si nous rapportons ces couleurs à celles du spectre solaire, comme à des termes généraux de comparaison, nous aurons le tableau suivant.

Rouge. Rubis.

Rouge mêlé d'un peu d'orangé. *Vermille*.

Rouge chargé d'orangé. *Hyaënthé la belle*.

Orangé. *Hyaënthé*.

Jaune. Topaze.

Jaune-vertâtre. *Chrysoëte*.

Vert-jaunâtre. *Péridot*.

Vert. *Emeraude*.

Vert-bleuâtre. *Aigue-marine*. *Beil*.

Bleu. *Saphir*.

Indigo. *Saphir indigo*.

Fischer. Anethysis.

Il résultait de cette adoption de la couleur , comme caractère spécifique , que les télesies rouges , les télesies jaunes et les télesies bleues , dont l'identité est prouvée par l'ensemble de leurs propriétés vraiment caractéristiques , appartenaient à trois espèces différentes , et que la teigne de Sexe et la télesie jaune , qui ont des différences très-marquées relativement aux mêmes caractères , étoient deux variétés d'une même espèce ; et ainsi de beaucoup d'autres séparations ou réunions parfaitement dérivées par la nature.

La télesie bleue a quelquefois des parties sans couleur. Les lapidaires , comme nous l'avons dit , nommoient ces parties *asphires blanches*. Dans une nomenclature fondée sur la coloration , on étoit conduit à faire un accident de ce défaut de couleur , tandis que le véritable accident étoit la couleur elle-même. On trouve aussi des télesies dont une partie est rouge et l'autre bleue. Dans quelques-unes , c'est le jaune qui est associé au bleu. Il y auroit donc alors deux espèces réunies dans un même individu.

Les naturels de l'Inde , guidés par les faits qui viennent d'être cités , comprenoient les variétés de la télesie sous la dénomination commune de *rubis* , et nommoient *rubis rouge* , *rubis jaune* , *rubis bleu* , ce qu'on appelle ici *rubis* , *topaze* et *saphir* d'Orient. Mais leur théorie ne s'étendoit pas à la

jaune de leur observation. Ils s'imaginoient que le cristal, d'abord sans couleur, devenoit, pour ainsi dire, dans sa mine, en passant successivement par différentes teintes, jusqu'à ce qu'il fut parvenu au rouge, qui annonçoit le point de sa maturité (1).

Aujourd'hui, ceux qui parmi nous mettent une certaine méthode dans l'étude des pierres fines, comme objet d'agrément, désignent assez communément les rubis, saphir et topaze d'Orient des anciens minéralogistes, sous la dénomination commune de *pierrres gemmes orientales*; et à ne considérer même la chose qu'en qualité d'ornement, peut-être est-ce un motif de plus pour admettre ici le placebo de la nature, que de la voir partager entre les individus d'une seule et même gemme, les trois couleurs dominantes, celles qui, par leurs mélanges artificiels, produisent toutes les autres (2), et donner à ces couleurs des tons à la fois clairs et gracieux, susceptibles de s'embellir encore par les reflets étincelans qui naissent de la vivacité et de la perfection du poli. Et lorsqu'une portion de

(1) De Lisle, t. III, p. 110, Mercure indien, chap. 2.

(2) Les anciens peintres se sont bornés, pendant long-temps, à employer ces trois couleurs, dont ils faisoient, en les mélangeant, des couleurs intermédiaires assorties à celles des objets qu'ils se proposoient de rendre sur la toile. Encycl. méth., beaux-arts, t. I^{er}, I^{re} part, p. 160.

la gemme est privée de cette pureté, lorsqu'elle se présente pure et limpide, c'est pour acquiescer, entre les mains de l'art, au mérite d'un autre genre, celui d'être le seul corps capable de soutenir la comparaison avec le diamant, si quelque chose pouvoit lui être comparé.

6. Plusieurs des lapidaires qui ont écrit sur les objets de leur art, placent la *téliée rouge*, dite *rubis orientel*, au premier rang, parmi les variétés de couleur de cette gemme. Suivant l'auteur du *mercure indien* (1), elle ne le cède pas même au diamant, du côté du prix; et l'auteur de l'article *diamantaire*, dans l'*encyclopédie méthodique* (2), cite un rubis du poids de 6 carats, qu'il met au-dessus d'un diamant de même poids. L'un et l'autre s'accordent à donner le second rang au saphir ou à la *téliée bleue*, et le troisième à la *téliée jaune* ou à la *topaze*. Mais Robert de Burquen, l'un des descendants de celui qui inventa l'art de tailler le diamant, donne la préférence au saphir, parce qu'étant susceptible de perdre sa couleur au feu, il peut ensuite, au moyen de la taille, approcher de la beauté du diamant (3).

(1) Chap. 5 et 6.

(2) *Art et métier*, t. II, 1^{re} part., p. 148.

(3) *Merveilles des Indes orientales*, ch. 5 et 4.

IV. ESPÈCE.

CYMOPHANÉ, d'est-à-dire, *lumière mouvante*.

Chrysolithes colares reflectens variis; chrysoberillus, Waller, *t. I*, p. 226. Chrysoberill, Kuntzeberg, *t. I*, p. 15. Cymophane, *Journal des mines*, N°. 21, p. 5. Chrysoberil, *ib.*, p. 17. Cymophane, Daubenton, *ibid.*, p. 7. Chrysolithe orientale; chrysolithe chatoyante; chrysolithe opaline de quelques naturalistes. Chrysoberil, Kirwan, *t. I*, p. 261. Le chrysoberil, Brochant, *t. I*, p. 167.

Caractère essentiel. Pouvoir spécifique d'environ 3,8. Jointe naturelle parallèles seulement à l'axe des cristaux.

Caract. phys. Pouss. spécif., 3,7361.

Durété. Rayant fortement le quartz.

Réfraction, double (1).

Joux de lumière. Des reflets d'une couleur laiteuse blanchâtre, qui semblent flotter dans l'intérieur des cristaux. Ils n'existent pas toujours.

Caract. géom. Forme primitive. Parallépi-

(1) Je l'ai vu d'abord simple, d'après des observations faites avec un fragment de cristal taillé, qui étoit subulaire. Mais depuis, j'ai trouvé des morceaux qui étoient apocroites tels-semblablement la double image.

pède rectangle (*fig. 25*) *pl. XLIX*. Les joints parallèles à T sont plus sensibles que ceux qui ont lieu dans le sens de M. La position des bases n'est que présumée.

Molécule intégrante. *Id.* (1).

Cassure, transversale, conchoïde, éclatante.

Caract. chim. Infusible.

Analyse par Klaproth.

Alumine.....	71,5
Chaux.....	6,0
Silice.....	18,0
Oxyde de fer.....	1,5
Perte.....	3,0
Total.....	<u>100,0.</u>

Caractères distinct. 1°. Entre la cymophane et la télaie. Celle-ci se divise très-nettement dans un sens parallèle à la base de son prisme; les divisions les plus apparentes de la cymophane sont parallèles à deux faces latérales opposées; la télaie est plus dure, sa réfraction est simple, et celle de la cymophane est double. 2°. Entre la même et l'émeraude vert-jaune. Celle-ci se divise parallèlement à ses six pans et à ses bases; sa pesanteur spécifique est moindre, dans le rapport d'environ 3 à 4. 3°. Entre la cymophane inférieure et la

(1) Le côté C de la base est un côté B comme l'a à 1, et le même côté C est à la hauteur G comme 1/3 à 1.

chaux phosphatée, nommée *cléynolite*, par les Français. La première raye fortement le quartz; l'autre raye à peine le verre; la pesanteur spécifique de la cymophane est plus grande, dans le rapport d'environ 5 à 4. Entre la même et la topaze jaune-verdâtre. La cymophane n'est point électrique par le choc, comme plusieurs topazes. Elle est sensiblement plus dure et plus pesante; ses divisions parallèlement à l'axe de ses cristaux sont beaucoup moins nettes que dans la topaze, où elles se font d'ailleurs perpendiculairement à l'axe. 3°. Entre la cymophane et le feldspath, dit *pierre de lave*, taillés tous deux en cubochon. Le feldspath est moins pesant, dans le rapport d'environ 5 à 7; il s'électrise difficilement par le frottement, et la cymophane avec beaucoup de facilité.

V A R I É T É S.

F O R M E S.

Déterminables.

1. Cymophane anamorphique. $\frac{MT\bar{H}}{MT\bar{L}}$ (fig. 16).

En prisme hexaèdre régulier, ordinairement court, qui pour être dans la position relative à ses axes, doit avoir ses bases verticales. Inclinaison

de M sur T, 90° ; de i sur M, 90° ; de i sur i et sur T, 180° .

2. Cymophane annulaire. $\begin{array}{ccccccc} M & T & G & G' & B & A' & A \\ & & & & & & \\ & & & & & & \end{array}$
 $\begin{array}{ccccccc} M & T & & & i & & o \end{array}$
 (Fig. 27). Incidences de o sur M, $126^\circ 16'$; de o sur T, $144^\circ 44'$; de o sur M, $136^\circ 41'$; de o sur i , $133^\circ 19'$; de o sur T, $110^\circ 5'$.

3. Cymophane dégonc. $\begin{array}{ccccccc} M & T & G & G' & G' & B & A' & A \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \end{array}$
 $\begin{array}{ccccccc} M & T & & & & & i & o \end{array}$
 (Fig. 28) pl. XLIII. La variété précédente augmentée de quatre facettes verticales. Incidences de z sur M, $136^\circ 41'$, la même que celle de o sur M; de z sur T, $133^\circ 19'$, la même que celle de o sur i .

4. Cymophane orthogonale. $\begin{array}{ccccccc} M & T & G & G' \\ & & & \\ & & & \end{array}$
 $\begin{array}{ccccccc} M & T & & & & & o \end{array}$
 $\left(\begin{array}{ccccccc} A' & A & G' & G' \\ & & & \\ & & & \end{array} \right) \begin{array}{ccccccc} A' & A & B \\ & & \\ & & \end{array}$ (Fig. 29). Huit pans au prisme, et vingt faces pour l'ensemble des deux cristaux. Incidences de n sur M, $128^\circ 43'$; de n sur T, $126^\circ 8'$; de n sur o , $163^\circ 53'$. Les arêtes y , i sont parallèles.

Indéterminables.

5. Cymophane roulée.

ACCIDENTS DE LUMIÈRE.

Couleurs.

Cymophane orthogonale.

Transparence.

1. Cymophane transparent.
2. Cymophane translucide.

A N N O T A T I O N S.

1. Plusieurs naturalistes indiquent le Brésil comme lieu natal des cymophanes, et il n'est pas douteux qu'il s'en vienne de ce pays. J'en ai vu une très-grande quantité, qui avoient été acquises en Portugal, avec des topazes du Brésil. Quelques-unes présentaient des formes régulières; mais la plupart étoient arrondies, et paroissent avoir été roulées. On a dit aussi qu'il y avoit des cymophanes dans l'île de Ceylan, et à Nerstchinsk en Sibirie.

2. La cymophane approche de la télaie par sa pesanteur spécifique et par sa dureté. Sa cristallisation jointe aux deux caractères précédens, pourroit même la faire confondre avec la télaie, lorsque l'une et l'autre se présentent sous la forme du prisme hexaèdre régulier. Il est rare qu'il existe un pareil accord entre trois caractères aussi marqués. Le plus souvent ils se croisent dans les substances de nature différente. Mais il resteroit alors la division mécanique et la double réfraction pour lever l'équivoque.

3. Si l'on a égard aux différences individuelles, la cymophane est assez facile à reconnaître, lors-

qu'elle a un chatoyement soyeux. Ces reflets d'un bleu tendre, qui se jouent dans l'intérieur de cette gemme, produisant un effet dont l'œil est flatté ; mais souvent ils dégèrent en une légère teinte de laiteux, qui ne sert qu'à effluquer la transparence ; et de là vient qu'en général les morceaux taillés de cette substance, quoique d'un ton de couleur assez agréable, perdent beaucoup dans l'ordure des lapidaires.

4. Le nom de chrysoberil que la cynophane porte en Allemagne, a été donné aussi par quelques auteurs à la topaze dite de Saxe.

V^e. E S P È C E.

S P I N E L L E.

Rubicus, colore incarnato subcervuleo mixto, *Palmarum Pfaller, t. I, p. 247. b. Rubicus colore rubro subalbo, spinellus, ibid., 247. Rubis spinelle octaèdre, de Lisle, t. II, p. 224. Rubis balais octaèdre, de Bern, t. I, p. 62 et 63. Il B b. 1. b. 2... 4. 6. Rubis spinelle octaèdre, ibid., p. 63, c. 1. c. 2. Spinell, *Koenig, t. I, p. 56. Rubis, Perner, catal., t. I, p. 228. Rubis, Seign, t. I, p. 262. Rubis balais, et rubis balais, dit spinelle, Dandenton, tabl., p. 5. Spinell and balais rubies, Kéwan, t. I, p. 202.**

Caractère

Caractères essentiels. Rayant fortement le quartz.
Forme primitive et forme ordinaire, l'octaèdre régulier.

Caract. phys. Pou. spécifique, 3,6458...3,76.

Durci. Rayant fortement le quartz, rayé par la téchale.

Réfraction, simple.

Caract. géom. Forme primitive. L'octaèdre régulier (fig. 30) pl. XLIII. Les joints naturels ne sont pas toujours sensibles.

Molécule intégrante. Le tétraèdre régulier.

Cassure, vitreuse.

Caract. chim. Infusible au chalumeau.

Analyse du spinelle, par Klaproth.

Alumine.....	76.
Silice.....	16.
Magnésie.....	8.
Oxyde de fer.....	1, 5.
	<hr/>
	101, 5.

Analyse de la même substance, par Vauquelin (1).

Alumine.....	82,47.
Magnésie.....	8,78.
Acide chromique.....	6,18.
Perte.....	2,57.
	<hr/>
	100,00.

(1) Journ. des mines, N°. 58, p. 49.

Caractères distinctifs. 1°. Entre le spinelle primitif et le zircon primitif. Le premier a tous ses triangles équilatéraux; ceux de l'autre sont isocèles. 2°. Entre le spinelle primitif et le pléonaste primitif. Le spinelle raye fortement le quartz; le pléonaste ne le raye que légèrement. Le spinelle a une structure plus sensiblement lamellaire; et lorsqu'il présente une cassure, celle-ci est inégalement conchoïde, au lieu que dans le pléonaste elle est à bords égaux, parfaitement lisses. 3°. Entre le spinelle d'un beau rouge taillé, et le même rouge taillé. Celle-ci est plus dure, et a une pesanteur spécifique plus grande, dans le rapport d'environ 20 à 23. 4°. Entre le spinelle, dit rubis de Siam, taillé, et le topaze rouge taillé. Le premier n'a ni l'électricité par la chaleur, ni la double réfraction, comme le topaze.

V A R I É T É S.

F O R M E S.

Déterminables.

1°. *Spinelle primitif*. P (*fig. 10*). Octaèdre régulier, de *Stahl*, t. II, p. 228; var. 1. Incidence de deux faces voisines quelconques l'une sur l'autre, 109° 48' 16".

2°. *Spinelle primitif canaliculé*.

3°. *Spinelle primitif égéroidiforme*; semblable à un

segment extrémité d'un octaèdre, coupé parallèlement à deux de ses faces opposées , de *Lisle*, t. II, p. 227 ; var. 6.

2. Spinelles émarginés. $\frac{PBH}{P \frac{1}{2} +}$ (Fig 33). De *Lisle*, t. II, p. 226 ; var. 2. Incidence de + sur P, $144^{\circ} 44' 0''$.

3. Spinelles tronqués (Fig 34). De *Lisle*, t. II, p. 227 ; var. 7.

Considérons un plan horizontal (Fig 32) qui coupe l'octaèdre primitif parallèlement aux deux triangles *deg*, *gfi*, en passant à égale distance entre l'un et l'autre. Chaque moitié de l'octaèdre, par exemple, la moitié supérieure aura pour base d'une part un hexagone régulier *harcsh*, qui se confondra avec la section ; et de l'autre, un triangle équilatéral *deg* ; et pour faces latérales , trois trapèzes *ehc*, *gch*, *ghc*, et trois triangles équilatéraux *aea*, *ebc*, *hgc*, qui donneront avec les trapèzes (1). On voit (Fig 33) les deux moitiés de l'octaèdre séparées l'une de l'autre.

Imaginons maintenant que la moitié supérieure tourne sur l'inférieure d'un sixième de circonférence. On aura l'assemblage représenté par la fig 34, dans laquelle *h'e's'e'e'h'* indique l'hexagone qui appartient à la moitié inférieure (Fig 33),

(1) La fig. 33 représente la même coupe faite dans l'octaèdre situé comme celui de la fig 32.

et qui est resté fixe ; et *Abraco* (*fig. 34*) indique la position de l'hexagone qui appartient à la moitié supérieure (*fig. 33*), et qui a tourné de manière que le point *h* qui répondoit au point *h'* répond maintenant au point *n'* ; et ainsi des autres. Par une suite nécessaire, les trois triangles supérieurs *acn*, *agh* font des angles rentrans avec les triangles inférieurs *a'd'e'*, *e'f'h'*, *n'p'h'* ; et les trois trapèzes supérieurs *entg*, *enab*, *abng* font, au contraire, des angles saillans avec les trapèzes inférieurs *de'n'p*, *de'e'f*, *fe'h'p*.

Cette supposition est la plus simple possible. Mais l'assortiment sera le même , si l'on conceit que la moitié supérieure ait tourné d'une moitié de circonférence , ce qui seroit rentrer le cas présent dans celui des hémisphères. Au reste, de quelque manière que l'on envisage la chose , il est singulier de voir à quel point l'aspect de l'ostéoderm se trouve changé par le simple déplacement d'une de ses moitiés , et il a fallu la sagacité de *Romé de Lile* , pour déceler le solide générateur à travers ces dehors équivoques.

Indéterminables.

4. *Spinella amorpha*. En petites masses roulées,

A C C I D E N S D E L U M I È R E.

Couleur.

1. *Spinelle rouge - écarlate*. *Rubis spinelle* des

DE MINÉRALOGIE. 501

lapidaires, et quelquefois rubis oriental. On l'appelle aussi *coronelle*, lorsque le rouge y est mêlé d'une forte teinte d'orange.

2. Sp. rouge de rose (ordinairement un peu faible). Rubis balais des lapidaires.

3. Sp. violet.

4. Sp. rouge-jaunâtre. Rubicelle ou rubacelle.

5. Sp. noirâtre.

Tranparentes.

1. Sp. transparent.

2. Sp. translucide.

3. Sp. opaque.

Substances étrangères à l'espèce de spinelle , auxquelles on a donné le nom de rubis.

1. Rubis d'Orient. Le télaire rouge.

2. Rubis du Brésil. Le trapaze rouge.

3. Rubis balais. *Id.* (1).

4. Rubis de Bohême. Le quartz d'un rouge de rose.

5. Rubis de Barbarie. Le grenat (2).

6. Rubis de roche, Rubins di rocca des Italiens. Le grenat d'un rouge mêlé de violet.

7. Rubis (faux). La chaux élastée rouge.

8. Rubis de soufre, ou rubins d'arsenic. Les cristaux d'arsenic sulfuré rouge.

(1) Ensay. méthod., art. min., t. II, 1^{re} part., p. 242.

(2) Mémoires indus., livre I., chap. 17.

1. Les cristaux de Spinelles se trouvent à Ceylan, dans une rivière qui vient des hautes montagnes situées vers le milieu de cette île (1). Ils sont extrêmement de diverses, de tourmalines et de diverses autres pierres. Je n'en ai jamais vu que d'un seul. On les confondait avec la télaire rouge, dite rubis oriental, avant que la forme cristalline de celle-ci fût connue, et l'on supposait, en conséquence, qu'ils avoient le même lieu natal, qui étoit le royaume de Pégu(2).

2. L'espèce de déplacement que subit une des moitiés de l'octaèdre primitif, dans le spinelle transparent, et en général les renversemens qui produisent dans les cristaux des angles rentrans d'une part, et saillans de l'autre, semblent dépendre d'une sorte de polarité qui agit sur les molécules intégrantes.

Dans les cas ordinaires, cette polarité détermine les petits rhomboïdes ou autres parallépipèdes, qui forment ces molécules, à s'accoler de manière que les faces voisines de celles de jonction soient de part et d'autre sur un même plan. Mais il y a une seconde position, dans laquelle les deux

(1) De Lisle, t. II, p. 280.

(2) Voyez la 2^e. édit. de la cristallogr. de même auteur, p. 219.

rhombes de jonction ayant toujours une coïncidence parfaite, les faces voisines forment ensemble un angle rentrant d'un côté, et un angle saillant du côté opposé. Il ne s'agit, pour arriver de la première position à la seconde, que de faire faire à l'un des rhombes de jonction un demi-tour sur l'autre. Or, lorsque ce dernier cas a lieu dans la nature, on peut concevoir que c'est en vertu d'un renversement de pôles analogue à celui des pôles de deux aimans; et il suffit même que, par une cause quelconque, les premières molécules qui se réunissent pour faire naître un cristal, ayant pris des positions renversées, pour que celles qui viennent ensuite s'y juxtaposer, s'arrangent à leur imitation; d'où il résultera que toutes les molécules d'une moitié seront situées en sens contraire de celles de la moitié opposée. Au reste, le peu de connaissances que nous avons sur l'action intime des forces qui déterminent la cristallisation, ne nous permet que de simples aperçus relativement aux accidens de ce genre.

3. Quelquefois le spinelle soit même surpassé par les lapidaires que la sélène rouge, qui est sensiblement plus dure, et a plus de jeu, ces articles neissent pas d'y attacher beaucoup de prix, lorsqu'il est d'un certain volume et d'un rouge vif. On le fait même quelquefois passer alors pour le vrai rubis oriental. L'auteur de l'article diamant-herpèsite, *Encyclop., méthod., arts et métiers*, t. II,

première partie, p. 148, dit qu'un beau rubis spinelle, dont le poids pèse quatre carats, vaut la moitié du prix d'un diamant de même poids.

VI. E S P È C E.

TOPAZE (du nom d'une île où se trouve la pierre ainsi appelée par les anciens).

Topazius octaëdricus palaraticus, *Waller*, *t. I*, p. 210. In descriptione. Topaze, rubis, saphir du Brésil, *de Lisle*, *t. II*, p. 230. Topaze de Saxe, *ib.*, p. 250. Topaze du Brésil et topaze de Saxe, *de Born*, *t. I*, p. 74 et suiv. Topaze du Brésil, *Sciagr*, *t. I*, p. 261 et 263. Chrysoberil ou topaze de Saxe, *ib.* Topaz, *Kemering*, *t. I*, p. 73. *Id.*, *Werner*, *cat.*, *t. I*, p. 206. Topaze de Saxe, *Darbenston*, *cat.*, p. 5. Rubis et topaze du Brésil, *ib.*, p. 8. Occidental topaz, *Kirwan*, *t. I*, p. 264. La topaze, *Brochant*, *t. I*, p. 212.

Caractère essentiel. Double réfraction; joints très-sensibles, perpendiculaires seulement à l'axe des cristall.

Caract. phys. Pouss. spécif., 3,5311.....3,564.

Durété. Rayant le quartz, rayée par le rubis.

Réfraction, double.

Électricité; vitrée d'un côté, et résineuse de l'autre, par la chaleur, dans les topazes dites du Brésil et de Sibirie.

Caractère géom. Forme primitive (fig. 36), pl. XLIV. Prisme droit à bases rhombes, ayant leur grand angle de $124^{\circ} 22'$. Les coupes parallèles aux bases sont toutes bien sensibles, et ont une grande netteté.

Molécule intégrante. Id. (1).

Cassure, longitudinale, échecaille et brillante.

Caract. chim. Infusible au chalumeau. La topaze dite du Brésil, mise dans un creuset, et exposée à un feu capable de faire rougir ce creuset, prend une couleur d'un rouge de rose. La topaze dite de Saxe, blanchit entièrement dans le même cas.

Analyse de la topaze de Saxe, par Vauquelin.

Silice.....	31.
Alumine.....	68.
Perte.....	1.
	<hr/>
	100.
	<hr/>

(1) Si l'on suppose une perpendiculaire p menée de l'angle A sur l'arête B , et que l'on désigne par g la moitié de la grande diagonale, on pourra faire $p = 14$, $g = 15$. De plus, d'après l'observation qu'une face produite par un décroissement de deux rangées sur l'arête B fait avec le plan adjacent un angle égal à celui que fait avec la face F , fig. 35, une autre face produite par un décroissement de deux rangées sur l'angle E , on aura, en désignant la hauteur par h , $15 = h$, $14 = h$, d'où il est facile de conclure tout le reste.

FORMES (1).

Déterminations.

1. Topaze électroïde. $\begin{matrix} M & G & B \\ M & L & C \end{matrix}$ (fig. 37) (2).

Prisme octaédre à sommets tétraédres. De *Lisle*, t. II, p. 253 et suiv. 1, 2, 3. Incidence de M sur M, $124^{\circ} 30'$; de M sur L, $161^{\circ} 10'$; de L sur le pan de retour adjacent à l'arête c, $93^{\circ} 0'$; de c sur c, $142^{\circ} 40'$; de c sur M, $153^{\circ} 57'$.

On voit (fig. 37, A.) la coupe transversale *atr'a'tr'* du prisme octogone, dans laquelle l'effet du déroulement 'G' est rendu sensible,

(1) L'analogie semble indiquer que dans les topazes électroïques par la chaleur, les sommets, s'ils existaient tous les deux, deviendraient différents par leur configuration. Dans l'incristallisé où je suis parvenu à cet égard, n'apparaît cependant que des cristaux terminés d'un seul côté, j'ai supposé que tout était égal de part et d'autre. On pourra trouver, dans la suite, des topazes complètes, et si l'on ose examiner si la propriété de électriser par la chaleur y est jointe, comme dans la tourmaline et la magnésie locale, à des différences entre les formes des deux parties dans lesquelles résident les centres d'actions des électrisités opposées, et si les cristaux dépourvus de cette même propriété, conservent l'analogie des formes ordinaires.

(2) On a représenté séparément, sous chaque figure, le sommet du cristal, en projection horizontale.

au moyen des petits rhombes ou des bases de molécules dont est composé le rhombe $aa't$, qui représenterait le coupe, dans le cas où le décroissement serait nul.

2. Topaze soustractive. $\begin{matrix} M & G^* & \hat{B} & \hat{E} \\ M & I & a & n \end{matrix}$ (fig. 38).

La variété précédente augmentée à chaque sommet de deux faces n , qui naissent sur les arêtes a . Incidence de n sur a , $91^{\circ} 58'$; de n sur l'arête a , $154^{\circ} 1'$.

Dans les topazes de Sibérie, le sommet est onguiforme, ainsi que le représente la figure; dans celles du Brésil, les six faces se réunissent souvent en pointe.

3. Topaze monastique. $\begin{matrix} M & G^* & \hat{B} & \hat{E} & P \\ M & I & a & n & P \end{matrix}$ (fig. 39).

La variété précédente basée. De Lia , t II , $p=ab_4$; var. a . Incidence de a sur P , $154^{\circ} 1'$; de n sur P , $135^{\circ} 59'$: la même que celle de a sur M .

4. Topaze sautoyée. $\begin{matrix} M & G^* & G^* & \hat{B} & \hat{E} & P \\ M & n & I & a & n & P \end{matrix}$ (fig. 40).

La variété précédente à prisme dodécédre. Incidence de n sur M , $150^{\circ} 6'$. *Voyez* fig. 40, A , la coupe transversale aa' , etc., du prisme, tracée d'après le même principe que celle qui est représentée fig. 37, A .

Cette variété a été déterminée à l'aide du cal-

cul théorique, par le Cit. Cordier, ingénieur des mines.

5. Topaze disséquée. $\begin{matrix} M & G & B & B & E & E & P \\ M & I & a & a & a & a & P \end{matrix}$ (fig. 41).

La variété monostiquée augmentée à chaque sommet, de six nouvelles facettes, dont quatre sont situées au-dessus des facettes a , et deux au-dessous des facettes a . Incidence de a sur P , $145^{\circ} 24'$; de a sur M , $124^{\circ} 36'$; de a sur P , $117^{\circ} 24'$.

6. Topaze disséquée. $\begin{matrix} M & G & B & B & E & E & P \\ M & I & a & a & a & \left(\begin{smallmatrix} E & B & B \\ x \end{smallmatrix} \right) & P \end{matrix}$ (fig. 42). La précédente, dans laquelle les nouvelles facettes x troublent la ressemblance entre les deux rangées de faces obliques. Incidence de x sur I , $151^{\circ} 34'$; de x sur P , $138^{\circ} 25'$.

Indéterminables.

7. Topaze cylindroïde. Prisme déformé par des arrondissemens et des sauteres longitudinales, qui empêchent de compter le nombre des pans.

Les cristaux de topaze sont, en général, plus ou moins sujets à ces accidens, qui ont lieu surtout par rapport aux pans I , I , produits en vertu du décroissement G .

8. Topaze roulée.

ACCIDENS DE LUMIÈRE.

Couleurs.

1. Topaze bleue. La topaze de Sibérie.

2. *Topaze jaune*. La topaze de Saxe et celle du Brésil. *Chrysoprane* d'Orient, *Becham*, cat., p. 157.

3. *Topaze jaune-pâle*. La topaze de Saxe.

4. *Topaze jaune-rougeâtre*. La topaze du Brésil.

5. *Topaze jaune-safranée*. Topaze d'Inde de quelques mines.

6. *Topaze jaune-rougeâtre*. Rubicelle, ou rubicelle selon quelques-uns.

7. *Topaze jaune-verdâtre*. *Chrysolithe* de Saxe, de *Lisle*, t. II, p. 287, et probablement une partie des gemmes que l'on nomme *chrysolithes des lapidaires*.

8. *Topaze bleu-verdâtre*. *Aigue-marine orientale*, *Becham*, *peaux spécif.*, p. 68. *Saphir du Brésil*, de *Lisle*, t. II, p. 289, note 109. *Beril*, *Bayle*, *hist. nat. des min.*, édit. in-12, t. VI, p. 289.

9. *Topaze rouge*. Rubis du Brésil des lapidaires; rubis balais, *Encyclop.*, méth., arts et mët., t. II, 1^{re} partie, p. 148.

10. *Topaze laiteuse*. D'un blanc mat.

Transparence.

1. *Topaze transparente*. Une grande partie des topazes de Saxe et de Sibérie.

2. *Topaze translucide*. Dans les topazes du Brésil, le défaut de transparence parfaite est sou-

DE MINÉRALOGIE. 311

vent occasionné par des glaces et autres accidens accidentels.

3. Topaze opaque. Cette opacité est une suite nécessaire de la couleur laiteuse dans certaines topazes de Saxe.

Substances étrangères à l'espèce de la topaze , auxquelles on a donné son nom.

Téliéto jaune. Topaze orientale.

Zircon. Topaze hyaline, *Waller, édit. 1778, t. I, p. 222.* Topaze rouge-pâle, *ibid.*

Péridot. Topaze jaune-verdâtre, *ibid.*

Emeraude jaune. Topaze de Sibirie.

Quartz-hyalin jaune. Topaze de Bohême; topaze occidentale.

Quartz-hyalin brun. Topaze enfumée.

Chaux fluatée jaune. Fausse topaze.

REMARKS.

1. Les topazes dites de Saxe, se trouvent à Schiefelkenstein, dans une roche mélangée de quartz, d'argile lithomarge et de la substance même de la topaze. C'est à ce dernier mélange que la roche, selon de Bern (1), doit la faculté de servir à donner le poli aux topazes. La mine de Schlangenberg, en Bohême, fournit aussi des topazes entourées de cristaux d'étain noir et de fer arsenical. Celles qui sont d'un blanc mat

(1) *Geol.*, t. I, p. 77.

ont été pris pour des cristaux de la substance métallique, appelée *gangstène*, et qui est le schédin sulfaté de ce traité.

Les topazes de Sibérie se trouvent à deux endroits différens, situés à une grande distance l'un de l'autre. L'un est dans les Monts Oural, à 25 lieues au nord d'Eccherimbourg. Les topazes y ont pour gangue la variété de granite que l'on a nommée *granite graphique*. Elles sont groupées avec des cristaux de quartz noirâtre, et accompagnent quelquefois les diorites dites *berle* et *algues-marines* de Sibérie. L'autre endroit est une montagne de la Touraie, appelée *Oden-tchéou*, située près du fleuve Amour. Les topazes y sont presque limpides, et quelquefois d'un bleu légèrement verdâtre. Elles ont, en général, la forme de la variété *acrostictique*. On trouve dans une autre partie de la même montagne, des topazes qui sont aussi quelquefois groupées avec des diorites dites *algues-marines*. Elles ont une assez belle transparence jointe à une teinte faible de bleu-verdâtre, excepté à la partie supérieure qui, étant formée d'une matière blanchâtre et opaque, tranché fortement sur le reste du cristal, ce qui a fait donner à ces topazes, dans le pays, le nom de *dent de cheval*. Celles que j'ai vues présentaient la forme de la variété *dissemblée* (1).

(1) Voyez, pour plus amples détails, l'ouvrage *histoire naturelle des minéraux*, par le Cit. Fourn., t. III, p. 19 et suiv.

Quant

Quant aux topases de Sibirie, nous n'avons, jusqu'ici, que peu de connaissances sur leur gisement. Ross de Lide dit qu'elles sont implantées dans des roches argileuses, quelquefois en quantités (1).

2. La topaze des anciens étoit une pierre verte, qui avoit pour pays natal une île de même nom, située dans la Mer Rouge. Ce nom, dérivé d'un mot grec, qui signifioit *chercher une chose*, se poursuivra par conjecture, avoir été donné à l'île dont il s'agit, parce qu'étant inhabitée, elle se faisoit chercher par les navigateurs (2).

3. Le volume et les dimensions des topases sont susceptibles d'une grande variation. Il y en a de très-petites, surtout parmi celles de Sibirie, et d'autres dont l'épaisseur surpasse trois centimètres. Celles du Brésil sont, en général, les plus allongées ; et quelques-unes, telles qu'on nous les apporte, avec leur peigne fracturé dans la partie qui tenoit à la gangue, ont encore quatre ou cinq centimètres dans le sens de leur axe. Le cristal de cette espèce le plus volumineux que j'aie vu, étoit une topaze diaphane d'un bleu-verdâtre, ayant environ 35 millimètres ou 16 lignes en épaisseur et en longueur. Son poids absolu est de 13

(1) Cristal, t. II, p. 435.

(2) Plin., *hist. nat.*, l. XXXVII, c. 8, et Ross de Bos, *gemmae. et lapid. hñ.*, lib. II, c. 62.

décagrammes en 4 onces 2 gros. Le Cte Bräcon , qui en a pris la pesanteur spécifique , la désigne sous le nom d'aigue-marine cristalline , et c'est à elle que se rapporte le synonyme citée plus haut , à l'article des variétés de couleur , N. B. Cette topaze fait partie de la collection du muséum d'histoire naturelle.

4. A juger des topazes du Brésil et de celles de Saxe , d'après les diversités que présente leur aspect , on ne seroit pas tenté de les regarder comme de simples variétés d'une même substance. Aussi plusieurs minéralogistes en ont-ils fait deux espèces séparées. Bonafé de Lisle avoit même cru apercevoir , entre des angles qui se correspondoient sur les cristaux des deux substances , une différence que j'ai trouvée nulle , dans ceux de ces cristaux qui ont une forme nettement prononcée. Le même accord règne entre tous les autres caractères. Il en faut excepter celui de l'électricité par la chaleur , qui manque à la topaze de Saxe. Mais cette propriété , déjà très-faible dans certaines topazes du Brésil , pourroit bien n'être ici qu'une modification accidentelle qui ne fait pas un fond de la substance. J'ajoute que j'ai observé des topazes du Brésil terminées naturellement par une face horizontale , et qui offroient les mêmes variétés de forme que les topazes de Saxe.

La topaze de Sibérie , qui semble être un moyen terme entre les topazes du Brésil et celles de

Saxe, en ce que sa partie supérieure, tantôt se termine en pyramide, comme dans la plupart des premières, et tantôt présente un plan horizontal, comme dans les secondes, partage avec celles du Brésil la propriété de s'électriser par la chaleur. Je remarquai, à ce sujet, qu'il y a de l'inexactitude dans certains auteurs, relativement à l'application de ce nombré, qu'ils refusent aux topazes du Brésil et de Sibirie, pour l'attribuer à celles de Saxe, les seules qui, au contraire, en soient privées.

5. Quant à l'électricité acquise par le frottement, elle est si sensible, surtout dans certaines topazes de Saxe, que le léger frottement exercé par le doigt sur cette substance, lorsqu'on le prend sans attention, suffit pour le disposer à attirer aisément la petite aiguille de cuivre ; et comme chaque fois qu'on la reprend, on renoue sa vertu électrique, on serait tenté de croire qu'elle est dans un état habituel d'électricité. Elle conserve, de plus, cette vertu pendant une demi-heure ou davantage, lorsque le temps est favorable. Il a fallu des précautions pour s'assurer que ces cristaux n'étoient point électrisés par la chaleur.

6. J'ai vu distinctement l'effet de la double réfraction de la topaze, en regardant une ligne ou une épingle tenue horizontalement, à travers une des facettes naturelles *a, a* (fig. 58), et une face artificielle qui remplissoit l'autre verticale opposée,

K k s

ce qui donnoit un angle réfringent de 45° . Mais l'écartement des images ne commençoit à devenir sensible qu'à une distance d'environ quatre travers de doigt. J'ai observé, de plus, que le cas où l'on ne voyoit plus qu'une seule image avoit lieu, lorsque l'une des deux faces qui formoient l'angle réfringent étoit parallèle aux bases P (Fig. 36) de la forme primitive.

9. On assure que la plupart des pierres que l'on débite sous le nom de rubis de Bréfil, ne sont autre chose que des topazes du même pays, que l'on a exposés au feu, pour remplacer, par une teinte plus agréable, le jaune-roussâtre qui étoit leur couleur naturelle. Beaucoup de topazes de Saxe ont le défaut contraire, de ne réfléchir qu'un jaune-pâle et languissant; de sorte qu'en général les pierres taillées de cette espèce de gemme ne sont pas d'un grand prix dans le commerce.

VII. E S P E C E.

É M E R A U D E, c'est-à-dire, corps brillant.

Gemma pellucidissima, duritie quinta, colore viridi in æque permanente; smaragdus, *Waller, t. I, p. 253.* Emeraude du Pérou, de *Lisle, t. II, p. 245.* Chrysolithe du Brésil et algue-marine de Sibérie, *ibid., p. 252.* Emeraude, de *Born, t. I, p. 66.*

Aigue-marine, *Ibid.*, p. 71. Schmaragd, *Essen-
steig.*, t. I, p. 80. Émeraude ou gemme de Berill, *Id.*,
t. I, p. 85. Emerald, *Solagr.*, t. I, p. 261. Aigue-
marine, *Ibid.* Emerald, *Darlington*, *ibid.*, p. 6.
Aigue-marine, *Ibid.* Emerald, *Kewenau*, t. II,
p. 247. Beryl, *Ibid.*, p. 248. L'émeraude, *Des-
camps*, t. I, p. 217. Le berill, *Id.*, p. 220.

Caractère essentiel. Rayant facilement le verre;
divisible parallèlement aux pans et aux bases d'un
prisme hexaèdre régulier.

Caract. phys. Pouss. spécif., 2,7227...2,7766.

Durété. Rayant distinctement le verre, et difficile-
ment le quartz.

Réfraction. Double à un degré médiocre. Le
cas où les images des objets paraissent simples, a
lieu lorsque l'un des deux faces, à travers lesquelles
on les regarde, est perpendiculaire à l'axe de la
forme primitive.

Caract. géom. Forme primitive. Le prisme
hexaèdre régulier (*fig. 43*) pl. *XXV*. Dans les
variétés connues sous les noms de berill et d'aigue-
marine, les joints naturels sont communément plus
sensibles que dans celles qu'on a appelées éme-
raudes.

Molécule intég. Le prisme triangulaire équilatéral (*fig. 44*), dont les pans sont des carrés (1).

Craque, ondulés, brillants.

(1) L'apothème du triangle P de la base est à la hauteur
du prisme comme 1/3 à 2.

Caract. chim. Fusible au chalumeau, en verre blanc un peu écumeux.

Analyse de l'émeraude du Pérou, par Vanquelin (1).

Silice.....	64,50.
Alumine.....	16,00.
Glaucine.....	13,00.
Oxyde de chrome.....	3,25.
Chaux.....	1,50.
Matières volatiles (eau).....	2,00.
	<hr/> 100,25.

Analyse de l'émeraude, dite beril ou aigu-marine de Sibirie, par le même (2).

Silice.....	68.
Alumine.....	15.
Glaucine.....	14.
Chaux.....	5.
Oxyde de fer.....	1.
	<hr/> 103.

Caract. distinctifs. 1°. Entre l'émeraude verte et la tourmaline, dite émeraude du Brésil. Celle-ci est fortement électrique par la chaleur; l'émeraude ne l'est que par le frottement. La pesanteur spécifique de la tourmaline est plus considérable, d. 28

(1) Journal des mines, N°. 38, p. 32.

(2) Idem, N°. 47, p. 263.

le rapport d'environ 8 à 7. La tourmaline a souvent des stries longitudinales qu'on ne voit point sur l'émeraude verte. Sa couleur est moins vive et a quelque chose de sombre. 2°. Entre l'émeraude bleue et la tourmaline de la même teinte. Id., pour l'électricité et la pesanteur spécifique. 3°. Entre l'émeraude verdâtre ou bleue et la chaux phosphatée, connue sous le nom d'apatite. L'émeraude raye le quartz, et l'apatite ne raye pas même le verre. La poussière de celui-ci est phosphorescente sur un charbon ardent, et non celle de l'émeraude. 4°. Entre l'émeraude verdâtre informe et le flux prase. L'émeraude a une cassure ondulée et brillante; celle de la prase est un peu terre et le plus souvent écailleuse : l'émeraude offre des indices de lames, tandis qu'on n'en aperçoit aucun dans la prase. 5°. Entre l'émeraude dite beril et la pyroïte. La pesanteur spécifique du beril est moindre, dans le rapport d'environ 4 à 5. Sa cassure est ondulée et brillante; celle de la pyroïte est compacte et presque terre. Les joints naturels sont, sans comparaison, plus sensibles dans le beril. Celui-ci n'est point facile à rayer avec le couteau comme la pyroïte.

V A R I É T É S.

F O R M E S.

Déterminations.

1. *Emeraude primitive* M P (fig. 43). De *Lille*,

2. *II*, p. 250; var. 1. Les pans sont linéaires sur les cristaux verts, et souvent chargés de stries longitudinales sur ceux qui sont d'un vert-bleuitre, d'un jaune-verdâtre, etc.

3. *Emeraude péridodécédraë*. $\frac{MPG'P}{Mn'P}$ (fig. 45).

De Lisle, t. *II*, p. 254; var. 2. Incidence de *n* sur *M*, 150°.

4. *Emeraude pointée*. $\frac{MP\dot{A}}{MP'}$ (fig. 46). *De Lisle*, t. *II*, p. 254; var. 3. Incidence de *s* sur *P*, 135°.

5. *Emeraude annulaire*. $\frac{MP\dot{B}}{MP'}$ (fig. 47) Incidence de *s* sur *M*, 120°, et sur *P*, 150°.

6. *Emeraude rhombifère*. $\frac{MP\dot{A}\dot{A}}{MP'}$ (fig. 48). De petits rhombes entre les facettes de l'annulaire. Il est remarquable que les facettes *s*, *s* soient de véritables rhombes, plutôt que des trapézoïdes. Ces rhombes ont par accident leur angle obtus de 101° 52' 13", comme dans le chaux carbonaté primitive.

7. *Emeraude annulaire*. $\frac{MP\dot{A}\dot{A}}{MP'}$ (fig. 49). *De Lisle*, t. *II*, p. 257, pl. *IV*, fig. 101. Incidence de *n* sur *M*, 139° 5' 23", et sur *P*, 130° 53' 37".

8. *Emeraude quadrangulaire*. $\frac{MP\dot{B}\dot{B}\dot{A}}{MP'}$ (fig. 50).

DE MINÉRALOGIE. 321

Des hexagones symétriques entre des facettes disposées sur deux rangs autour des bases. Valeur des angles α , α' $124^{\circ} 32' 13''$; et des quatre autres angles, $129^{\circ} 13' 58'' 30'''$.

Indéterminables.

8. *Emeraude cylindroïde*. En prisme arrondi, et chargé de cannelures longitudinales.

9. *Emeraude amorphe*.

ACCIDENS DE LUMIÈRE.

Couleurs.

1. *Emeraude limpide*.

2. *Emeraude verte*. D'un vert très-pur, vulg. *émeraude du Pérou*.

3. *Emeraude vert-blanchâtre*.

4. *Emeraude vert-blendret*. Vulg. *sigar-turcas* ou *beril*.

5. *Emeraude jaune-verdâtre*. *Chrysolithe* de plusieurs naturalistes.

6. *Emeraude vert-jaunâtre*.

7. *Emeraude bleue*.

8. *Emeraude cuivée*. D'un jaune-rouillâtre.

Transparences.

1. *Emeraude transparente*.

2. *Emeraude translucide*.

Substances étrangères à cette espèce, auxquelles on a donné les noms d'émeraude d'ague-marine, de beril, ou des noms analogues à quelques des précédens.

1. La tourmaline verte. *Emeraude du Brésil.*
2. La télaie verte. *Emeraude orientale.*
3. La diopase. *Emeraude de fleur primitive, Journ. de Phys., 1793, p. 134.*
4. La chaux borée verte. *Fausse émeraude; prime d'émeraude.*
5. La même, en octaèdre régulier. *Emeraude norillon; émeraude de Carthage.*
6. Le quartz-agathe prase. *Prime d'émeraude.*
7. La diaspase. *Saussure lui a donné le nom de smaragdite.*
8. La chaux phosphatée, connue sous le nom d'épave Beril.
9. Le quartz verdâtre. *Beril.*
10. Le diaspase. *Beril bleu.*
11. La pyroïte. *Beril schorlact.*
12. La topaze bleu-verdâtre. *Aigue-marine orientale. Brucen, par apogé.*
13. L'épidote. *Schorl aigue-marine. Voyez Saussure, voyage dans les Alpes, t. 1308.*

A N N O T A T I O N S.

1. Les émeraudes reconnues jusqu'ici pour telles dans le commerce, c'est-à-dire, celles qui sont

d'une belle couleur verte $\frac{1}{2}$ venant du Pérou; et parmi les endroits qui en fournissent aujourd'hui le plus abondamment, on désigne la juridiction de Santa-Fé et la vallée de Tunca, entre les montagnes de la nouvelle Grenade et de Potosiyan. Ces émeraudes occupent tantôt des filons défilés qui traversent les roches composées ou les schistes argileux, et tantôt des cavités accidentelles qui interrompent les masses de quelques granites (1). Elles sont quelquefois groupées avec des cristaux de quartz, de feldspath, de mica, etc. Plusieurs ont leur surface parsemée de cristaux de fer sulfuré. On en voit aussi qui sont enveloppées de chaux sulfatée et de chaux carbonatée. Mais Delomieu pense que ces matières sont venues, après coup, occuper les cavités où l'émeraude existoit depuis long-temps (2).

Le même naturaliste a rapporté de Pile d'Elbe un morceau de granite, qui renferme une émeraude lapide ayant la forme de la variété rhomboïdale (3).

A l'égard des cristaux de la même espèce, connus sous les noms de berils ou d'aigues-marines, on les trouve en Daourie, principalement vers le

(1) Delomieu, description de l'émeraude, *mémoires encyclopéd.* ou *journal des sciences, lettres et arts*, t. II, N°. 6, p. 149.

(2) *Ibid.*, p. 150.

(3) *Ibid.*, p. 149.

sommet d'une montagne granitique, nommée Oden-Tchelen, la même que nous avons indiquée comme étant aussi le lieu natal des topazes de Sibérie. Ils y occupent différents filons, dans chacun desquels ils sont distingués par une teinte particulière, soit de vert, soit de jaune-verdâtre, soit de bleu-verdâtre (1).

2. On a découvert dans les montagnes granitiques du Fouta et de la ci-devant Bourgogne, des cristaux en prismes hexaèdres réguliers, que l'on a pris pour des émeraudes. Mais nous n'avons jusqu'ici aucune preuve certaine qu'ils appartiennent à cette espèce, et nous croyons, en conséquence, devoir les renvoyer à l'appendice, dans lequel nous parlerons des substances dont la nature n'est pas encore assez connue pour permettre de les classer.

3. Les anciens ont cité des émeraudes qui avoient jusqu'à dix coudées de longueur. Ils ont parlé de colonnes, de statues colossales, etc., faites d'une seule pierre de cette nature. Ces récits se sont fait du temps où tout ce qui étoit vert, étoit émeraude. Les plus gros cristaux connus chez les modernes sous ce nom, et qui viennent du Pérou, peuvent avoir, au plus, 16 centimètres, ou environ 6 pouces de longueur, sur une épaisseur de 54 millimètres, ou 2 pouces. La plupart des émeraudes sont beaucoup plus petites, et il y en a dont l'épaisseur est à peine d'un millimètre. Le volume des cristaux

(1) Voyez l'Hist. nat. des min. par Parny, t. II, p. 22 et suiv.

de Sibérie, des *aigues-marines* et *berils*, varie entre des limites plus étendues. On en trouve qui sont presque aussi déliés qu'un fil, tandis que d'autres se sont accrus jusqu'à 32 centimètres, ou à peu près un pied de longueur, sur une épaisseur d'un décimètre, ou environ 44 lignes. On observe aussi que ceux surtout d'un petit volume, sont souvent d'une longueur considérable relativement à leur diamètre.

4. Ces mêmes cristaux, appelés *berils* et *aigues-marines*, sont sujets à des accidens singuliers de configuration. À l'aspect de certains prismes, on croit qu'ils ont été cassés en deux tronçons, qui auroient été ensuite mal soudés, de manière à former un croc. D'autres prismes, au lieu d'avoir une face plane à chacune de leurs extrémités, forment en cet endroit, tantôt une saillie arrondie, tantôt une concavité, comme dans les bascules artificielles. Les cristaux qui présentent ces accidens, ont fixé particulièrement l'attention du citoyen Patrin, parmi les différens objets qui ont fourni matière aux observations intéressantes, qui ont été le fruit de son voyage en Sibérie (1).

5. Romé de Lisle est le premier qui ait conçu l'idée de réunir dans une même espèce l'*aigue-marine* de Sibérie avec l'*éméraude*. Il avoit observé la première sous la forme du prisme périodométrique

(1) Voyez l'ouvrage cité plus haut, t. II, p. 25 et 29.

qu'affecte souvent la seconde ; et en combinant cette analogie de forme , qui , par elle-même , n'étoit pas assez décisive (1), avec la dureté et la gravité spécifique , il avoit jugé que les deux substances devoient être identiques. Néanmoins elles ont été , depuis , regardées par tous les minéralogistes comme formant deux espèces distinctes. Je n'avois pas encore été à portée d'en faire une comparaison exacte , lorsqu'ayant aperçu des floettes terminales sur quelques cristaux entrelacés dans un groupe d'argues-mauves de Sibérie , je parvins à en dégager , dont les uns avoient la forme de l'équerre acutulaire , et les autres celle de la rhomboïde. Il résulta de la mesure des angles combinée avec les lois de structure , que les deux substances avoient une molécule semblable , qui étoit le prisme triangulaire équilatéral , ayant pour pans des carrés. Cependant , comme cette forme est la limite des prismes triangulaires , et pouvoit absolument , par cette raison , être commune à différents minéraux , je cherchai un nouveau terme de comparaison dans la réfraction ; mais il se présentoit là un obstacle à la réunion des deux substances , qui , après m'en avoir imposé pendant quelque temps , a produit enfin cet avantage , que les recherches qui ont servi à le lever , ont avancé d'un pas la physique des minéraux.

(1) On trouve beaucoup d'autres minéraux qui se présentent sous cette même forme.

J'avois observé que l'émeraude avoit la double réfraction, et, pour éprouver si l'algue-marine jouissoit de la même propriété, je fis tailler un prisme limpide de cette dernière substance, dans un premier sens perpendiculaire à l'axe, et dans un second incliné sur le même axe d'environ 60°, en sorte que l'angle réfringent étoit de 30°. Ce prisme, exempt de toutes les manières, ne laissoit voir qu'une seule image de chaque objet; et le C^{te} Charles en ayant présenté l'angle réfringent à un rayon de lumière introduit par le trou d'une chambre obscure, le spectre solaire projeté sur un carton blanc, à vingt-cinq pieds de distance, fut également simple. C'est d'après ces observations que j'ai cru pouvoir dire dans l'extrait de mon *Traité de Minéralogie*, que le caractère le plus touché pour distinguer le beril de l'émeraude, consistoit dans sa réfraction, qui étoit simple, au lieu que celle de l'émeraude étoit double (1).

Cependant j'étois toujours frappé de l'accord qui régnoit entre les autres caractères de ces deux minéraux, et qui s'étendoit jusqu'à la ressemblance des formes secondaires; et, enfin, ayant fait réflexion que l'une des deux lices produites artificiellement sur le prisme d'algue-marine, celle qui étoit perpendiculaire à l'axe, avoit une position qui offroit comme la limite de toutes les autres, et

(1) Journ. des min., N^o 28, p. 287.

que les limites aient cette propriété, que certaines quantités devenaient nulles en les atteignant, je soupçonnai que tous les cristaux à double réfraction pourroient bien avoir un sens où ils ne doubleraient pas les images des objets, comme cela avoit lieu par rapport au cristal de roche, d'après les observations du père Bernaria. Je fis donc tailler un second prisme d'aigue-marine, de manière que les deux faces produites artificiellement fussent inclinées à l'axe en même temps qu'elles l'étoient l'une à l'autre, et dès-lors les images des objets vus à travers ce prisme, parurent doubles. Des expériences analogues, faites sur d'autres cristaux, présentèrent des résultats semblables. Ainsi, tous les caractères physiques et géométriques s'accordoient à solliciter entre l'émeraude et l'aigue-marine, un rapprochement auquel je désirais cependant que la chimie devint encore sa sanction (1).

Les premières analyses de l'une et l'autre substance, faites par le citoyen Vauquelin, auroient prouvé que cette restriction étoit non-seulement sage, mais même nécessaire (2). La différence entre les résultats tenoit à ce que ce célèbre chimiste trouvoit dans le boril ou l'aigue-marine une terre

(1) Supplément à l'essai de trait. Journ. des min. , 38^e 33

(2) Voyez le Journ. des min. , N^o. 24 , p. 96 et 97.

d'une

d'une nature jusqu'alors inconnue, que l'émeraude ne lui avait point offerte. Mais ayant recommencé l'analyse de celle-ci, il parvint à y retrouver cette même terre, et consacra ainsi une réunion, qui, pour avoir été tardive, n'en est que mieux cimentée.

Vauquelin, en traitant l'émeraude, avait reconnu que le principe colorant de cette gemme étoit ce même chrome qu'il venoit de découvrir dans le plomb rouge, à l'état d'acide, tandis que, dans l'émeraude, il n'étoit qu'oxyde; et l'on doit remarquer comme une circonstance heureuse, que la première analyse entreprise par ce savant, après celle du plomb rouge, ait doublé, pour lui, le plaisir de la découverte, en lui en offrant de nouveau l'objet sous une forme différente.

6. M. Kirwan dit que le bors devient électrique par le frottement (1), et c'est à quoi l'on devoit s'attendre d'avance; mais il ajoute, ce qui seroit singulier, qu'un des pôles est attractif, tandis que l'autre est répulsif, c'est-à-dire, sans doute, que ces pôles acquièrent des électricités contraires. Je n'y ai pris de toutes les manières, et j'ai constamment observé que les deux pôles avoient l'un et l'autre la même espèce d'électricité, qui étoit viciée ou positive.

7. L'émeraude, inférieure en dureté à plusieurs

(1) *Elements of mineralogy*, t. I, p. 209.

autres gemmes, rubellite et qui lui manque de ce côté, par le charme de sa couleur. Le pourpre éblouissant du rubis, le jaune d'or de la topaze, le bleu céleste du saphir, sont de ces teintes qu'on se plaît à considérer successivement, et dont l'une nous écarte sur les beautés de l'autre. Mais le vert de l'émeraude est la couleur amie de l'œil, celle sur laquelle il semble se fixer, après avoir joué un instant des autres; la seule qui, selon le langage de Pline (1), *le récapitule sans le retarder*; celle qui, enfin, attache si agréablement notre vue sur le fond du tableau risant que nous offre la nature, lorsque la végétation est dans toute sa force. Mais cette perfection est souvent altérée par des glaces, des nuages, etc., qui interrompent ou effaquent la transparence de la pierre; en sorte que les émeraudes d'un beau vert, diaphanes et exemptes de défauts, empruntent un surcroît de prix de leur seule rareté.

La faiblesse et le peu d'agrément des teintes, dans la plupart des émeraudes connues sous les noms de *beril* et d'*aigue-marine*, où le fer est substitué au chrome, comme principe colorant, placent ces variétés, dans l'estime des lapidaires, fort au-dessous des émeraudes vertes; et l'on doit s'attendre que ceux qui se cherchent dans les gemmes que ce qui flatte l'œil, ne conviendront pas seulement que l'émeraude et le beril soient une même chose.

(1) Hist. nat., l. XXXIV, c. 5.

VIII. ESPECE.

EUCLEASE, c'est-à-dire, facile à briser.

Euchat, *Journal des mines*, n°. 28, p. 258.
Euchatus, *Liv., opus. nat., édit. 13*, Lapeire, 1793,
t. III, p. 442. Euchat, *Duboutan, tabl.*, p. 6.

Caractère essentiel. Divisible par deux coupes longitudinales, perpendiculaires entre elles, dont l'une est extrêmement nette.

Caract. phys. Pesant. spécif., 3,0625.

Consistance. Rayant le quartz, et en même temps fragile, et réductible en lames par une légère pression.

Réfraction, double à un degré très-marqué.

Forme géom. Forme primitive, Prisme droit à bases rectangles (*fig. 61*) *pl. XLV*. Les divisions parallèles à T sont d'une extrême netteté, très-éclatantes et très-faciles à obtenir; celles qui répondent à M sont moins nettes, et s'obtiennent plus difficilement. La position des bases n'est que présumée.

Molécule intégrante, 12 (1).

Couleur, transversale, conchoïde.

Caract. chim. Au chalumeau, l'euchat perd

(1) Le rapport entre les trois dimensions B, C, G est celui de $\sqrt{5}$, $\sqrt{12}$ et $\sqrt{5}$.

d'abord sa transparence, ce qui indique la présence d'une certaine quantité d'eau de cristallisation. Elle se fond ensuite en émail blanc.

Analyse par Vauquelin (1).

Silice.....	35 à 36.
Alumine.....	10 à 19.
Glucine.....	14 à 15.
Fer.....	2 à 3.
	<hr/>
	69...73.
Perte....	31...27.

La perte est due en partie à l'eau de cristallisation, et en partie à une autre substance, que l'on soupçonne être un alliage.


Caract. électrostat. 1°. Entre l'écluse et la toge on observe d'abord-mutualité. Celle-ci résiste beaucoup plus à la percussion, et ses divisions se font perpendiculairement à l'axe de ses cristaux, tandis que celles de l'écluse se font dans le sens longitudinal. 2°. Entre la même et la tourmaline du Brésil, Celle-ci est électrique par la chaleur et non l'acier. Elle n'offre aucun point naturel qui soient bien sensibles.

V A R I É T É S.

F O R M E S.

Ecluse surcomposée.	¹ G	¹ G	¹ G	¹ G	¹ G	T
	_s	_f		_A	_T	

(1) Cette analyse a été faite sur une quantité de 56 grains.



(fig. 5a). 78 faces, 14 pour le prisme et 3a pour chacun des deux sommets.

Incidences de *s* sur *s'*, 114° 18'; de *s* sur le pan de retour, 65° 42'; de *s* sur T, 122° 51'.

Incid. de *l* sur *P*, 155° 29'; de *l* sur le pan de retour, 46° 36'; de *l* sur T, 115° 18'.

Incid. de *h* sur *h'*, 149° 52'; de *h* sur le pan de retour, 36° 8'; de *h* sur T, 106° 4'.

Incid. de l'arête *x* sur *e*, 154° 37'; de *e* sur *e'*, 129° 18'.

Incid. de *i* sur *i'*, 99° 40'; de *i* sur T, 130° 10'; de *i* sur *s*, 148° 36'.

Incid. de *u* sur *u'*, 134° 14'; de *u* sur *s*, 144° 54'; de *u* sur *i*, 162° 45'.

Incid. de *r* sur *r'*, 156° 10'; de *r* sur T, 104° 55'; de *r* sur *h*, 142° 38'; de l'arête *x* sur l'arête *e*, 141° 40'.

Incid. de *f* sur *f'*, 106° 18'; de *f* sur T, 196° 54'; de *f* sur *s*, 154° 21'.

Incid. de *d* sur *d'*, 151° 56'; de *d* sur T, 104° 2'; de l'arête *k* sur l'arête *e*, 150° 9'.

Incid. de *o* sur *o'*, 122° 40'; de *o* sur T, 125° 40'.

Incid. de *n* sur *n'*, 145° 10'; de *n* sur T, 108° 15'; de l'arête *y* sur l'arête *e*, 101° 56'.

A C C I D E N S D E L U M I È R E.

*Opacité.**Ecluse verdâtre**Transparence.**Ecluse transparente.*

A N N O T A T I O N S.

1. L'écluse a été rapportée du Pérou par Dombey, et c'est de lui que proviennent tous les cristaux de cette substance qui sont dans différentes collections. Mais ce naturaliste n'avoit conservé aucune note relative à cet objet; et sur les questions que je lui fis avant son départ pour son dernier voyage, il m'avoua qu'il avoit entièrement oublié en quel endroit il avoit fait la découverte dont je lui parlais.

2. Il n'est point de minéral qui soit plus facile à réduire en lames que celui-ci, ni dont les coupes présentent un poli plus vif. Avec des précautions on obtient de ces lames, qui sont d'une grande ténuité, et pourroient seules faire reconnaître la substance dont elles auroient été détachées. Il n'y a guère que le mica et la chaux sulfatée que l'on puisse diviser en lames aussi minces; mais l'élasticité de celles du mica, la faculté qu'ont celles de la chaux sulfatée de se diviser en rhomboïdes, et l'aspect terné et mat que présentent les

bords des ares et des autres, suffiraient pour les faire distinguer de celles de l'euchase, qui se cassent net au lieu de piler, ne donnent point de rhombes par la section, et ont leurs bords luisans et vitreux.

3. Le plus beau cristal d'euchase que j'aie vu, est celui qui se trouve dans la collection du Cit. Dré, et que ce naturaliste a bien voulu me confier, pour en déterminer la structure (1). Il a environ un centimètre d'épaisseur entre les arêtes qui terminent extérieurement les facettes *i*, *p*, sur 6 millimètres entre l'arête *x* et le point opposé. Ce cristal, qui n'est terminé que d'un côté, auroit 78 faces s'il étoit complet, et si de plus ses faces avoient une disposition symétrique. Mais il s'en faut de beaucoup qu'en y remarque cette symétrie, et il y a même quelque chose d'assez singulier dans la manière dont il s'en écarte. Car si l'on partage, par la pensée, la surface de son sommet en deux portions, l'une antérieure et terminée comme celle qui présente la figure, l'autre qui est cachée sous derrière le cristal, on trouve qu'il n'y a aucune des faces situées sur chaque portion qui se répète sur l'autre ; ainsi l'on ne voit d'un côté que les faces

(1) Dans ce cristal, les faces désignées par *T* (*fig. 5a*), sont l'effet d'une fracture. J'ai supposé qu'originellement il y en avoit une même surface qui étoient produites par la cristallisation, parce que j'en ai vu sur d'autres cristaux.

f, f', d, d', e, e' , tandis que les faces $n, n', o, o', i, i', u, u', r, r'$, sont arêtes du côté opposé, en sorte qu'il a fallu doubler le tout, pour résulter à chaque portion de surface ce qui lui manquait, et les rendre semblables l'une à l'autre.

En examinant attentivement les positions respectives de toutes ces diverses facettes, je m'aperçus qu'elles s'élevaient comme par degrés les unes au-dessus des autres, de manière qu'en prenant successivement, d'abord e, e' , puis i, u, r, r', o', p , ensuite f, d, d', f' , et enfin a, u, n', d' , on avoit quatre ordres de facettes. De plus, les arêtes qui joignaient entre elles les facettes d'un même ordre, telles que b, g, s , etc., qui forment la jonction des facettes i, u, r , etc., du second ordre, étoient sensiblement parallèles, d'où je conclus que les décroissemens qui produisoient les facettes de chaque ordre, étant considérés par rapport à la face T (fig. 54), et à son opposée, avoient la même ligne de départ; et comme les arêtes dont il s'agit avoient quatre inclinaisons différentes, en nombre égal à celui des ordres, si l'on supposoit que l'une d'elles, par exemple l'arête s , fût parallèle à la diagonale de T, auquel cas les faces de l'ordre correspondant devoient résulter d'un décroissement ordinaire sur l'angle A de la face T, il falloit que les lignes de départ relatives aux décroissemens qui donnoient les facettes des trois autres ordres, fussent dirigées d'après les lois intermédiaires. Il en est tout au-

tement de la topaze, du péridot, de l'épidote et de plusieurs substances qui ont aussi pour forme primitive un prisme quadrangulaire, et où les arêtes parallèles entre elles ont ordinairement des positions horizontales, et servent à joindre les facettes d'un ordre avec celles de l'ordre suivant; en sorte que d'est presque toujours une loi ordinaire de décroissement, soit sur les bords, soit sur les angles, qui varie d'un ordre à l'autre, par une, deux, trois rangées, etc.

D'après ces observations préliminaires, je supposai que les arêtes parallèles à la diagonale de T (Fig. 51), étoient celles que j'ai déjà indiquées, savoir : δ, g, s , etc., qui appartenaient à l'ordre le plus nombreux. Je supposai de plus, que les pans s, s' résultaient d'un décroissement par une seule rangée sur les arêtes G (Fig. 50); et d'après ces deux hypothèses suffisantes pour déterminer les dimensions de la forme primitive, je cherchai les décroissements qui devoient avoir lieu, pour que les résultats de la théorie s'accordassent avec l'observation. Mais toutes les lois auxquelles je me conduis, relativement aux autres pans du prisme et aux facettes terminales du second ordre se trouvoient réunies, et celles qui déterminent les facettes des autres ordres étoient à la fois intermédiaires et quaternaires; et de quelque manière que je me retournasse, en faisant varier les données fondamentales, je ne pouvois éviter un genre de complication, sans tomber

dans un autre. Ce qui peut cependant faire paraître ces lois-moins extraordinaires, c'est qu'elles rentrent dans les approximations dont j'ai parlé ailleurs, et qui sont telles, que si l'on augmente d'une unité l'un des deux termes de l'exposant fractionnaire, tel que $\frac{1}{2}$, etc., qui accompagne la lettre initiale, le rapport devient tri-suple. On remarquera aussi que les exposans qui concernent les facettes d'un même ordre, comme $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, mesurent des décroissemens qui sont en progression, de sorte qu'il y a, en général, dans la marche du signe, quelque chose de méthodique et de régulier.

Au reste, malgré les tentatives que j'ai faites, pour retourner ce sujet de toutes les manières, la complication que présente le résultat auquel je me suis arrêté, m'empêcha de ne le donner qu'avec réserve. Il se pourroit que le véritable fil, pour sortir de cette espèce de dédale, m'eût échappé, et peut-être qu'entre des mains plus heureuses, le signe représentatif du cristal prendra une expression plus simple et plus conforme à la marche des décroissemens ordinaires.

4. Quoique l'acchase soit resté long-temps sans être analysé, j'ai toujours été persuadé qu'elle devoit former une espèce à part. L'analyse que Yauquelin en a faite récemment, et pour laquelle il eut désiré pouvoir se procurer une plus grande quantité de cette substance, lui a offert de nouveau la glucyne mais avec la silice et l'alumine,

comme dans l'émeraude. Mais la proportion de silice y est beaucoup plus forte. On a vu d'ailleurs, que cette analyse avoit laissé un déficit de 27 à 31 pour 100, qui doit être attribué, au moins en grande partie, à un principe volatil ; et c'est sans doute la combinaison de ce principe avec les trois autres qui influe le plus dans la différence très-marquée entre les deux substances, relativement à la figure des molécules intégrantes, qui sont d'une part des prismes triangulaires équilatéraux, et de l'autre des prismes à bases rectangles.

5. La double réfraction de l'eschase est une des plus fortes qui aî lieu dans les substances terreuses. Je l'ai observée, en regardant une épingle située horizontalement, à travers un des pans T (Fig. 5a), qui sont dans le sens des joints les plus nets, et une ficette artificielle qui remplaçoit le pan opposé, en s'inclinant d'environ 20° vers le premier, de manière que son arête de jonction avec celui-ci, étoit perpendiculaire à l'axe du cristal.

6. La grande facilité avec laquelle l'eschase se divise, s'oppose à ce qu'elle puisse être travaillée, comme objet d'ornement. Du reste, cette substance prend bien le poli. Elle est d'un vert assez agréable, quoique peu intense. Tous les morceaux que j'ai vus avoient une belle transparence, et étoient exempts de grains et de nuages. Ces différentes qualités, jointes à une forme cristalline qui a quelques rapports avec celles de la topaze, du péri-

des, etc., semblent, au premier aspect, annoncer une véritable gemme, dans le sens que les artistes attachent à ce mot; et l'on est étonné de l'excessive fragilité qui rend cette apparence si trompeuse.

IX. E S P È C E.

GRENAT, c'est-à-dire, qui a la couleur des grains de grenade.

Grenatus, *Waller*, t. I, p. 282 et suiv. Grenat, de *Lisle*, t. II, p. 366. *Id.*, de *Born*, t. I, p. 147. Grenat, *Könnerling*, t. I, p. 43, et t. III, p. 276 et suiv. Grenat, *Seiogr.*, t. I, p. 272. *Id.*, *Danbourn*, tabl., p. 5. Garnet, *Kirwan*, t. I, p. 238. Le grenat, *Brachant*, t. I, p. 193.

Caractère essentiel. Peu spicif., au moins de 5,5. Formes dérivées du dodécèdre rhomboïdal.

Caract. phys. Poussé spicif., 3,5578 ... 4,1888.

Durcè. Rayant le quartz.

Réfraction, simple.

Caract. géom. Forme primitive. Le dodécèdre rhomboïdal (fig. 53) pd. $XLPI$. Les joints naturels ne sont sensibles que dans certains cristaux.

Molécule intégrante. Le tétraèdre à faces triangulaires isocèles, égales et semblables (fig. 55).

Molécule soustractive. Le rhomboïde obtus, dont

les angles plans sont de $109^{\circ} 20' 16''$, et $78^{\circ} 31' 44''$ (1).

Caract. chim. Fusible au chalumeau.

Analyses :

1°. Du grenat de Bohême, par Klaproth; (*pes. spécif.*, 3,718).

Silice.....	40,00.
Alumine.....	28,50.
Chaux.....	3,50.
Magnésie.....	10,00.
Oxyde de fer.....	16,50.
Oxyde de manganèse.....	0,25.
Perte.....	1,25.
	<hr/>
	100,00 (2).

2°. Du grenat oriental ou de Syrie, par le même; (*pes. spécif.*, 4,085).

Silice.....	35,75.
Alumine.....	27,25.
Oxyde de fer.....	36,00.
Oxyde de manganèse.....	0,25.
Perte.....	0,75.
	<hr/>
	100,00 (3).

(1) Le rapport entre les diagonales est celui de $\sqrt{2}$ à 1.

(2) *Ann. de phys.*, *mem.*, 1798, p. 269. C'est par erreur que cette analyse a été citée, depuis, dans le même journal (*placides*, *vol. II*, p. 34) comme étant celle de la substance de Klaproth.

(3) *Ibid.*, p. 272.

3°. D'un grenat rouge, transparent, trapézoïdal, venant de Bohême, par Vauquelin; (pes. spécif., 4,1554).

Silice.....	56.
Alumine.....	12.
Chaux.....	3.
Oxyde de fer.....	41.
	<u>112.</u>

4°. D'un grenat rouge du Pic d'Eaux-Lids, en petits cristaux dodécédriques, par le même.

Silice.....	52,0.
Alumine.....	20,0.
Carbonate de chaux, 14 grains, et qui fait à peu près de chaux.....	7,7.
Oxyde de fer.....	17,0.
Perte.....	3,3.
	<u>100,0</u> (1).

5°. D'un grenat noir du même endroit, en petits cristaux dodécédriques, par le même.

Silice.....	43.
Alumine.....	16.
Chaux.....	20.
Oxyde de fer.....	16.
Eau de maitre volatile.....	4.
Perte.....	1.
	<u>100</u> (2).

(1) *Journ. des mines*, N°. 44, p. 576.

(2) *Ibid*, p. 573.

6°. D'un grenat jaune anacrophes, de Corse, par le même; (pes. spécif., 3,5578).

Silice.....	28.
Alumine.....	20.
Chaux.....	51.
Oxyde de fer.....	10.
Perte.....	1.
	<hr/>
	100.

7°. Du grenat noir émergié de Freatelli, (mélange de Klaproth), par le même; (pes. spécif., 3,7916).

Silice.....	34,8.
Alumine.....	6,4.
Chaux.....	33,9.
Oxyde de fer.....	25,5.
Perte.....	1,1.
	<hr/>
	100,0 (1).

Caract. distinct. 1°. Entre le grenat et le stéaroc, l'un et l'autre dodécaèdres. Dans le grenat, toutes les incidences des faces l'une sur l'autre, sont de 120°. Dans le stéaroc, les unes sont de 124° 12', et les autres de 117° 54'. 2°. Entre le même et l'amphibole dodécaèdre. Le prisme de celui-ci a deux angles saillans d'environ 124° $\frac{1}{2}$, et les quatre autres de 117° 12'; il se divise par des coupes transversales parallèles aux pans les plus inclinés; dans le

(1) Journ. de phys., chimie, an 8, p. 37.

grenat, toutes les incidences sont de 120° , et les divisions sont peu sensibles. 3°. Entre le grenat et la staurolite uniaxiale. Le prisme de celle-ci a deux angles aigus de $120^\circ \frac{1}{2}$, et les quatre autres de $115^\circ \frac{1}{2}$; et les sommets ont deux faces obliques et une horizontale; dans le grenat, le prisme est régulier, et les sommets ont trois faces obliques. 4°. Entre le grenat trapézoïdal et l'amphigène. Celui-ci est infusible au chalumeau, et le grenat fusible; le pesantier spécifique de l'amphigène est moindre, dans le rapport de 2 à 3. 5°. Entre le grenat taillé et d'autres gemmes rouges, telles que la télaie et le spinelle. Le rouge du grenat a une teinte sombre, dont celui de la télaie et celui du spinelle sont exempts.

V A R I É T É S.

F O R M E S.

Déterminables.

1. Grenat primitif. P (Fig. 53). De Lisle, t. II, p. 322; var. 1. Incidences de chaque rhomboïde sur les deux adjacens, 120° . Angles plans, $120^\circ 15'$ 15° ; $70^\circ 51'$ $44''$.

a. Allongé. Cet allongement se fait dans le sens d'un axe qui passeroit par deux angles solides opposés, formés de trois plans, tels que σ et α (Fig. 54). Dans ce cas, les faces latérales $\sigma\gamma$, $\alpha\gamma$, etc., sont des parallélogrammes obliques, tandis que celles

celles des sommets conservent la figure du rhombe.

Le dodécaèdre rhomboédral, considéré comme forme primitive, présente en des résultats les plus remarquables de la théorie relative à la structure des cristaux, soit que l'on considère la simplicité des molécules intégrantes dont il est l'assemblage, ou le manière dont ces molécules, par leur arrangement, produisent les molécules constructives.

Soit $l\ g$ (Fig. 54) le même dodécaèdre que fig. 53. Supposons que ce solide soit divisé parallèlement à ses différentes faces, et faisons passer, pour plus grande simplicité, les coupes par le centre. L'une de ces coupes, par exemple, celle qui est parallèle à egx et à phx , passera par les six points l, o, t, q, u, g , c'est-à-dire, qu'elle coïncidera tantôt avec une arête telle que lo , tantôt avec une petite diagonale, telle que celle qui va de o en t , etc. Il en sera de même de toute autre coupe, d'où il suit que le dodécaèdre se trouverait coupé sur toutes ses arêtes, et sur toutes les petites diagonales de ses rhombes, ou, ce qui revient au même, les coupes circonscriraient sur chaque rhombe deux triangles isocèles, qui seraient les moitiés de ce rhombe. Or, il y a douze rhombes. Donc les coupes partageront la surface en vingt-quatre triangles isocèles. Mais les mêmes coupes passent aussi par le centre. Donc elles subdiviseront le dodécaèdre en vingt-quatre tétraèdres ou pyramides triangulaires, dont les bases seront les

moitiés des rhombes, et dont les sommets coïncideront avec le centre. Ces tétraèdres représentent la molécule intégrale. On voit séparément (fig. 53) celui dont la base est répond au triangle indiqué par les mêmes points (fig. 54).

Remarquez que le dodécèdre peut être envisagé aussi comme étant composé de quatre rhomboïdes égaux et semblables, dont chacun a l'un de ses sommets situé à l'extérieur, et l'autre à l'intérieur du centre. Par exemple, le sommet extérieur d'un des rhomboïdes sera en *e*, et les trois rhombes qui lui appartiennent seront *deo*, *pde*, *soe*. On concevra de même, qu'il y a un second sommet en *y*, un troisième en *a*, et un quatrième en *g*. Chacun de ces rhomboïdes sera composé de six tétraèdres réunis par leur faces, comme dans celui qui a été cité (t. I, p. 29); et la géométrie fait voir que dans le cas présent, les quatre faces de chaque tétraèdre sont des triangles isocèles, égaux et semblables (1).

Les développemens qui donnent les formes secondaires, ont lieu par des rangées de petits rhomboïdes, dont chacun est aussi l'assemblage de six petits tétraèdres, ou de six molécules intégrales, (t. I, p. 28).

a. *Grenat trapézoïdal* $\begin{matrix} \cdot \\ \text{B} \\ \cdot \\ \text{B} \end{matrix}$ (fig. 56). Vingt-quatre

(1) C'est une suite de ce que l'un des rhomboïdes est égal à chacun de ses autres. Voyez la partie géométrique.

trapézoïdes égaux et semblables. *De Lisle*, t. II, p. 327. Incidence de n sur n , ou de n' sur n' , $151^{\circ} 48' 36''$; de n sur n' , $146^{\circ} 26' 33''$. Les stries dont les trapézoïdes sont souvent sillonnées dans le sens de leurs grandes diagonales, indiquent à l'œil la série des rhombes décroissans qui s'élevait au-dessus des différentes faces du noyau.

3. Grenat *émarginé*.
$$\begin{array}{c} P \\ \frac{B}{n} \end{array}$$
 (*fig. 57*). Trente-six

faces, savoir : 12 rhombes et 24 hexagones alongés. *De Lisle*, t. II, p. 324 et suiv.; var. 2 et 3. Incidence de n ou de n' sur P , 150° . Dans certains cristaux, et en particulier dans les grenats vendétiens de Sibérie, les rhombes P sont beaucoup plus petits que les hexagones n .

4. Grenat *trisémarginé*.
$$\begin{array}{c} P \\ \frac{B}{n} \end{array} \begin{array}{c} B \\ \frac{n}{x} \end{array}$$
 (*fig. 58*). La va-

riété précédente augmentée de quarante-huit facettes comprises entre les rhombes et les hexagones. Hyacinthe de Diéville, dans les Grisons, Savanne, se trouve dans les Alpes, n^o. 1902 et suiv. (1). On

(1) On a peine à reconnaître la forme dans il s'agit ici dans la description que ce célèbre naturaliste a donnée de son hyacinthe de Diéville, dans la cristallisation lui a paru avoir plus de l'analogie avec celle de l'hyacinthe du Vercors, (connue de ce Traité) Mais le Cit. Cordier, ingénieur des mines, a eu occasion, dans le cours de ses voya-

trouve aussi de ces cristaux, qui sont semblables à la troisième variété. Incidence de r sur P , $160^{\circ} 55' 36''$; de r sur n , $163^{\circ} 6' 24''$. J'ai un groupe de cristaux bruns opaques, de cette variété, qui reposent sur une roche ferrugineuse, remplie de la substance des mêmes cristaux. Il m'a été donné par le Cit. Hensenitz, qui l'avoit trouvé en Hongrie, dans le banat de Temeswar.

3. Quartz uniternaire. $\begin{matrix} P & B & E' \\ P & n & c \end{matrix}$ (Fig. 56). La va-

riété 3, dans laquelle les arêtes a parallèles aux angles aigus des rhombes P (Fig. 57) sont interceptées par des facettes droites, ce qui fait en tout six faces. Incidence de r sur n' , $155^{\circ} 54' 48''$. J'ai cette variété en cristaux bruns, avec des cristaux en dodécèdres primitifs, d'un jaune verdâtre, situés sur la partie opposée du même morceau, ce qui semble prouver que la modification de forme qu'ont subie les cristaux bruns, est due à l'influence de leur matière colorante sur l'affinité des molécules. Ce groupe intéressant est encore au présent du Cit. Hensenitz, qui l'avoit trouvé dans le même endroit.

ga, de l'aveu que la substance décrite par Boussier ressembloit au quartz triangulaire ou à celui qui est simplement élargi.

Indéterminables.

6. *Grenat sphéroïdal*. La variété a, dans laquelle les faces sont devenues curvilignes, par l'effet d'une cristallisation précipitée.

7. *Grenat amorphe*.

ACCIDENS DE LUMIÈRE.

Couleurs.

1. *Grenat rouge de coquelicot*. Grenat de Bohême. *Escherling, t. III, p. 246*.

2. *Grenat rouge-foncé jaunâtre*. Grenat syrien, suivant Boece (1).

3. *Grenat sermoit*. Vermelle des lapidaires.

4. *Grenat violet-pourpre*. Grenat syrien ocellaire (2).

5. *Grenat rouge-orangé*. Grenat-hyacinthe, hyacinthe la belle des Italiens (3).

6. *Grenat jaunâtre*.

7. *Grenat verdâtre*.

8. *Grenat brun*. On l'a appelé *grenat d'étain*, peut-être à cause de la ressemblance de sa couleur avec celle des cristaux d'étain oxydé qu'il accompagne quelquefois (4).

(1) Gemmar. de lapid. lib. II, cap. 24.

(2) Mercure indien, lib. II, ch. 17.

(3) Boece, *ibid.*

(4) De Lide, t. II, p. 248, note 20.

9. Grenat blanchâtre.

10. Grenat noir.

11. Grenat noir de Frascati, aux environs de Rome, ordinairement émarginé. Mûssé de Klaproth. *Id.*, Karsen, *minéral tabellén*, p.

Transparence.

1. Grenat transparent.

2. Grenat translucide. Presque tous les grenats qui ont une certaine épaisseur.

3. Grenat opaque. Les cristaux bruns et noirs.

Substances étrangères à l'opale du grenat, auxquelles on a donné son nom.

1. Grenat du Pay. Le siron de France.

2. Grenat blanc, et grenat volcanique. L'ampélite.

3. Grenats d'étoile. On a ainsi appelé de ce nom, les cristaux mêmes d'étoile bruns (1).

A N N O T A T I O N S.

1. On trouve des grenats dans une infinité d'endroits, parmi lesquels la Bohême tient un rang distingué, à cause de la perfection de ceux qu'elle fournit. Les cristaux de cette substance ont une multitude de gangues différentes qui appartiennent aux terrains primitifs. Telles sont le quartz, le feldspath, les serpentières, le talc, le mica, l'amiboite,

(1) Mûssé, *pyritol*, *minéral. deup.*, p. 179.

même la chaux carbonatée, etc. Il y a de ces cristaux entièrement recouverts de tale verdâtre, dont les lames se sont moules sur leur superficie. Le grenat abonde tellement dans certaines roches, qu'il peut en être regardé comme la base. On en rencontre aussi au Vézère et ailleurs, dans des matières qui ont été rejetées par l'action des volcans. Enfin, les grenats accompagnent quelquefois les substances métalliques. Il y en a qui sont engagés dans du fer sulfuré. Quelques-uns ont des parcelles d'ur attachées à leur superficie (1).

2. Le fer paroît avoir une forte tendance pour s'unir avec le grenat. Baudé de Lisle a cité des grenats opaques qui rendoient depuis huit jusqu'à trente livres de fer par quintal (2). Ainsi les exploite-t-on dans plusieurs endroits, comme mines de ce métal. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est l'abondance du fer dans certains grenats, où il ne paroîtroit faire que la fonction de principe colorant, à en juger par la transparence et l'aspect homogène de ces corps. Dans les grenats trépassés analysés par Vauquelin, et qui jouissoient de ces qualités, le fer s'est trouvé dans la proportion de 41 pour 100, c'est-à-dire, qu'il formoit un peu plus des deux cinquièmes de la masse.

Cette quantité considérable de fer que les gre-

(1) Lehmann, traité de la formation des métaux.

(2) T. II, p. 308.

nats s'approprient , renferme souvent des molécules à l'état métallique , ainsi qu'on peut en juger par l'action que ces corps exercent sur le barreau aimanté ; et ce qui offre un nouveau sujet de surprise , c'est de voir les grenats qu'on appelle *oreux* , c'est-à-dire , les plus disséminés et les plus purs , manifester un magnétisme très-sensibile (1).

3. Le diamètre des grenats varie entre des limites très-étendues. Il y en a depuis la grosseur d'une tête d'épingle , jusqu'à celle du poing fermé , et au-delà. Ces derniers ont ordinairement la forme du dodécaèdre primitif , et l'on en voit dans les collections minéralogiques , qui ont été poli sur toutes leurs faces et dégagés de la croûte talqueuse qui les enveloppoit.

4. Hill conjecture , avec fondement , que notre grenat étoit l'*escarboucle* ou le *carbunculus* des anciens , ainsi nommé , parce que sa couleur , exposé aux rayons du soleil , tiroit sur le rouge de feu , ce qui donnoit à la pierre l'aspect d'un charbon ardent (2). Pline dit que les escarboucles répandoient une flamme tantôt plus claire , et tantôt plus obscure (3) ; qu'on estimoit surtout ceux dont l'éclat

(1) *Bismuth* , *Voyages dans les Alpes* , N^o 84.

(2) *Commentaire sur le traité des pierres de Théophraste* , traduit , p. 60.

(3) *Hist. nat.* , l. XXXVII , c. 7.

se terminoit en un violet d'apophyste : il ajoute qu'on faisoit avec ceux des Indes, des vases dont la capacité étoit égale à celle d'un septier (1). Ces détails et d'autres que nous omettons, pour abrégér, paroissent convenir plutôt au grenat qu'à toute autre pierre.

5. Parmi les cristaux qui ont été regardés comme des grenats, ceux qu'on appelloit *grenats blancs* ou *grenats volcanisés*, forment aujourd'hui, d'après les analyses de Klaproth et de Vauquelin, une espèce distincte, à laquelle on a donné le nom de *leucite* (corps blanc), que j'ai changé en celui d'*amphigène*. J'ai cru devoir laisser constant, pour le moment, tous les autres cristaux reconnus anciennement comme grenats, c'est-à-dire, ceux qui ont une pesanteur spécifique d'environ 3,5, et une forme originaire du dodécèdre rhomboïdal. Ils sont encore distingués par leur fusibilité au chalumeau. Je conviens néanmoins que la réunion de ces caractères ne détermine pas une espèce d'une manière assez précise. La forme primitive, en particulier, laisse subsister ici une cause d'ambiguïté, en ce qu'elle est du nombre de celles qui, à raison de leur symétrie, sont communes à des minéraux de diverse nature.

D'une autre part, si l'on consulte les sept an-

(1) Cette mesure revient à peu près à se contenter de six chopines.

lyses citées plus haut , faites par deux hommes qui jouissent , à cet égard , d'une grande célébrité , on trouvera des différences qui semblent en indiquer une dans la composition des substances elles-mêmes. Les seules dont les résultats ayent une ressemblance marquée , sont celle du grenat oriental par Klaproth , et celle du grenat trapézoïdal par Vauquelin ; seulement la première donne trois de chaux pour cent , tandis que ce principe est nul dans la seconde.

La mélanse ou le grenat noir mérite ici une attention particulière. M. Népoux nous apprend (1) que Klaproth avoit séparé cette substance du grenat ; à la vérité il ne cite point l'analyse qui , sans doute , avoit donné lieu à cette séparation ; mais le résultat obtenu par Vauquelin sur des cristaux qui étoient bien décidément des grenats noirs de Frascati , semble suppléer à ce silence , et justifier l'opinion du célèbre chimiste de Berlin , par la différence notable qu'il offre entre les proportions des principes de cette pierre comparés à ceux du grenat trapézoïdal , traité par le même main , ou du grenat oriental , sur lequel Klaproth a opéré.

Je ne sais cependant si nous aurons en présent de faire , dans l'esprit du grenat , la réforme que sollicitent les analyses dont il s'agit. Il seroit peut-être à désirer que l'on les répût , avant de

(1) Journ. de phys. , ann. , 1758 , p. 402.

rien innover. Je ne puis me défendre, à cet égard, d'un léger doute, fondé sur ce que ces analyses, au nombre de sept, ont donné des résultats dont deux seulement se rapprochent; en sorte qu'elles pourroient paroître prouver trop, puisqu'il s'ensuivroit que sur les sept substances analysées, et qui ne forment qu'une partie des anciens grenats, il y en a déjà six qui constituent autant d'espèces particulières.

En un mot, quoiqu'on ne puisse guère douter, dès maintenant, que les naturalistes n'aient placé trop légèrement certains corps dans l'espèce du grenat, d'après la seule indication de la forme extérieure, qui n'est pas décisive dans le cas présent; il me semble que nos connaissances, sur cet objet, ne sont pas assez avancées, pour qu'en essayant de rectifier des rapprochemens déjà faits, nous puissions nous promettre de ne tracer aucune fausse ligne de séparation (1).

(1) Une lettre de M. Schöper au Cit. Lamethrie, insérée dans le journal de physique du mois venant, au p. p. 178 et suivans, nous apprend que le célèbre Werner regarde aujourd'hui le grenat grenatiforme de Bohême, comme une espèce particulière, qu'il a nommée *pyrop*, et qui diffère du grenat ordinaire, principalement par la couleur, le défaut de cristallisation, et par sa transparence. Mais je ne suis ni la distinction qu'établit ici M. Werner entre les deux grenats, en raisonnant seulement d'après ces différences, qui ne me paroissent pas incompatibles avec l'identité d'espèce.

6. Au reste, quoique la forme du dodécaèdre rhomboïdal ne soit pas, comme tant d'autres, représentative d'une espèce déterminée, il ne faut pas en conclure qu'on ne puisse généralement en tirer aucun avantage pour la distinction des minéraux. Cette forme, qui est primitive dans le grenat, devient secondaire dans le charbon fossile, où elle a pour noyau un octaèdre régulier, et dans un autre minéral qui sera cité à l'article des substances d'une nature encore douteuse, où elle paraît dériver du cube. D'une autre part, le schiste à 24 trapézoïdes qui, dans l'espèce dont il s'agit ici, est originaire du dodécaèdre, dépend d'un cube dans l'aukine, d'un octaèdre dans le fer sulfuré, et présente dans l'amphigène une structure mixte qui se rapporte en même temps au cube et au dodécaèdre rhomboïdal. Ces diverses transformations, déjà remarquables en théorie, peuvent nous aider de plus, à débrouiller, au moins en partie, la confusion apparente qui naît de la considération abstraite des formes extérieures.

7. Le dodécaèdre rhomboïdal peut être considéré comme un solide prismatique, ayant six rhombes latéraux, inclinés entre eux, comme ceux d'un prisme hexaèdre régulier, avec deux sommets composés chacun de trois rhombes. Diverses autres substances, telles que l'amphibole, le diopase, la chaux carbonatée, etc., présentent une forme analogue, avec des mesures d'angles différentes.

Or, parmi une infinité de dodécèdres possibles, qui rentreroient dans cette même forme, le dodécèdre du grenat, dont les pans et les faces terminales sont des rhombes égaux et semblables, est celui qui, à capacité égale, donne le minimum de surface.

Cette observation nous conduit à un rapprochement qui m'a paru intéressant, entre la forme dont il s'agit ici et celle des abeilles de cire que construisent les abeilles. Chacune de ces abeilles a pour base un hexagone régulier $g'h'e'q'y'r'$ (Fig. 60), sur les côtés duquel s'élèvent verticalement 6 trapèzes $sur'q'$, $stq'y'$, etc., couronnés par trois rhombes aru , axp , ayl .

Ayant mené les diagonales de , ae , be , concevons que les trois rhombes, en restant fixes par les points s , a , b , s'inclinent dans un sens ou dans l'autre, en se balançant sur les diagonales; de sorte que le sommet e s'élève ou s'abaisse, en même temps que les points t , p , r s'abaissent ou s'élèvent par des mouvements contraires.

Pendant tous ces changements de position, la capacité de l'abeille restera la même, c'est-à-dire, qu'autant elle diminuera dans la partie située entre les diagonales et le sommet e , par l'abaissement de ce même sommet, autant elle croîtra dans les parties situées vers les points t , p , r par l'élévation de ces points, et réciproquement; mais la surface variera constamment, et cela de ma-

nière qu'elle les en diminue jusqu'à une certaine limite, passé laquelle elle commencera à croître. Or, cette limite, qui donne le minimum de surface, a lieu lorsque les rhombes des sommets ont leurs angles de $105^{\circ} 58' 16''$, et de $70^{\circ} 31' 44''$, comme dans le grenat et dans l'alvéole des abeilles, ou, ce qui revient au même, lorsque toutes les inclinaisons des faces voisines sont de 120° ; il en résulte, dans le travail des abeilles, une double économie, et de temps et de matière. Bézout proposa autrefois ce problème à Kœnig, et fut flatté de voir que le géomètre eût été conduit, par ses calculs, au résultat des abeilles.

Nous avons supposé que les lignes xy' , xz' , yz' étoient d'une longueur donnée, puisque les points a , a' , f sont censés immobiles. Mais si l'on conçoit que le solide varie à la fois dans toutes ses dimensions, en conservant toujours la même capacité, on trouve que le minimum de surface a lieu, lorsque les angles des sommets sont toujours de $105^{\circ} 58' 16''$, le solide est semblable à la moitié d'un dodécèdre rhomboïdal, que l'on auroit coupé transversalement par un plan perpendiculaire à l'axe qui va de o en a (Fig. 54). L'alvéole des abeilles a une hauteur beaucoup plus considérable, ou égale à son épaisseur. Mais cette dimension est assortie aux usages de ces alvéoles, qui ne sont pas seulement destinés à recevoir le miel, mais encore à servir de logement aux abeilles nouvellement

éclairs , jusqu'à ce que leur développement soit achevé (1).

Il. Le grenat d'un rouge mêlé de violet , appelé *grenat syrien* , et celui qui est d'un beau rouge de coquelicot , sont les plus estimés dans le commerce. Le rouge des derniers est si intense , que si on les taillait à facettes , ils en paroitraient presque noirs. On les arrondit en dessus , et on les élève , c'est-à-dire , qu'on les creuse par dessous , afin que les reflets de leur riche couleur puissent se dégager , et s'étaler avec plus de liberté. En général , le rouge des grenats est sujet à être effacé par une lente usure qui provient de la grande quantité de fer que renferme cette espèce de gemme. L'auteur de l'article diamantaire , *Encyclopédie méthodique* (2), dit qu'un beau grenat syrien est estimé au même prix que le saфир , qui est notre térian blanc.

IV^e E S P È C E.

AMPHIGÈNE, c'est-à-dire , qui a une double origine.

Grenats d'un blanc cristallin , de *Liole* , s. H , p. 336. Grenats décolorés , *ibid.* Grenats du Vi-

(1) Muraké , observ. sur les pierres , mêm. de l'Académie des Sciences , 1712.

(2) Art et Mèt. , t. II , 1^{re} part. , p. 216.

sive, de Pampis, etc., *Faujas, minéralogie des volcans*, p. 205. Grenats d'un blanc mat, demi-transparens, à 24 facettes, de Bern, *t. I*, p. 436. Lesclife ou grenat blanc, *jour. des mines*, N^o. 27, p. 177 et suiv. Leuzit, *Ersmardg*, *t. I*, p. 55. Grenats blancs, *Solagr.*, *t. I*, p. 276. Grenatite, *Isaïe*, *Daubenton, tabl.*, p. 6. La leuzite, *Brochant*, *t. I*, p. 288 (1).

Caractère essentiel. Divisible parallèlement aux faces d'un cube, et en même temps à celles d'un dodécèdre rhomboïdal (2).

Caract. phys. Pesant. spécif., 3,4684.

Durété. Rayant difficilement le verre.

Réfraction, simple.

Caract. géom. Forme primitive. Le cube (*fig. 61*) *pl. XXXI*, divisible diagonalement suivant des plans qui passent par les arêtes et par le centre. Les joints naturels sont sensibles par le chatoye-

(1) M. Kewen indique le nom de *Pheviat*, qui est celui que Werner a donné à cette substance, comme synonyme de *schnee garnet* (grenat blanc). La description qu'il fait de la substance à laquelle il applique ces deux dénominations, coïncide à l'empyrique, excepté que, selon lui, cette substance se présente sous la forme de cristaux à 24, 36, 24, 36 ou même 56 faces. J'ai observé une très-grande quantité d'amphigènes de différens pays, dont aucun n'avoit ni plus ni moins de 24 faces. *Kewen*, *t. I*, p. 285.

(2) C'est de cette double division mécanique qu'a été tiré le nom d'*amphigène*.

ment, à une lumière un peu vive. Ceux qui ont lieu parallèlement aux faces du cube s'aperçoivent plus aisément que les autres.

Molécule intégr. Tétrédres irréguliers.

Molécule constructive. Le cube.

Cassure, raboteuse, quelquefois légèrement conchôïde, avec un certain luisant.

Caract. chim. Indissol. au chauxon.

Analysé par Klaproth. "

Silice 53 à 54.

Alumine 34 à 35.

Potasse 20 à 22.

Caractères distinctifs. 1°. Entre l'amphigène et le grenat trapézoïdal. Celui-ci raye le quartz; l'amphigène raye à peine le verre. La pesanteur spécifique du grenat est plus grande, dans le rapport d'environ 3 à 2. Il est fusible au chauxon, et non pas l'amphigène. Jusqu'ici, tous les grenats observés avoient des couleurs plus ou moins relevées. Les amphigènes n'ont qu'une teinte blanchâtre ou d'un jaune sale. 2°. Entre l'amphigène et l'andaine trapézoïdal. Celui-ci n'offre point de lames parallèles aux faces d'un dodécèdre rhomboidal, comme dans l'amphigène. Il est fusible, au chauxon, en verre transparent; l'amphigène résiste à la fusion.

Déterminations.

1. *Amphigène trapézoïdal* \hat{A} (fig. 6a). Vingt-quatre trapézoïdes égaux et semblables. Incidences de g sur g , $131^{\circ} 48' 36''$; de g sur g' , ou de g' sur g' , $146^{\circ} 56' 32''$. Angles de l'un quelconque Lados des trapézoïdes, $L = 78^{\circ} 27' 46''$; $D = 117^{\circ} 2' 48''$; m ou $n = 82^{\circ} 15' 3''$. On voit souvent à la surface du cristal des espèces de lignes parallèles à la petite diagonale, ou à celle qui va de u en m , de m en r , etc.

L'examen de la structure de cette variété, la seule régulière que l'amphigène ait offerte jusqu'ici, m'a conduit à un résultat remarquable, qui exige un certain développement. J'ai trouvé que cette structure étoit du nombre de celles qui s'appliquent à deux formes péloïdiques différentes, lesquelles sont, dans le cas présent, le dodécèdre rhomboïdal et le cube.

À l'égard de la première, on l'extrait par les mêmes coupes que celles qui ont lieu dans le grenat trapézoïdal (voyez ci-dessus p. 546), c'est-à-dire, qu'il faut faire passer les plans coupans, l'un par les points D, L, O, E, un second par les points L, O, H, G, etc., qui répondent aux angles solides du dodécèdre, ainsi qu'on s'en con-

visera par la comparaison de la fig. 62 avec la fig. 64, *pl. XLV^e II*, qui représente le dodécèdre dont il s'agit.

Dans autre part, l'amphigène trapézoïdal est divisible par des plans tels que *sewx* (fig. 63), qui passent par les angles solides composés de quatre angles plans. C'est dans ce même sens que sont situées les fibres dont nous avons parlé plus haut. Si l'on continue de scier parallèlement au plan *sewx*, qui est véritablement un carré, la face du noyau cubique, à laquelle ce plan correspond, sera mise à découvert lorsque la section passera par les points D, O, G, F, qui appartiennent aussi à un carré, mais situé en sens contraire du précédent *sewx*, la section ayant subi, dans l'espace intermédiaire entre *sewx* et DOGF, des changemens de figure qui l'ont ramené par degrés à celle dont elle étoit partie. Il est facile d'appliquer le même raisonnement aux autres sections.

Combinons maintenant les divisions parallèles aux faces du dodécèdre avec celles qui sont dans le sens des faces du cube, et cherchons la molécule intégrante qui doit résulter de cette combinaison.

Lorsque l'on divise un dodécèdre rhomboïdal parallèlement à ses deux faces, en faisant passer, pour plus de simplicité, les plans coupeurs par le centre, on trouve qu'il se résout en vingt-quatre

tétraèdres, dont les faces sont des triangles égaux et semblables (1). L'un de ces tétraèdres a pour faces les triangles DEO, DCO, DCE, OCE (fig. 64). On voit le même tétraèdre représenté séparément (fig. 65). Un second, situé dans la partie inférieure, est indiqué par les triangles FCG, FPG, FPC, GPC (fig. 64); et ainsi des autres.

Maintenant, si l'on suppose que le même dodécaèdre soit de plus divisible parallèlement aux faces d'un cube, il faudra, pour extraire ce cube, détacher les six pyramides quadrangulaires qui ont pour sommets les angles solides composés de quatre plans, et dont les bases coïncident avec les petites diagonales comprises entre les arêtes qui partent des mêmes angles solides. C'est ce qui est sensible par la seule inspection de la figure 66. Or, chacune de ces dernières coupes, passant à égale distance du sommet E de l'une des pyramides et du centre C, soustrait chaque tétraèdre en deux moitiés, qui sont elles-mêmes des tétraèdres, ayant pour faces deux triangles isocèles et deux triangles scalènes, égaux aux moitiés des précédens. La fig. 67 représente les deux pyramides dont les sommets sont en E et en P (fig. 66), séparées du reste du solide, et la fig. 68 les deux tétraèdres partiels qui résultent de la division du tétraèdre DEOC (fig. 65).

(1) Voyez l'article du *général*, p. 643.

Le dodécaèdre se trouvera donc partagé, à l'aide de ces différentes sections, en quarante-huit tétraèdres tous égaux et semblables, appliqués les uns contre les autres par une de leurs faces.

Réciproquement, si l'on soustrait le cube renfermé dans le dodécaèdre, parallèlement aux faces de ce dernier solide, en faisant passer ainsi les sections par le centre, chacune de ces sections passera en même temps par les diagonales de deux faces opposées. Il en résultera six pyramides quadrangulaires, qui auront pour bases les faces du cube, et dont les sommets se confondront avec le centre de ce cube; et de plus, chacune de ces pyramides étant subdivisée dans le sens de deux plans qui passeroient par les diagonales de sa base et par son axe, donnera quatre tétraèdres semblables à ceux qui naissent de la division du dodécaèdre; en sorte que le cube sera un assemblage de 24 de ces tétraèdres.

Ainsi, cette espèce d'analyse géométrique, qui offre d'abord une complication de plans, en apparence très-difficile à débrouiller, conduit, en dernier résultat, à une forme très-simple de molécule intégrante, qui est la même, soit que l'on considère le dodécaèdre ou le cube comme étant la forme primitive.

Ici revient l'observation que j'ai déjà faite ailleurs⁽¹⁾, et qui consiste en ce que les molécules

(1) T. I, p. 38.

intégrantes sont toujours assorties dans l'intérieur des cristaux qui présentent ces structures à double sens, de manière qu'en les prenant par groupes, on a des parallélépipèdes qui donnent les molécules constructives, c'est-à-dire, celles dont l'assemblage forme les rangées construites sur les lames décroissantes. Dans le cas présent, la molécule constructive est, à volonté, le rhomboïde composé de 6 tétraèdres, ou le cube composé de 24 tétraèdres.

Quelle que soit celle des deux formes primitives que l'on adopte, en sure, de part et d'autre, des lois simples et régulières de décroissement, relativement aux formes secondaires. Mais il paroit plus naturel d'adopter la forme primitive, qui est elle-même la plus simple, ce qui feroit une raison de préférence au faveur du cube, dans l'application de la théorie aux cristaux d'amphigène.

Indiscriminables.

2. Amphigène arrondi. La variété précédente, dont les angles et les bords sont oblitérés.

3. Amphigène amorphe.

A C C I P I E N S D E S A M P H I G È N E S.

Couleurs.

1. Amphigène gris.
2. Amphigène blanchâtre.
3. Amphigène jaunâtre.

Transparence.

1. *Amphigène transparent.*
2. *Amphigène transluide.*
3. *Amphigène opaque.*

DESCRIPTION.

1. Les cristaux d'amphigène se trouvent principalement parmi les déjections volcaniques. Ils sont communs aux environs de Naples et dans diverses autres contrées d'Italie. On n'en a jamais observé ni en Sicile ni en France, où il y a une multitude de volcans éteints. Les amphigènes sont tantôt incorporés avec des laves trass-dans et trass-compactes, tantôt solitaires et dispersés parmi des débris de substances volcaniques ; tantôt, enfin, auricés, en proportion plus ou moins grande, avec le mica, l'amphibole, le feld-spas, etc., dans des blocs qui ont été lancés hors des cratères, quelquefois sans avoir subi l'action du feu. Les fragments de roches de la Somma, au Vésuve, que l'on croit avoir été de même rejetés par la force des explosions, renferment, à plusieurs endroits, des cristaux d'amphigène très-bien conservés.

Cette substance se rencontre encore, quoique très-rarement, hors du domaine des volcans. Le Cit. Delamien eut un échantillon de mine d'or du Mexique, auquel il servoit de gangue. Le Cit.

Lellèvre en a observé de petits cristaux cachectés dans une roche granitique, composée de quartz, de mica brun et de grenat rouge, faisant partie de la montagne des travaux de la Providence, près de Gavarni, dans les Pyrénées (1).

La plupart des cristaux d'amphigène sont opaques. M. Léopold de Buch en a observé, au Vésuve, de transparents, dont il a bien voulu me faire part; et c'est en taillant un de ces cristaux que j'en ai formé un prisme triangulaire, à l'aide duquel j'ai reconnu que la réfraction de cette substance étoit simple.

2. Le diamètre des cristaux d'amphigène n'excède guère la longueur de 27 millimètres ou un pouce, et il varie au-dessous de cette limite jusqu'à une extrême petitesse.

3. La forme du polyèdre à vingt-quatre trapézoïdes que présente l'amphigène, et qui lui est commune avec une variété du grenat, a sans doute beaucoup contribué au rapprochement que les minéralogistes ont fait de ces deux minéraux dans une même espèce. Cette forme est, en général, mieux prononcée dans l'amphigène que dans le grenat. Les tables en sont toutes vives, et l'ensemble offre une régularité qui n'est pas ordinaire dans les cris-

(1) Cet article est extrait des observations de Ch. Dehondou sur la brèche, insérées dans le journal des mines, N^o. 27, p. 277 et suiv.

tres dont les facettes sont multipliées. Ce polyèdre, que nous avons vu être susceptible de donner pour forme primitive, soit le dodécèdre rhomboidal, soit le cube, reparoît dans l'espèce du fer sulfuré, comme originaire de l'octaèdre régulier, en vertu d'un décroissement par trois rangées sur tous les angles de cet octaèdre.

4. L'existence de la potasse, reconnue par le célèbre Klaproth dans l'asphagète (1), offre déjà un résultat digne d'attention, par rapport à ce minéral lui-même, en ce qu'on y voit une substance alcaline, qui, dans son état de liberté, réunit à un si haut degré la solubilité, la saveur et la fixibilité, passer dans une combinaison qui semble enchaîner ces mêmes propriétés, en donnant naissance à un corps insipide, insoluble et infusible. Mais le plus important est la découverte de la potasse dans le rogne minéral, où elle avoit échappé, jusqu'ici, aux recherches des chimistes, qui la regardoient comme appartenant exclusivement aux végétaux. Le Cit. Vasquelin, dont les expériences ont confirmé celles du chimiste de Berlin, a trouvé de plus, que les laves qui accompagnent l'asphagète contiennent aussi une certaine portion de potasse; et dans le mémoire où il rend compte de son travail (2), il jette les germes des idées dont le déve-

(1) Voyez le mémoire de ce auteur, *Journal des mines*, N°. 87, p. 134 et suiv.

(2) *Journal des mines, ibid.*, p. 201 et suiv.

loppement pourra offrir une application heureuse de ces nouvelles connaissances à la théorie de plusieurs phénomènes naturels.

5. Avant que la chimie eût mis en évidence la diversité de nature qui existe entre le grenat et l'amphigène, l'opinion la plus commune faisoit de celui-ci un grenat qui, originairement rouge, avoit été altéré et blanchi par les agens volcaniques (1). D'autres regardoient l'amphigène comme le résultat d'une sorte de vitrification, qui se seroit cristallisée dans les courans des laves fluides, ou qui auroit été produite dans la pâte de ces laves, pendant que l'action des feux souterrains faisoit bouillonner celle-ci dans l'intérieur des foyers volcaniques.

Dalman s'étoit déjà déclaré, depuis long-temps, contre ces deux opinions (2), et, suivant ce sé-

(1) Bond de Lisle dit que, parmi plusieurs cristaux de grenat blanc qu'il possède, il en est qui conservent des vestiges de leur couleur rouge (Grenat, t. II, p. 335); mais les cristaux de sa collection, qui appartiennent aujourd'hui au Cit. Gillet, ont seulement des taches superficielles d'un rouge obscur, et qui paroissent provenir de la matière enveloppante. Le même auteur suppose que l'on voit aussi, sur les grenats blancs, des stries semblables à celles qui délimitent les faces du grenat à six trapézoïdes (ibid., p. 335). Ce sont plutôt de simples filons, qui ont des directions différentes, et correspondent aux coupes, à l'aide desquelles on parviendroit à rendre du cristal son noyau coloré.

(2) Notes sur la description de Bergmann, relative aux produits volcaniques.

Ébées naturelles, les amphiboles, très-distingués des grenats rouges par leurs propriétés et par leur constitution, ne se trouvent dans les laves, ainsi que les horn-blendes (amphiboles), les pyroxènes, les feld-spaths, que comme des produits adventifs, qui auroient été seulement enveloppés par la lave encore à l'état de fluidité.

MM. Salmon et Léopold de Buch ont entrepris, récemment, de défendre le second sentiment, et de prouver que les principes constitutifs de l'amphigène ou de la leucite, après s'être dégagés de la lave, tandis que celle-ci restait encore, s'étoient réunis, au sein de cette même lave, conformément aux lois de l'affinité qui les sollicitoit (1). Une des raisons sur lesquelles ils se fondent, est que les leucites que l'on trouve à Borghetto, près de Tybre, sont souvent tantôt des grains de basalte enveloppés de tous côtés par la matière du cristal dont ils occupent le centre, tantôt des portions du même basalte qui, d'un côté, pénètrent le cristal et, de l'autre, sont adhérentes à la lave voisine. On pourroit peut-être répondre, dans l'hypothèse contraire, que les leucites, lors de

(1) Voyez, pour le développement de cette opinion, le mémoire de M. Salmon, *Journal de physique*, *primé*, an 7, p. 472, et celui de M. de Buch, *idem*, *versuchsweise*, an 8, p. 262, où ce naturaliste a discuté la question présente avec une grande sagacité, et a beaucoup ajouté aux preuves alléguées par M. Salmon.

leur formation, avoient entouré des grains ou des portions des substances environnantes, qui cristallisoient en même temps, comme cela est arrivé par rapport à différentes espèces de cristaux, et que, dans la suite, la même chaleur qui avoit converti en laves ces substances environnantes, avoit agi de la même manière sur les parties enclavées dans les leucites, sans altérer sensiblement ces dernières qui, étant plus susceptibles de résister à l'action du feu, auroient servi comme de noyau.

Mais M. Léopold de Buch insiste de plus sur ce que la lave qui renferme des leucites, étant criblée de petites cavités, dont les plus sensibles ont une figure allongée, les leucites qui avoisinent ces dernières sont elles-mêmes allongées, en conservant toujours leur forme polyédrique, dont les angles sont nets et les faces bien prononcées. Or, cet allongement qui a lieu dans le même sens que celui des cavités, indique que les leucites ont été produites au milieu de la lave même, dont le courant étoit dirigé parallèlement à leur plus grand diamètre. M. de Buch parle d'une autre lave qu'il a observée au Vésuve, et qui est tellement remplie d'une infinité de cristaux de leucite, dont la plupart ne peuvent être distingués qu'à l'aide de la loupe, qu'il est inconcevable que leur existence ait précédé l'époque à laquelle la lave a coulé.

Je ne permettrai encore une réflexion, au sujet de l'élongement des cristaux de leucite : c'est qu'il n'est pas facile d'imaginer comment les molécules de cette substance auroient pu obéir en même temps à leur affinité mutuelle et au mouvement progressif de la lave, qui a produit l'élongement, sans que cette dernière cause n'altérât les inclinaisons respectives des facettes du cristal. Car l'élongement s'est fait de manière que les différentes parties de la leucite avoient des vitesses inégales dans le sens du mouvement progressif, ce qui devoit troubler la marche des décroissemens, et occasionner des variations dans les angles qui en dépendent (1).

M. Breislak, dans son bel ouvrage, qui a pour titre : *Pyroge physique et archéologique dans la Campanie* (2), penche vers le sentiment de M. de Buch, avec lequel il a observé la lave de Boeghetto dont nous avons parlé. Cependant il ne nie pas que le sentiment contraire ne puisse être vrai dans

(1) Il n'est pas rare de rencontrer des variables presque triédroïdes, qui sont plus allongés dans un sens que dans l'autre. Mais cette différence, dans une multitude d'autres substances offrant également des exemples, provient de ce que l'accroissement du cristal s'est fait d'une manière simple sur des parties de nappes sensiblement parallèles, ce qui n'a influé en rien sur les inclinaisons respectives des faces de la forme secondaire.

(2) T. II, p. 3 et suiv.

certain cas. Au reste, je n'ai pas prétendu opposer des difficultés réelles à des observations faites par des savans aussi éclairés et aussi exacts à bien voir : ce sont plutôt de simples doutes qui me paraissent mériter d'être éclaircis, pour qu'il ne restât aucun usage sur les conséquences déduites de ces observations.

XP. E S P È C E.

IDOCHRASE. (*f*) *C'est-à-dire, figure miroir* (1).

Hyacinthe, var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, de *Lafé*, t. II, p. 291 et suite. Hyacinthine, *Sciegn.*, t. I, p. 268. Vénusien, *Emerillog.*, t. III, p. 314. Idocrase, *Darb.*, *tabl.*, p. 10. La véruvienne, *Brochant*, t. I, p. 184. Hyacinthe volcanique ; hyacinthe brune des volcans, suivant plusieurs naturalistes.

Caractère essentiel. Divisible parallèlement aux pans et aux diagonales d'un prisme droit à bases carrées ; facile en verre jaunie.

Caract. phys. Pesant spécif., 3,088... 3,409.

Durcté. Rayant le verre.

Réfraction, double, à un degré assez sensible.

Caract. géom. Forme primitive. Prisme droit à bases carrées (*fig. 63*) *pl. XLVII*, peu diffé-

(1) Voyez la 3^e. annotation.

rent d'un cube, et divisible dans le sens des diagonales de ses bases (1). Quelques cristaux seulement offrent des indices de joints naturels.

Molécule intégrante. Prisme triangulaire à bases rectangles isocèles.

Cassure, légèrement laiteuse, raboteuse, quelquefois un peu scabre.

Craie. cass. Fusible au chalumeau, en verre jaunâtre.

Analyses de l'idocrase du Vésuve, par Klaproth.

Silice.....	36,50.
Chaux.....	28,25.
Alumine.....	35,00.
Oxyde de fer.....	7,50.
Oxyde de manganèse.....	0,25.
Perte.....	1,50.
	<hr/>
	100,00.

Analyses de l'idocrase de Sibérie, par le même.

Silice.....	42,00.
Chaux.....	34,00.
Alumine.....	16,25.
Oxyde de fer.....	5,50.
Oxyde de manganèse, en atome.	
Perte.....	2,25.
	<hr/>
	100,00.

(1) Le côté B est à la hauteur G dans le rapport de 17 à 11.

Caractères distinctifs 1°. Entre l'idocrase et le grenat. La pesanteur spécifique de celui-ci est plus grande, dans le rapport d'environ 6 à 5. Ses formes offrent le même aspect sous différentes positions; celles de l'idocrase, pour se présenter dans leur attitude naturelle, doivent être situées par rapport à un prisme ordinairement octogone. 2°. Entre la même et la méloïte. Dans la première, les faces qui se réunissent en pyramides quadrangulaires sont inclinées entre elles d'environ 136° . L'incidence des faces analogues dans l'idocrase n'est que de $129^{\circ} \frac{1}{2}$. La méloïte se fond en verre spongieux, avec bouillonnement et boursoufflement, et l'idocrase simplement en verre jaunâtre. 3°. Entre l'idocrase utilitaire et le zircon amphiboïdier. Outre que la première a une facette terminale qui manque à l'autre, les faces de ses sommets sont inclinées entre elles de $129^{\circ} \frac{1}{2}$, tandis que celles du zircon ne le sont que de $124^{\circ} \frac{1}{2}$. L'idocrase ne se divise point parallèlement aux mêmes faces comme le zircon. Celui-ci a d'ailleurs une pesanteur spécifique supérieure à celle de l'idocrase, dans le rapport d'environ 5 à 4; sa double réfraction est sans comparaison plus forte. Ces derniers caractères peuvent servir à faire distinguer certains morceaux taillés de zircon, de ceux qui appartiennent à l'idocrase. 4°. Entre la même et le périclét, lorsque l'un et l'autre sont taillés. Ces pierres ayant la double réfraction à un degré marqué, avec une

dureté

durité et une pesanteur spécifique à peu près égales; il ne reste plus, au delà de la forme cristalline et du caractère de fusion, que la couleur, qui est d'un jaune-verdâtre plus clair dans le péridot que dans l'idocrase, où elle est obscurcie par une teinte de noirâtre. 5°. Entre la même et la tourmaline du Brésil taillée. Celle-ci est électrique par la chaleur; l'idocrase ne l'est qu'à l'aide du frottement.

V A R I É T É S.

F O R M E S.

1. Idocrase uniaxiale. $\begin{matrix} M & G & A & P \\ M & d & c & P \end{matrix}$ (Fig. 70.)

A huit pans, avec des sommets à quatre faces obliques et une horizontale. De *Lisle*, t. II, p. 290; var. 3. *Ibid.*, p. 294 et 295; var. 6 et 7. Inclinaison de P sur M et de M sur M, 90° ; de d sur M, 115° ; de c sur d, $127^\circ 6'$; de c sur P, $142^\circ 54'$; de c sur c, $129^\circ 30'$; de c sur M, $115^\circ 15'$.

a. Les pans d, d, beaucoup plus larges que les pans M, M.

b. Même modification, dans laquelle les faces P, ont pris aussi une largeur considérable, en sorte que le cristal ressemble à un cube émarginé. Ces changements de dimensions respectives se retrouvent dans les variétés suivantes.

2. Idocrase constructive. $\begin{matrix} M & G' & G' & \overset{1}{A} & P \\ M & h & d & e & P \end{matrix}$ (fig. 71).

La variété précédente émarginée verticalement. Incidence de h sur M , $155^{\circ} 27'$; de h sur d , $161^{\circ} 55'$.

3. Idocrase non-constructive. $\begin{matrix} M & G' & G' & \overset{1}{A} & \overset{1}{B} & P \\ M & h & d & e & o & P \end{matrix}$ (fig. 72).

La variété précédente émarginée à la jonction des faces e , o . De *Lisle*, p. 292 ; var. 4. Incidence de e sur o , $154^{\circ} 45'$; de e sur M , $118^{\circ} 8'$.

4. Idocrase encadrée. $\begin{matrix} M & G' & G' & \overset{1}{A} & \overset{1}{A} & \overset{1}{A} & \left(\overset{1}{A} \overset{1}{B} G' \right) \\ M & h & d & r & e & n & \left(\begin{matrix} x \\ x \end{matrix} \right) \end{matrix}$

$\begin{matrix} \overset{1}{B} & P \\ x & P \end{matrix}$ (fig. 73). La var. 3 émarginée. De *Lisle*, t. II, p. 293 ; var. 5. Incidence de r sur d , $161^{\circ} 42'$; de r sur e , $145^{\circ} 24'$; de e sur M , $144^{\circ} 44'$; de n sur P , $165^{\circ} 51'$; de n sur e , $157^{\circ} 3'$.

1. Nota. Je ne doute que par conjecture les angles de cette variété, qui ne m'ont guère connus que par la description et la figure de *Rond de Lisle*, et que je suppose compris dans la suivante. Il faut en excepter les facettes n , n , que j'ai déterminées immédiatement, en me servant d'un fragment qui paraîtroit avoir été détaché d'un cristal de cette variété.

5. Idocrase enfilantée. $\begin{matrix} M & G' & G' & \overset{1}{A} & \overset{1}{A} \\ M & h & d & r & e \end{matrix}$

$\left(\begin{array}{ccc} A & \frac{1}{2}A & A \\ x & x & x \end{array} \begin{array}{ccc} B & G & \end{array} \right) \begin{array}{c} H \\ x \end{array} \begin{array}{c} P \\ P \end{array}$ (Fig. 74.) La variété précédente, dans laquelle les facettes a , a (Fig. 75) sont supprimées, et les facettes x comprises chacune entre deux nouvelles facettes, la distance de x sur M , $150^{\circ} 3'$; de x sur e , $145^{\circ} 12'$; de x sur M , $133^{\circ} 18'$; de x sur e , $151^{\circ} 57'$.

Nota. Les facettes a étoient si étroites sur le cristal que j'ai observé, que je n'ai pu les déterminer que par aperçu.

ACCIDENS DE LUMIÈRE.

1. Idocrase brune.
2. Idocrase orangée.
3. Idocrase vert-foncé.
4. Idocrase fort-jaunâtre. Chrysolite des hôpitaux de Naples.

Transparence.

1. Idocrase transparente.
2. Idocrase translucide.
3. Id. opaque. Beaucoup d'idocrases brunes.

ANALYSE.

1. On trouve, auprès du Véuvre, un grand nombre d'idocrases engagées dans des fragmens de roches primitives, qui ont été repêchés hors du

volcan, et ne paraissant point avoir souffert, ou que très-peu, de l'action de la chaleur. Ces roches sont des mélanges de plusieurs des substances suivantes : quartz, mica, talc-stéatite, argile, chaux carbonatée, etc. Les idocrases y sont accompagnées de divers cristaux, tels que des grenats émeraude, des araphales dodécédres, des néphélines, des micas, etc.

La Sibérie fournit aussi des idocrases de la particulière variété, d'une couleur d'olive très-fusée, qui sont renfermées isolément dans une pierre d'un vert-blanchâtre, que Klaproth regarde comme une serpentine. Elles ont été découvertes par Looman, près le lac Achterogla, qui communique avec le fleuve Wissei. J'ai une de ces idocrases solitaires, qui a 18 millimètres de longueur sur une épaisseur de 8 millimètres. Parmi celles du Vénus, quelques-unes sont d'un volume beaucoup plus considérable.

M. Bonafé de Lisle a très-bien remarqué que les angles de l'idocrase différoient sensiblement de ceux de l'hyacinthe ordinaire (surtout l'angle aigu), à laquelle on l'avoit réunie jusqu'alors. Ce célèbre naturaliste ne considéroit que les cristaux du Vénus, et c'est Pallas qui, le premier, a vu que ceux de Sibérie appartenoient à la même espèce. Les cristaux d'idocrases ont plusieurs analogies avec ceux de différents minéraux, soit par leur aspect, soit par les valeurs de leurs angles. La

alcoen , la nicotite et l'harmonieus présentent des formes du même genre , qui les ont fait confondre d'abord avec la substance dont il s'agit ici. Le prisme octogonal de la variété arbitraire se retrouve , avec les mêmes angles , soit dans les minéraux que nous venons de citer , soit dans l'étain oxydé , où l'on rencontre aussi le prisme à 16 pans de la variété constructrice. L'incidence de $144^{\circ} 44'$, qui est celle de *a* sur *M* (fig. 75) , est commune dans les modifications des formes primitives régulières , etc. Le nom d'idocrase exprime que les formes de cette substance sont , en quelque sorte , mélangées de celles des autres.

4. Si l'on calcule les lois de décroissement qui déterminent les formes secondaires de l'idocrase , en supposant que le noyau soit un cube , on parvient à des résultats qui ne diffèrent pas sensiblement des valeurs d'angles indiquées par Romé de Lile ; et j'étois moi-même parti de cette hypothèse , dans le temps où je n'avois à ma disposition que des cristaux qui ne comportoient que des mesures approximatives. Mais il n'étoit pas aisé de concevoir comment , parmi les six faces du cube , il s'en trouvoit deux qui faisoient constamment la fonction de bases , de manière que les décroissemens relatifs à ces bases , différoient de ceux qui résulteroit sur les faces latérales ; et je cherchois en vain la raison de cette attitude constante que prendoit ici le cube , tandis que dans d'autres mi-

autres, tels que l'analyse, le plomb sulfuré, le fer sulfuré, etc., toutes les floes subissent les mêmes lois de décroissement, et pourraient être prises indifféremment pour bases. D'ailleurs tel-prouvé, dont je suis redevable à M. Léopold de Buch, m'ont mis à portée de reconnaître, sans aucune équivoque, que la forme primitive de l'idocrase avoit seulement deux faces carrées, et que sa hauteur étoit un peu plus grande que le côté de la base, ce qui faisoit rentrer cette forme dans l'analogie des parallélépipèdes ordinaires.

5. Ceci nous conduit à examiner l'opinion de quelques naturalistes, qui ont pensé qu'il n'existoit point, en minéralogie, de véritables cubes, ni d'octaèdres ou de tétraèdres réguliers; mais qu'il y avoit entre les cristaux que nous regardons comme tels, et les solides géométriques, de petites différences qui, jusqu'ici, avoient échappé à nos instrumens, mais que l'on parviendroit peut-être un jour à saisir, avec des moyens susceptibles d'une plus grande précision (1). Il me paroît bien prouvé,

(1) Cette opinion rentre dans celle qu'a avancée le célèbre Becher, lorsqu'il a dit : « les observations multiples des cristallographes nous ont dû les rappeler à cette métaphysique si simple, qui nous démontre que dans la nature il n'y a rien d'absolu, rien de parfaitement régulier. C'est par discussion que nous avons formé les figures géométriques et régulières, et par conséquent nous ne devons pas les appliquer comme des propriétés réelles aux produits

au contraire, que la cristallisation, dans certains cas, atteint l'exactitude géométrique; et voici le raisonnement sur lequel je me fonde.

Nous connaissons des formes primitives qui diffèrent assez peu d'un solide régulier, par exemple, du cube, pour que l'œil puisse y être trompé; mais assez cependant pour que la différence devienne sensible à l'aide d'un instrument mesuré par une main exercée. Tel est le noyau de la chalcide; tel est encore celui du fer de l'île d'Elbe, qui a été pris, pendant si long-temps, pour un véritable cube. Mais ces noyaux se comportent à la manière des rhomboïdes, c'est-à-dire, qu'il faut imaginer un axe qui passe par deux de leurs angles solides opposés, pris pour sommets; et tantôt ces sommets restent intacts, tandis que les parties latérales subissent des décroissemens, tantôt c'est le contraire qui a lieu, et tantôt, enfin, il se fait des deux côtés des décroissemens suivant des lois différentes.

D'une autre part, il existe des solides primitifs dont tous les angles mesurés avec le plus grand soin, paroissent droits; et dans les divers cristaux qui en dérivent, les lois de décroissemens produisent presque toujours de tous les côtés des

effets semblables, d'où résultent des formes qui changent de position sans changer d'aspect.

Supposons maintenant que la différence soit encore plus petite entre les rhomboïdes dont j'ai parlé d'abord et le cube. Il n'y aura aucune raison pour que les lois de décroissemens ne continuent pas d'agir diversement par rapport aux sommets et aux parties latérales; et tant que la différence avec le cube subsistera, quelque petite qu'elle soit, les décroissemens doivent participer de cette diversité. Donc lorsqu'il n'y en a plus aucune entre les décroissemens eux-mêmes, les parties qui les subissent deviennent semblables, c'est-à-dire, qu'elles se trouvent dans le cas où n'y ayant pas de raison pour que la loi du décroissement varie d'un côté plutôt que de l'autre, elle agit de la même manière de tous les côtés, ce qui suppose que le rhomboïde a disparu pour faire place à un véritable cube.

Finalement en observant, que les décroissemens qui se font sur les différentes parties des rhomboïdes offrent des contrastes aussi marqués, dans ceux de ces solides qui se rapprochent beaucoup du cube, par leurs angles, que dans ceux qui s'en écartent le plus. Il n'y a là aucune gradation, à l'aide de laquelle les formes secondaires aient plus voisines de la symétrie, à mesure que les angles du noyau diffèrent moins de l'angle droit; en sorte que l'espèce de solide qui donne nais-

succè à cette symétrie, occupe un rang à part dans les résultats de la cristallisation ; et cette sorte d'isolement annonce une forme qui, considérée en elle-même, doit constituer une véritable limite, laquelle ne soit pas susceptible de plus ou de moins.

J'observerai enfin, que parmi les rhomboïdes très-voisins du cube, il en est d'aigus et d'autres qui sont aigus ; en sorte que la cristallisation, en produisant chacun d'eux, est tantôt un peu au-delà, et tantôt un peu en-deçà de la limite décrite par la forme cubique qui est, de tous les parallélipèdes, le plus régulier et le plus parfait. Or, n'est-ce pas calomnier la nature, que de la réduire à passer toujours à côté de la perfection, sans jamais y atteindre ?

Ce que je dis ici du cube, s'applique également à l'octaèdre, au tétraèdre et au dodécaèdre rhomboidal qui, dans certaines substances, offrent tous les caractères d'une régularité parfaite, et ne doivent pas être regardés, non plus que le cube, comme de simples approximations relativement à des limites qui n'existeraient que dans nos conceptions.

6. Les artistes Napolitains taillent les idoles transparentes, et les montent en bagues. On les trouve, dans le pays, *graves de Fésave*, et on les met au rang des pierres précieuses. Le Cit. Beccan en a rapporté de ses voyages, qui sont

d'une couleur verte obscurcie par une forte nuance de noirâtre, comme dans le tourmaline du Brésil, et il y en a dans la collection du Cit. Lelièvre qui ont différentes teintes de vert, d'orangé, etc. C'est à l'aide de celles que ces deux naturalistes ont bien voulu me donner, que j'ai reconnu la propriété qu'a l'idocrase, de doubler sensiblement les images des objets.

XIV. E S P È C E.

MEÏONTE, (*f*) c'est-à-dire, *modeste ou inférieure*.

Hyacinthe blanche de la Somma. *De Lisle, t. II, p. 290.*

Caract. essentiel. Divisible parallèlement aux pans d'un prisme à bases carrées. Très-décidément fusible en verre blanc spongieux.

Caract. phys. Dureté. Rayant le verre.

Caract. géom. Forme primitive. Prisme droit (*fig. 76*) pl. XLV^{III}, à bases carrées. Les divisions latérales sont assez nettes, surtout lorsqu'on fait mouvoir les fragments à une vive lumière. La position des bases n'est que présumée.

Molécule intégr. *Id* (1).

(1) Le côté B de la base est à la hauteur C comme 741 : 2. Ces dimensions ne doivent être regardées que comme approximatives, à cause de la petitesse des cristaux.

Cassure, transversale, conchôie, éclatante.

Cassure. cass. Très-aisément fusible en verre blanc spongieux, avec un bouillonnement considérable, accompagné de bruissement.

Cassure. cass. 1°. Entre la melonite et l'idocrase. Dans les cristaux de celle-ci, les faces du sommet qui tendent à se réunir en une pyramide quadrangulaire, font entre elles des angles de 129° $\frac{1}{2}$; les angles analogues dans la melonite sont d'environ 136° . L'idocrase se fond simplement en verre, sans bouillonnement ni bruissement. 2°. Entre la même et le zircon. Celui-ci se divise parallèlement à ses faces terminales, et non la melonite; les inclinaisons des mêmes faces sont de 124° $12'$ dans le zircon, et de 136° dans la melonite; le zircon est incolore, et rase le quartz; la melonite est trouble, et ne rase que le verre. 3°. Entre la même et l'harmotome. La première n'a pas de joints parallèles aux faces de ses sommets, comme on en observe dans l'harmotome; ces mêmes faces sont inclinées entre elles de 122° dans l'harmotome, et de 136° dans la melonite. 4°. Entre la même et le vermicite. Celui-ci n'offre aucun joint naturel bien sensibles, et ceux que l'on pourroit y présumer seroient plutôt parallèles aux faces situées comme 1, 2 (fig. 76). La poussière de la melonite n'est point phosphorescente, par le feu, comme celle du vermicite. 5°. Entre la même en grains irréguliers et la néphéline sceptre. Celle-ci est

difficile à fondre, et se boursouffle ni se se boursouffle.

V A R I É T É S.

F O R M E S .

Déterminables.

1. *Ménoite diactolite*. $\begin{matrix} G' M A \\ s M i \end{matrix}$ (fig. 75). Prisme octaèdre à sommets tétraèdres. Incidence de I sur I_2 , $158^{\circ} 22'$; de I sur M , $111^{\circ} 45'$; de I sur s , $121^{\circ} 45'$; de M sur M , 50° ; de s sur M , 135° .

2. *Ménoite anastrolite*. $\begin{matrix} G' G' M A' A \\ s x M x I \end{matrix}$ (fig. 77). La variété précédente, émarginée verticalement et à la jonction des bords I , M . Incidences de s sur M , $153^{\circ} 26'$; de x sur s , $161^{\circ} 34'$; de x sur M , $140^{\circ} 11'$; de s sur I , $151^{\circ} 36'$.

Indéterminables.

3. *Ménoite anarpha*. En grains irréguliers.

A C C I D E N S D E L U M I È R E .

1. *Ménoite limpide*.

2. *Ménoite blanchâtre*.

Transparence.

Ménoite translucide.

A N N O T A T I O N S.

1. Les cristaux de mésonite se trouvent à la Sonima, parmi les masses rejetées par le Yéoué. Ils n'ont guère que deux millimètres d'épaisseur, et sont ordinairement serrés les uns contre les autres. La gangue de ceux que j'ai observés étoit une chaux carbonatée lamellaire.

a. Romé de Lisle, qui, le premier, a parlé de la mésonite, rapportoit les cristaux diocésidres de cette substance à la seconde variété de l'hyacinthe, qui est notre siroon diocésidre, en ajoutant que les faces de ses pyramides étoient cependant inclinées comme dans l'hyacinthe du Yéoué (idéonase). Il est à présumer qu'il n'auroit pas entre les mains de cristaux assez prononcés, pour permettre de saisir une différence qui m'a paru évidente sur ceux dont j'ai mesuré les angles. Il en résulte que la pyramide du sommet est plus basse dans la substance dont il s'agit que dans l'idéonase, et même que dans les autres substances qui ont une cristallisation analogue, telles que l'harmonium et le siroon. C'est de cette forme surbaissée et du rapprochement qui en résulte pour l'axe de la forme primitive, que j'ai emprunté le nom de mésonite.

Il n'existe, d'ailleurs, aucune loi certaine de décroissement qui puisse produire, autour du noyau de l'idéonase, des formes semblables à celles

de la matière; et si l'on considère encore la différence marquée qui existe entre les deux substances, relativement à leur manière de se fondre, on ne pourra douter, ce me semble, qu'elles ne forment deux espèces nettement distinguées l'une de l'autre.

XIIP. E S P È C E.

FELD-SPATH, c'est-à-dire, *spath des champs*.

Spathum scellulare, *Waller*, t. I, p. 213. *Feld-spath*, de *Lisch*, t. II, p. 445. *Id.* de *Born*, t. I, p. 136. *Spath feulân*, d'*Arcot*, premier mémo. sur l'action d'un feu égal, p. 53, et second mémo., p. 45. *Spath blanc*, *Gottard*, *mém. du Dauphiné*, p. 38. *Feld-spath*, *Sciagr.*, t. I, p. 550. *Feld-spath*, *Krausling*, t. I, p. 266. *Id.* *Werner*, *cat.*, t. I, p. 282. *Spath émicchant*; *feld-spath*, *Darbenton*, *tableau*, p. 4. *Felspar*, *Kirwan*, t. I, p. 317. *Potassé des Chinois*. Le *feld-spath*, ou *spath des champs*, *Brachet*, t. I, p. 361.

Caract. causés. Des joints naturels également nets, dans deux sens perpendiculaires l'un sur l'autre.

Caract. phys. Pouss. spécl., 2,4378... 2,7045.

Durété. Rague le verre; émicchant sous le briquet.

Réfraction, double. Je ne puis dire dans quel sens elle a lieu, ne l'ayant observée qu'avec des morceaux qui n'ont été taillés.

Électricité par le frottement; difficile à exciter, même lorsque le corps est opaque.

Phosphorescence, sensible par le frottement mutuel de deux morceaux, dans l'obscurité.

Caract. géom. Forme primitive. Parallépipède obliquangle irrégulier (fig 76) pl. *XLP* III. Incidence de M sur P, 90° ; de M sur T, 120° ; de T sur P, $111^\circ 28' 17''$. Les coupes parallèles à M, P sont très-nettes et faciles à obtenir; mais, le plus ordinairement, celle qui est parallèle à T se laisse seulement entrevoir par le chatoyement à une vive lumière.

Molécule intégr., *id.* (1). Le parallépipède qui

(1) Si l'on fait passer un plan passant par la face M, perpendiculairement à cette face, et en même temps aux arêtes G, H, ce plan interceptera un double oblong de 120° et 60° , dont le côté qui répond à T sera double de celui qui répond à M. Si l'on conçoit un second plan qui passe aussi par M, perpendiculairement à cette face, et en même temps aux arêtes D, E, ce plan interceptera un carré, en supposant la face P prolongée autant qu'il est nécessaire, pour que le plan rencontre l'arête G. Il y a une autre double qui dépend de ce que l'angle AEO est le moitié de l'angle OEA. Dans cette hypothèse, l'angle OEA est de $115^\circ 28' 36''$, après quoi il est facile d'avoir tout le reste, et de calculer les angles des formes secondaires. Voyez la partie géométrique à l'arsène du tétréquis, t. II, p. 68 et suiv.

la représente, a cette propriété, que la diagonale menée de *A* en *O*, est perpendiculaire sur l'arête *HI*, ou, ce qui revient au même, qu'elle est horizontale, en supposant les faces *M*, *T* situées verticalement. Il en résulte que, quand une facette produite par un décroissement ordinaire sur l'angle *I* se combine avec la face *P*, l'arête qui les réunit est elle-même horizontale. Cette observation est nécessaire pour bien concevoir la structure des variétés que présente la cristallisation du feld-spalh.

Une seconde propriété du même parallépipède consiste en ce que les deux faces *M*, *P* sont égales en étendue, et en ce que la face *T* est double de chacune d'elles.

Caract. chim. Facile ou chauxsosa, en émail blanc.

Analyse du feld-spalh limpide, dit *scutaire*, par Vauquelin.

Silice	64.
Alumine	20.
Chaux	14.
Potasse	14.
Total	109.

Analyse

Analyse du feld-spath vert de Sibirie, par le même (1).

Silice	62,83.
Alumine	17,09.
Chaux	3,00.
Oxyde de fer	1,00.
Potasse	13,00.
Perte	3,12.
	<hr/>
	100,00.

Analyse du feld-spath laminaire blanchâtre, du perou (2).

Silice	74,2.
Alumine	14,5.
Chaux	5,5.
Perte	6,0.
	<hr/>
	100,0.

Caract. distinctifs. 1°. Entre le feld-spath et le corindon. Celui-ci est divisible en rhomboïde un peu aigu, par des coupes également nettes dans les trois sens : le feld-spath n'offre que deux joints éclatans, perpendiculaires entre eux. Sa pesanteur spécifique est plus petite, dans le rapport d'environ 7 à 10; le corindon rayé fortement le quartz, ce

(1) Bulletin des sciences de la soc. philom., t. 18, an 7, N°. 24, p. 131.

(2) Id., ibid., an 7, N°. 26, p. 12.

que ne fait pas le feld-spath. 2°. Entre le feld-spath usuré (pièce de laine) et le quartz chatoyant (œil de chat). Celui-ci a la cassure rubanée, et ne se divise pas nettement comme le feld-spath. 3°. Entre le même et la cymophane. Le feld-spath est beaucoup moins dur. Sa pesanteur spécifique est moindre, dans le rapport d'environ 5 à 7; il s'électrise difficilement par le frottement, et la cymophane avec beaucoup de facilité. 4°. Entre le feld-spath vert et le diatase (suscragite) verte. Celle-ci est rayée par le feld-spath; elle ne se divise nettement que dans un sens : le feld-spath est susceptible de deux coupes perpendiculaires entre elles, d'un éclat égal et plus vif que celui qui a lieu dans la diatase.

V A R I É T É S.

F O R M E S.

Déterminables.

1. Feld-spath usuré. $\begin{smallmatrix} G & T & P \\ I & T & P \end{smallmatrix}$ (Fig. 79.) En pièce oblique, dont la base est un rhombe dans lequel la diagonale qui aboutit à l'arête α est perpendiculaire sur elle. Incidence de I sur T , 60° ; de l'arête α sur P , $115^\circ 31' 38''$; de chacun des pans adjacens à l'arête α sur P , $111^\circ 38' 17''$; de chacun des pans adjacens à l'arête β sur P , $68^\circ 31' 43''$.

2. Feld-spath usiné. $\begin{smallmatrix} M & I & P \\ N & Y & P \end{smallmatrix}$ (Fig. 80.) En

prisme oblique, dont les faces P, y sont des rectangles, et la face M un parallélogramme oblique. Incidence de P et de y sur M , 90° ; de y sur P , $99^\circ 41' 6''$.

3. Feld-spath prismatique. $\begin{smallmatrix} G^* M T P \\ l M T P \end{smallmatrix}$ (fig. 81).

La var. 1 (fig. 79), dont les arêtes n sont remplacées par des facettes M (fig. 81), qui font avec l et T des angles de 120° . De *Linde*, t. II, p. 461; var. 1.

4. Feld-spath distriché. $\begin{smallmatrix} G^* T I P \\ l T x P \end{smallmatrix}$ (fig. 82).

En prisme quadrangulaire à sommets dièdres, dont les faces naissent sur les arêtes longitudinales a, a . De *Linde*, t. II, p. 465; var. 6. Incidence de x sur P , $128^\circ 55' 48''$; de l'arête n sur l'arête n , 90° ; de l'arête h sur x , $116^\circ 4' 28''$, à peu près la même que celle de l'arête a sur P .

5. Feld-spath tétraèdre. $\begin{smallmatrix} G^* M T I P \\ l M T x P \end{smallmatrix}$ (fig. 83). En

prisme hexaèdre à sommets dièdres. De *Linde*, t. II, p. 462 et suite, var. 2, 3, 4, 5. Le pentagone x , produit par le décroissement, a presque les mêmes angles que le pentagone P . Valeur de chacun des angles e, l , $115^\circ 6' 8''$.

6. Feld-spath quadrifacial. $\begin{smallmatrix} G^* G^* M H T I P \\ l x M x' T x P \end{smallmatrix}$ (fig. 84) pl. XXX. La variété précédente, dont le prisme est devenu décagone. Incidence de x ou
P p a

de a' sur M , 150° ; de x sur t , ou de a' sur T , 150° . C'est à cette variété qu'appartiennent les cristaux connus, pendant long-temps, sous le nom de *arabais blancs* (*de Lisle, t. II, p. 409* var. 12), et dont j'ai fait depuis le rapprochement avec le feld-spalh. Ils sont souvent accolés deux à deux, ou en plus grand nombre, par leurs faces analogues à M .

7. Feld-spalh *oblique*. $\begin{smallmatrix} G^+MT\bar{1}P \\ i\ MTx\bar{1}P \end{smallmatrix}$ (fig. 85)

La variété binaire (fig. 85) augmentée à chaque sommet d'une facette qui naît sur l'arête k . *De Lisle, t. II, p. 468*; var. 7. Incidence de y sur P , $99^\circ 41' 48''$; de y sur x , $150^\circ 45' 28''$. L'arête a est parallèle à l'arête f , et horizontale comme elle.

8. Feld-spalh *arabesque*. $\begin{smallmatrix} G^+MT\bar{1}P \\ i\ MT\bar{1}P\ y\ x\ o\ a' \end{smallmatrix}$ (fig. 86) La variété précédente, dans laquelle les arêtes situées entre M et x sont remplacées chacune par un trapez. étroit. *De Lisle, t. II, p. 472*; var. 8. Incidence de a , ou de a' sur P , $124^\circ 15' 51''$; de a sur M , ou de a' sur la face opposée à M , $116^\circ 21' 36''$.

Par une suite de la forme des molécules, les facettes a , a' , quoique produites par des lois différentes de décroissement, dont les signes sont $\bar{1}i$ et $\bar{1}P$, ont des positions semblables. On pourra remarquer, dans la série des variétés, d'autres

analogues du même genre. Le côté de chaque trapèze additionnel, tel que o , qui passe sur la face P , est parallèle à l'arête a , d'où il suit que l'angle r est de $122^{\circ} 29' 56''$.

9. Feld-spath décaédrique. $G' G' M' H P T \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{I}} \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{I}} \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{P}} \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{I}} \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{I}}$
 $I \propto M \propto P T Y \propto o \sigma'$
 (Fig. 87). La variété précédente, dont le prisme est décaédrique. De Lisle, t. II, p. 474; var. 9. J'ai observé cette variété sur un granite de Norwège, qui m'a été envoyé par M. Abildgaard.

10. Feld-spath décaédroédrique. $G' G' M'$
 $I \propto M'$

$H T \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{I}} \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{P}} \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{D}} \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{C}} \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{P}} \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{I}}$ (Fig. 88). La variété précédente, dans laquelle les faces x sont nulles, et les arêtes situées entre P , M remplacées chacune par un trapèze. De Lisle, t. IV, explic. de figures, p. 64 et suite; var. 18, 19, 20. Incidences de a ou de a' , tant sur P que sur le plan adjacent M ou m , 1564.

11. Feld-spath apophane. $G' G' M' H T \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{I}} \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{I}} \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{P}} \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{P}} \overset{\cdot}{\underset{\cdot}{I}}$
 $I \propto M \propto T a q P \propto o'$
 (Fig. 89). La variété décaédrique, dans laquelle les faces y sont nulles, et les arêtes situées entre P , x , interception chacune par un trapèze q . Cette dernière facette, par son inclination plus petite sur P que sur x , peut aider à reconnaître que le premier de ces pentagones appar-

tient au rayon, ce qu'il seroit difficile d'apercevoir sans cela, à cause des inclinaisons presque égales de P et de α . Le prisme a ordinairement des dimensions différentes de celles qui ont lieu dans le cristal didécédraire, les pans i , T étant ici les plus larges. Incidence de q sur P, $245^{\circ} 8' 26''$; et sur α , $164^{\circ} 41' 8''$. Le côté de la facette σ , qui est tourné vers l'arête α , lui est parallèle. Valeur de l'angle α , $65^{\circ} 58' 48''$.

12. *Fold-spath symétrique.* $\begin{matrix} G^* & G^* & M & T & T & i \\ i & \alpha & M & \alpha' & T & j \end{matrix}$
 $\begin{matrix} i & P & \sigma & F & i \\ q & P & \alpha & \alpha' & \end{matrix}$ (fig. 90). La variété didécédraire (fig. 88) augmentée à chaque sommet de deux facettes q , α , entre P et j . Il présente comme le tableau en raccourci de toutes les lois de décroissances observées jusqu'ici dans les cristaux de cette espèce.

Nota. Dans plusieurs des variétés précédentes, les dimensions des faces sont sujettes à varier, de manière que le cristal prend un aspect tout différent de celui auquel se rapportent les figures, c'est-à-dire, que les faces P, M et leurs opposées, qui font entre elles des angles droits, se présentent comme les pans d'un prisme rectangulaire. Par exemple, il arrive assez souvent que dans la variété didécédraire (fig. 88), les faces M se rapprochent entre les faces P, par le rapprochement de celles-ci, comme on le voit

fig. 34, pl. L (1) ; et alors ces quatre faces ont l'air d'appartenir à un prisme qui est octogone , par l'addition des facettes n , n' , etc., et dont les sommets très-irréguliers sont formés, l'un des faces y , e , e' , T , e' , etc. ; et l'autre, des faces situées dans la partie opposée. C'est sous ce point de vue que Bourn de Lisle a considéré une partie des variétés qu'il a décrites fort au long dans son article du feld-spath.

13. Feld-spath hémistrophe, c'est-à-dire, dont une moitié est retournée. De Lisle, t. II, p. 478 et suiv. ; var. 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16.

a. Plan de jonction parallèle à la diagonale qui va de I en a (fig. 78), et à son opposée.

Cette hémistrophe a lieu relativement à différentes formes cristallines qui rentrent dans les variétés précédentes. Mais les deux moitiés du noyau, auxquelles appartiennent celles du cristal secondaire, dont l'une est retournée, sont toujours considérées provenir d'une coupe faite dans le même sens ; en sorte que l'hémistrophie rapportée à ce noyau ne souffre aucune variation. Un exemple fera concevoir le principe qui peut aider à débrouiller toutes ces modifications, dont le détail nous meneroit trop loin.

(1) Il faut faire ici abstraction des lignes ce , ce' , ce , ce' , qui indiquent une coupe du cristal, laquelle nous sera bientôt nécessaire pour l'explication d'une autre variété.

Supposons que la fig. 91 représente un cristal secondaire, qui ait pour axes $\begin{smallmatrix} M & T & i & i' & P & P' \\ M & T & y & x & o & P. \end{smallmatrix}$ Ce cristal ne diffère de la variété sexdécimale (fig. 86), que par l'absence de la facette x' , et par celle du pan i et de son opposé. De plus, il est aussi nécessaire de montrer que les faces P , M et leurs opposées se présentent sous l'aspect d'un prisme rectangulaire (1). Imaginons maintenant un plan coupant qui passe par les arêtes $d a$, $i h$ (fig. 91), lesquelles répondent aux arêtes Ai , et (fig. 76) de la forme primitive. Ce plan passera en même temps par la diagonale qui va de i en a ; et si l'on considère sa section par rapport aux deux faces T , y (fig. 92), il est visible qu'il coupera leur arête de jonction en quelque point k , et l'arête opposée en quelque point g .

Les choses étant dans cet état, concevons que la moitié dans laquelle sont comprises les faces P , M , T , restant fixe, l'autre moitié se retourne, en restant toujours appliquée à la première, jusqu'à ce qu'elle soit tout à fait traversée, comme on le voit fig. 92. Les deux moitiés ainsi réu-

(1) Ce prisme averti aux dimensions de la forme primitive a ses pans M , P égaux en largeur, en sorte que sa coupe transversale serait un carré. C'est une suite de ce qui a été dit plus haut, p. 592, note 1.

ries formeront un angle saillant à l'endroit des lignes ah , hh , et un angle rentrant dans la partie opposée, à l'endroit des arêtes $d'g$, $f'g$. Mais ordinairement les cristaux sont tellement engagés dans leur support, qu'ils ne présentent que la partie sur laquelle est situé l'angle saillant.

Il résulte de ce qui précède, que l'angle formé par l'arête a avec l'arête de jonction des faces M , T , doit être égal à celui que forme l'arête H (fig. 78) avec la diagonale qui va de l en a . La valeur de cet angle est de $40^{\circ} 4' 17''$.

Là jonction des deux moitiés se faisant, comme nous l'avons dit, dans le sens de la diagonale la , on conçoit que le rapprochement des molécules d'une des moitiés du moyen, ne les empêche pas de s'engager dans celles de l'autre moitié, à l'endroit de cette jonction; en sorte que le mécanisme de la structure schiste, à cet égard, comme dans les cristaux ordinaires. J'ai dans ma collection une hématite très-prononcée, provenant de Raveno, et semblable à celle qui vient d'être décrite.

4. Plan de jonction parallèle à la face M (fig. 78).

Soit a a' (fig. 95) *pc.* L , un cristal secondaire qui ait pour signe $\begin{smallmatrix} G' & M & T & P & \dot{D} & \dot{C} & \dot{I} & \dot{F} \\ l & M & T & P & n & n' & x & x' \end{smallmatrix}$. Supposons un plan coupant, qui passe par les points a , a , a' , a' , et en même temps par

les milieux des arêtes a , a' , et concevons que l'une des deux moitiés qu'intérocepte ce plan, par exemple, celle qui est située en avant, prenant une position renversée. Les deux faces P , x ayant des inclinaisons presque égales, leurs réfractas, après le renversement dont nous venons de parler, se trouveront sensiblement sur les mêmes plans que les portions des faces inférieures analogues; et il est facile de voir que chaque sommet de l'hémistropie présentera encore quatre facettes marginales, avec cette différence, qu'à la place de la facette n qui est inclinée de 135° sur M , il y aura une facette située comme a , c'est-à-dire, inclinée de $116^\circ 31' 36''$ sur M ; et réciproquement, la facette a se trouvera remplacée par une facette inclinée comme n . Quant au prisme, il n'aura subi aucun changement apparent, pourvu que le plan de jonction passe par les arêtes a a' ; mais souvent il ne partage pas exactement le cristal en deux moitiés, et alors les pans qui appartiennent aux deux portions de cristal forment entre eux des angles contrastés de part et d'autre. Il est remarquable que dans le premier cas, où la jonction se fait symétriquement, elle ne donne lieu à aucun angle contrasté, ce qui est le contraire des hémistropies ordinaires; en sorte que celle-ci se présente avec l'aspect d'un cristal en tout seroit à sa place naturelle. Mais la structure dénote le renversement d'une des moitiés du cristal, en

offrant des joints parallèles seulement au résidu de la face P , et d'autres parallèles à la partie de la face p , qui s'est retournée, pour se réunir au résidu de la face x , en lieu que dans un cristal qui n'auroit subi aucun renversement, les joints seroient continus parallèlement à P , et tous parallèlement à x . J'ai observé cette hémotropie sur des cristaux d'un rouge incarnat trouvés par le Cit. Lefèvre, sur les bords du Rhin, près de Cologne, dans une montagne volcanique.

c. Plan de jonction parallèle à la face P (fig. 76).

Le Cit. Del est le premier qui ait observé cette hémotropie, dont le générateur est un cristal décaédraédrique, allongé entre la face y et son opposé, comme le représente la fig. 94. La section $r r'$ s' qui détermine le plan de jonction, traverse la face M et son opposé, par les faces y , y' parallèlement à la face P . Si l'on imagine que la moitié qui s'est renversée soit celle de dessus, on conçoit que le cristal hémotrope (fig. 95) doit avoir, sur le sommet situé à droite, un angle rentrant formé par la partie fixe de la face y , et par la partie mobile de la face opposée; cet angle est de $180^{\circ} 37' 43''$. Les deux autres parties des mêmes faces forment, sur le sommet à gauche, un angle saillant égal au précédent. En suivant avec attention l'effet du renversement, on se fera une idée des positions

relatifs des diverses portions de l'axe, dont les unes sont censées être restées fixes, et les autres avoir suivi le mouvement de la partie qui a tourné. Les cristaux qui ont servi aux observations du Cit. Desl., avoient été recueillis par ce naturaliste, près de la Chayette, département de Saône et Loire, sur le territoire de la Chapelle.

Il n'est pas rare de voir des cristaux de feldspath qui se croisent deux à deux, ou en plus grand nombre; le Citoyen Delomieu en a rapporté du Saint-Gothard, qui ont la forme de la variété distrochède (fig. 8a), et qui se joignent quatre à quatre par un de leurs sommets, ou se pénètrent mutuellement, de manière que l'assemblage représente une espèce de croix composée de quatre triangles réunis autour d'un point commun, et un peu relevés les uns vers les autres.

Anditremolabiles.

14. Feld-spath laminaire.

15. Feld-spath granuleux.

À texture granuleuse, quelquefois terreuse. On voit des morceaux qui offrent le passage du feld-spath laminaire à cette variété, qui paroît être l'effet d'un commencement d'altération, dont le dernier terme est le feld-spath argilleux ou le kaolin. Voyez l'appendice.

ACCIDENS DE LUMIÈRE.

Couleurs.

1. Feld-spath hyalin. Au Saint-Gothard.

2. Feld-spath blanc.

3. Feld-spath blanc-verdâtre. Au Saint-Gothard; la nuance de vert est très-légère.

4. Feld-spath rouge. Tel est celui du granite, dit oriental.

5. Feld-spath vert. Pierre des amazoons. Le Cit. Devarcoux a trouvé, en 1785, un filon de ce feld-spath, sur la frontière de la Russie, dans la partie du mont Ouralsko, la plus voisine de la forteresse Troïque (Trialt). Les minéralogistes du pays le nomment *zéro-spath*, c'est-à-dire, spath vert. Il y en a de semblable en Sibérie.

6. Feld-spath bleu? Feld-spath bleu céleste, de Bern, *t. I*, p. 373. Déchier feld-spath, *Konnerding, t. I*, p. 271. *Id.*, *Werner, catal.*, *t. I*, p. 285. Feltite, or compact feld-spath of Widenman, *Kirwan, t. I*, p. 326. D'un bleu céleste, ordinairement compact, quelquefois lamellaire. Au chalumeau, il se fritte plutôt que de se fondre. Il accompagne un quartz blanc, qui renferme sous des lames minces d'un blanc argentin, occasionnés au toucher, que l'on a pris pour du mica, mais qui paraissent plutôt être du talc. Cet aggrégat se trouve à Krieglach, en Stirie. Pour s'assurer si la

substance dont il s'agit doit être placée ici, il faudroit savoir si les morceaux lustrés ont la structure du feld-spath, ce que je n'ai point été à portée de vérifier.

7. Feld-spath incarnat. A Bayona.

8. Feld-spath gris.

Changement.

1. Feld-spath sacre. Pierre de lune. *De Lisle*, t. I, p. 145, note 163. *Adulara*, gîtasole et pierre de lune, *de Born*, t. I, p. 144. VII, A. & B. 10, 11, 12. *Adular*, *Esmerding*, t. I, p. 177. Feld-spath gris de perle, œil de poisson, *Drahtman*, *ibid.*, p. 4. *Moon stone*, *Kirwan*, t. I, p. 322. Pierre de lune du commerce. Des reflets blanchâtres, souvent avec une teinte légère de bleuâtre ou de verdâtre, qui partent d'un fond demi-transparent et légèrement laiteux.

Le feld-spath transparent du Saint-Gothard présente cet aspect dans quelques-unes de ses parties. On a nommé, en général, ce feld-spath *adulaire* ou *adularia*, dérivé d'*adula*, par lequel on désigne, en latin, le mont Saint-Gothard, où il a été trouvé par le père Piri. On n'a pas fait attention qu'aucune variété de feld-spath ne méritoit mieux d'en conserver le nom que celle qui offre cette substance dans son plus grand état de pureté.

Quelques lapidaires donnent le nom d'*argenteus* à des morceaux de cette même variété, dont

les reflets nacrés, au lieu de partir de l'intérieur, s'étendent sur la surface, comme dans les perles.

2. *Feld-spath opalin*. Pierre de Labrador, de Lisle, t. II, p. 497. *Id.*, de Barn, t. I, p. 143. Labrador-stein, Kernerling, t. I, p. 273. Feld-spath à reflets colorés en vert et en bleu; pierre de Labrador, Dandenton, tabl., p. 4. Labrador-stein, Kerner, t. I, p. 324. De beaux reflets ordinairement de deux couleurs, bleus et verts, et quelquefois jaune d'or. Le fond de la pierre est communément gris et marqué, dans certains morceaux, de veines blanchâtres, qui forment des rhombes en se croisant. Se trouve sur les côtes du Labrador, ainsi qu'en Russie et en Norwège.

3. *Feld-spath aventuriné*. Aventurine, Dandenton. Parsemé de points jaunâtres et brillans sur un fond incrusté, ou de points blanchâtres sur un fond vert. Se trouve sur les bords de la Mer Blanche.

Transparence.

1. Feld-spath transparent.
2. Feld-spath translucide.
3. Feld-spath opaque. Dans les granites ordinaires.

Substances étrangères à l'espèce du feld-spath, auxquelles on a donné son nom.

1. Feld-spath œil de chat. Le quartz chatoyant.
2. Feld-spath vert. Le diallage vert.

1. Le *feld-spath* est une des substances qui dominent dans les terrains primitifs. Il y forme la base d'une multitude de roches, et il entre au moins pour les deux tiers de la masse dans la plupart des pierres qui portent le nom de *granites*. C'est à lui que les roches porphyritiques doivent les taches distinctes qui relèvent le fond de leur couleur. Mais rarement ces diverses roches le présentent sous des formes régulières et complètes. Les beaux cristaux de *feld-spath*, soit opaques et colorés, soit transparents et blanchâtres, occupent des filons, ou des arêtes rehaussées dans les montagnes primitives; et, jusqu'ici, ce sont les Alpes Lombardes qui nous ont fourni ce que nous considérons de plus parfait dans ce genre.

Les *feld-spaths* qui contiennent les produits volcaniques, ont été formés dans les roches qui ont servi de base aux laves (1).

2. Le nom de *feld-spath*, c'est-à-dire, *spath des champs*, a été donné à la substance dont il s'agit, parce qu'on en trouvoit fréquemment des fragments dispersés sur la terre, parmi les débris des granites, tandis qu'il falloit aller chercher les autres pierres, qu'on a ainsi appelées *spaths*, dans des fentes ou des

(1) Cet article a été rédigé d'après des notes communiquées par le Cit. Dolomieu.

variétés ventruses (1). Ce nom, considéré en lui-même, est très-vieux; 1°. parce qu'il est composé; 2°. parce qu'il rappelle le mot de *spath*, qui a été la source de tant d'erreurs; 3°. parce qu'il ne désigne d'ailleurs la substance à laquelle on l'a appliqué, que par une situation qui lui est commune avec beaucoup d'autres minéraux, et en elle n'est même que comme étrangère. Mais, malgré les motifs qui devoient engager surtout les géologues à changer ce nom, contre lequel leurs observations sembloient réclamer sans cesse, en leur offrant à chaque pas le prétendu spath des champs dans les montagnes primitives où il a pris naissance, ils l'ont adopté si unanimement, et l'ont consigné tant de fois dans des ouvrages très-répandus, que la nouveauté auroit été ici contre l'usage avec des forces trop inégales; surtout l'ancien proposé d'y substituer celui d'*orthose*, dérivé d'un mot grec qui signifie *droit*, par allusion au résultat de la division mécanique, suivant deux coupes situées à angle droit l'une sur l'autre; caractère qui fait ressortir le feld-spath parmi tous les minéraux qui, comme lui, sont assez durs pour égrainer sous le briquet.

(1) M. Kirwan (*Elements of mineralogy*, t. I, p. 307) prétend que le nom de la substance dont il s'agit dérive du mot *feld*, *roule*, et en conséquence il écrit *feldspar*. Mais on ne trouve rien dans les auteurs Allemands qui confirme cette étymologie.

3. Les cristaux de feld-spath qui ont pour support des roches différentes de celles qu'on a appelées proprement *granitiques* ou *porphyritiques*, sont surtout ceux qui ont porté, pendant long-temps, le nom de *schiste blancs*. On trouve de ces derniers à Barège et à la balne d'Ancis, dans le ci-devant Dauphiné, sur une roche argileuse, où ils accompagnent, suivant les localités, l'amiboïte, l'épidote, l'axinite, etc. C'est apparemment cette différence de gisement avec le feld-spath des granites, qui en a fait imposer aux naturalistes, sur la nature d'une substance qui présente si visiblement les caractères du feld-spath, relativement à sa structure, à ses formes extérieures et à sa ductilité (1); et ce qui paroitroit singulier, c'est de voir qu'on ne séparoit le feld-spath de sa véritable espèce, que pour le confondre, sous un nom commun, avec ses cristaux d'épidote et d'axinite (schiste vert et schiste violet), dont l'association sur une même roche avec le schiste blanc, devoit rendre plus parlans les contrastes qui indiquoient leur séparation dans la méthode.

4. Les cristaux les plus volumineux de feld-spath qui ayant été encore observés, et dont quelques-uns ont deux centimètres, ou environ quatre

(1) Voyez les notes de l'Acad. des Sc., an 1784, p. 270, et ma lettre au Cit. Lamestache, Journal de Phys., 1786, p. 65.

poires et demi de longueur, proviennent, les uns de Baveno, les autres du Mont Saint-Gothard. On en trouve aussi de très-petits, qui n'ont pas deux millimètres, ou $\frac{1}{2}$ de ligne de longueur, entre autres parmi ceux de la variété dite *schorl blanc*.

Les cristaux du Saint-Gothard sont quelquefois mélangés de chlorite, qui les colore en vert, et donne à leur surface un aspect niqué. Cette couleur ne doit pas être confondue avec celle du feldspath de Sibirie, qui est répandue uniformément dans la masse, et paroît due au fer. J'ai reçu du Cit. Jarin, de Genève, un cristal de ce feldspath chlorité, d'environ un centimètre de hauteur, dont la forme, parfaitement régulière, appartient à la variété binaire.

5. Le feldspath opalin renferme quelquefois des grains de *Er stibilika*. Mais M. Lichten, sevrant dans, a observé, au Hartz, près des rivières du Barenberg, au couchant de Scherke, village du canton de Wernigerode, des granites dont le feldspath, qui est d'une couleur rougeâtre et d'un tissu peu lamellaire, fait la fonction d'un véritable ciment (1). Si l'on détache une parcelle de ce feldspath, et qu'on la fasse flotter sur l'eau, on la voit se porter vers l'extrémité d'un barreau aimanté qu'on lui présente, dans le cas où les deux

(1) Bulletin de la société philologique, vanderlinde, an 6, (oct. 1797).

pôles en regard sont de différents noms ; mais dans le cas contraire , le fragment se retient pour se mettre en prise à l'action du barreau par le pôle opposé. J'ai répété ces expériences sur des fragments, où la présence du fer étoit tellement marquée, qu'on n'apercevoit à l'œil aucun indice de ce métal.

6. La molécule intégrante du feld-spath est remarquable par l'égalité des faces M, P (fig 78), qui ont des angles différens. L'observation s'accorde ici avec le calcul, en ce que les joints parallèles à ces mêmes faces sont d'une netteté sensiblement égale, tandis que ceux qui répondent à la face T, dont l'étendue est double, sont ordinairement très-difficiles à apercevoir. Cependant, comme il y a des circonstances particulières qui peuvent faire varier le poli des coupes, on trouve des feld-spaths, surtout parmi ceux d'une couleur rougeâtre, qui se divisent sans difficulté dans le sens parallèle à T, de manière que l'on peut en extraire complètement le parallélépipède qui représente la molécule.

7. Plusieurs variétés de feld-spath tiennent un rang distingué parmi les minéraux, qui, sans éblouir l'œil, comme les gemmes, par des reflets étincelans qui tiennent aux qualités intrinsèques de la substance, le flattent par des jeux particuliers de lumière, par des couleurs changeantes, que la substance emprunte d'une cause accidentelle. On trouve le feld-spath nacré en cabochon, parce que cette

forme favorise le jeu des reflets qui semblent flotter dans l'intérieur du petit globe, lorsqu'on le fait tourner. Mais ce que je tenois de plus beau en ce genre de pierre, est une tablette d'environ deux centimètres de largeur, sur sept millimètres d'épaisseur, qui m'a été donnée par le Cit. Jurine. Elle a été prise dans un assortiment de quatre cristaux réunis en croix, dont la jonction s'annonce par des lignes situées diagonalement, qui partagent la surface de la tablette en quatre triangles; et en variant les positions, on voit de riches reflets d'une lumière nacrée se développer alternativement sur la surface de ces différents triangles. Le feld-spath aventurinisé se travaille en plaques et quelquefois en chapeaux de liège. Mais on fait ces surtout des plaques de feld-spath opalin, pour le ton pacifique et élevé de ses couleurs, comparables à celles qui décorent les ailes des plus beaux papillons. Elles présentent, comme dans l'opale, des légères fissures qui interrompent le tissu de la pierre; mais l'opale étant fissillée dans toutes sortes de directions, présente des reflets qui se succèdent, à mesure qu'on la fait tourner, au lieu que dans le feld-spath, dont les fissures coïncident avec les joints naturels, les reflets s'étendent sur un seul plan; en sorte qu'ils ne montrent tout entiers, lorsque la lumière est réfléchi par ce plan, sous l'angle favorable pour la pénétrer à l'œil, et disparaissent, dès qu'on donne à la pierre une inclination différente. On pourrait

les appeler *reflets d'acier* ou rien. J'ai reconnu, en observant un morceau de feld-spath opalin de Norwège, qui m'a été envoyé par M. Ramsack, que les plans d'où partaient les reflets dont je viens de parler, étoient dans le sens des faces T (fig. 79), qui sont les plus étendues.

4. Le feld-spath est d'un grand usage pour la fabrication de la porcelaine. On a reconnu que parmi les deux substances qui sont la matière de celle de la Chine, l'une, que l'on y appelle *petunse*, étoit un feld-spath laminaire blanchâtre; et l'autre, qui y porte le nom de *kaolin*, ressembloit entièrement au feld-spath argilleux (1). On emploie les mêmes substances dans diverses manufactures, et en particulier dans celle de Sévres, près de Paris; et telle est la proportion que l'on observe, en mêlant ces deux principes, dont l'un est fusible et l'autre réfractaire, que le mélange peut soutenir un degré de chaleur tel-qu'il est, sans se vitrifier. Il en résulte que la porcelaine acquiert, à l'aide d'une plus forte cuisson, une liaison plus intime entre ses parties, et à la fois une plus grande consistance; et que cependant elle reste en deçà du terme où, étant trop voisine de l'état vitreux, elle ne pourroit être exposée, sans se casser, à l'alternance du chaud et du froid. La porcelaine présente dans sa fracture un tissu plus ou moins grossier,

(1) Voyez l'appendice ci-après.

avec un léger luisant qui annonce qu'elle a subi seulement un premier degré de vitrification. A ces qualités, d'où dépend la bonté de la porcelaine, se joignent celles qui en font la beauté, savoir, la blancheur et un aspect translucide.

Pour faire la porcelaine, on forme, avec le pétunet et le kaolin pulvérisés, une pâte que l'on laisse sécher, avant de la travailler au tour. On donne aux pièces ainsi figurées, une première cuisson, puis on les plonge dans une espèce de bouillie légère, composée de sables et autres substances qui, par leur mélange, sont susceptibles d'une vitrification complète; et cet enduit, qu'on nomme couverte, s'appliquant à la surface des vases, au moyen d'une seconde cuisson, y forme une couche d'émail. On polit ensuite ces vases, et on leur donne le dernier degré de cuisson, qui fixe les couleurs.

9. Il existe une substance minérale, connue parmi nous sous le nom de *pétrouille*, appelée *petalopètre* par Saussure (1), et avec laquelle les minéralogistes Allemands paroissent avoir réuni des variétés de *silice*, sous la dénomination commune de *Lomaxite*. Elle a effectivement beaucoup d'analogie, par son aspect, avec le *quartz-agathe* ou *silice*; mais elle en est distinguée par sa faiblesse en émail blanc. Elle n'est nulle part mieux

(1) *Voyage dans les Alpes*, N°. 1194.

caractérisée que dans les morceaux qui viennent de Schiberg en Suède, et qui sont translucides, d'une couleur rougeâtre ou blanchâtre, et sont souvent accompagnés d'un minéral en aiguilles vertes, qui paroît être de l'épidote. Des minéralogistes d'un mérite très-distingué, regardent cette substance comme étant à peu près un feldspath, ce qu'est le silex au quartz, et lui associent le jade ordinaire, dit *oriental*, et une autre pierre que Soussure a aussi appelée jade (1), et qui enveloppe la diadème verte (*emeraldite*), dans la roche connue sous le nom de *verde di Clevea*. Cette opinion ayant paru à d'autres naturalistes laisser quelques doutes à éclaircir, j'ai préféré de renvoyer, pour le moment, les trois substances dont il s'agit, à l'article des minéraux de nature non encore arrêtée, où j'aurai dans un plus grand détail, tant sur leur description que sur leur histoire.

A P P E N D I C E.

...Feld-spath argillifère. *Argilla oprea*, *pura*, *natura*; *argilla porcellana*. *Waller*, *t. I*, p. 34. Argile de porcelaine, *Seign*, *t. I*, p. 259. Feld-spath qui a passé à l'état de kaolin, de *Linde*, *t. II*, p. 451. Porcelain clay, *kaolin*, *Krauss*, *t. I*, p. 178. Kaolin des Chinois.

(1) Voyez dans les Alpes, N^o. 122 et 125.

Très-friable, composé de particules qui n'ont presque aucun lien : se délayant dans l'eau, sans y faire pâte ; happant légèrement à la langue ; d'une belle couleur blanche, dans l'état de pureté ; doux au toucher sans causticité ; infusible. Il contient assez souvent des parcelles de quartz et de mica.

L'observation de certains morceaux de granite indique visiblement le passage du feld-spath à l'état argileux, par la décomposition. Il n'est pas rare d'en trouver des morceaux qui présentent encore des indices de forme cristalline. Dans ce nouvel état, le feld-spath est devenu réfractaire. On en trouve abondamment à Saint-Thyré, près de Lamoignon. L'analyse d'un morceau de kaolin a donné au Cit. Vauquelin (1) :

Silice.....	71,15.
Alumine.....	15,86.
Chaux.....	1,92.
Eau.....	6,97.
	<hr/>
	95,90.
Perte....	4,54.
	<hr/>
	100,00.

(1) Bulletin des sciences de la société philomathique, t. 18, n. 7, p. 12.



ERRATA, Tome II.

Page 51, ligne 16, en $\frac{(axy - x - xy)}{axy - x + y}$, lire :

$$\text{en } \frac{(axy - x - xy)}{3(axy - x + y)}$$

P. 53, ligne 23, le nom : lire le nombre.

P. 63, ligne 7, $-\frac{1}{2}pt$: lire $+\frac{1}{2}pt$.

P. 73, avant-dernière ligne, hauteur, lire largeur.

P. 73, ligne 8, *Id.*

Ibid., ligne 9, F : lire $\frac{1}{2}$.

P. 90, ligne 14, $\frac{1}{2}$: lire $\frac{1}{3}$.

P. 111, ligne 16, py : lire $py=$.

P. 129, ligne 3, elle donne : lire celle-ci donne.

P. 393, lignes 16 et 17, $\frac{1}{2}$ affect de sulfate.

P. 429 et 430, au lieu des N^{os} 8, 9, 10 : lire
2, 3, 4.

P. 560, ligne 5, p. : ajouter 20.







